

23 - 10- Phénicolés - Pr. TASSI

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les phénicolés qui constituent une famille d'antibiotiques très anciennes qui continuent à être utilisées par les pays pauvres et les pays en voie de développement, beaucoup moins utilisés dans les pays développés et les pays riches. Ils agissent par inhibition de la synthèse des protéines et le mode de résistance des bactéries à cette famille-là se fait par inactivation enzymatique. Les phénicolés sont des antibiotiques bactériostatiques à large spectre.

Les espèces sensibles en citent la *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Hémophilus influenzae*, les enterobactéries dont *Salmonella* et *Shigella*, les anaérobies, les spirochetes et les bactéries intracellulaires. Par contre, les espèces naturellement résistantes, *Acetivibrio*, la *Corynebactérie* et les *Mycobactéries*. Les phénicolés sont constitués de deux molécules, le chloramphénicol et le thiamphénicol, une bonne absorption digestive qui aboutit à 90% avec une bonne diffusion tissulaire et une bonne diffusion intracellulaire, l'élimination et les biliaires.

Les phénicolés peuvent être utilisés dans les abcès cérébraux primitifs, vu leur bonne diffusion au niveau des paranchèmes cérébraux, les meningitis meningococcus, les meningitis *Hémophilus influenzae* et les fièvres typhoïdes. Donc vous voyez ici la présentation du thiamphénicol qui existe sous différentes formes, injectable et orale, et les deux posologies que ce soit pour l'adulte et pour l'enfant. Leurs effets indésirables sont essentiellement la toxicité hématologique qui se présente sous forme d'insuffisance médullaire précoce à dose dépendante et réversible pour le thiamphénicol et il peut aboutir même à l'aplasie médullaire profonde et prolongée comme c'est le cas pour le chloramphénicol, le rordon moins utilisé.

Comme autre effet secondaire, on a le syndrome gré des prématurés et des nouveau-nés à cause de leur immaturité hépatique. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, chez le nourrisson de moins de six mois et en cas d'insuffisance rénale grave.