

19 - 05- Syndrome Coronaire Aigu sans sus décalage du segment ST - Pr. Benzarouel

Le syndrome coronarien aigu sans ce décalage du segment ST et la deuxième partie des cours sur le syndrome coronarien. Donc là, on en a vu une bonne partie dans le cours sur le ST+. Donc la définition du SCA, c'est toute douleur d'allure angineuse ou équivalent survenant de nouveau.

C'est à dire un engor d'effort de nouveau en l'inclut dans le SCA ST- de manière prolongée ou suite à une aggravation récente chez un patient avec ou sans des antécédents coronariens. C'est à dire un patient déjà qui a un engor d'effort, mais qui a modifié son seuil ischémique. C'est à dire il se plaint de douleurs thoraciques pour des efforts de moins en moins important.

Ce patient là, il présente un engor crescendo et on va le classer aussi dans le SCA ST-. Ces douleurs d'origine ischémique sont souvent associées à des anomalies électriques. Donc, c'est une infection fréquente, une urgence dans la prise en charge.

On ne revient pas sur cette classification. Le caillot, il ne va pas obstruer totalement la lumière vasculaire. Les facteurs de rupture de la plaque, vous les connaissez.

Il y a les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Et on aura la formation d'un caillot qui est, j'insiste là dessus, partiellement occlusif. A la différence du ST+, on a dit que le caillot, il est totalement, c'est à dire la lumière vasculaire est complètement fermée.

Dans le ST-, la lumière, il y a encore du flux qui passe au sein de l'artère. Donc, thrombus non complètement occlusif, il est riche en plaquettes qui libèrent des substances vasoactives. Donc, quand ce thrombus va libérer des substances vasoactives, on aura des spasmes qui vont se rajouter.

L'évolution peut se faire vers l'occlusion complète de l'artère. C'est une possibilité et à ce moment-là, c'est l'apparition du ST+. Ce qui explique l'intérêt de l'utilisation des anti-agrégants plaquettaires afin d'éviter l'évolution vers l'occlusion complète.

Parfois, on a des embolisations coronaires distales. Ce caillot qui est partiellement obstructif va donner des petits fragments qui vont partir en distalité et aller se nicher dans les ramifications de l'artère et les boucher complètement. Et on aura des micro-infarctus qui vont faire élever le dosage des troponines.

Il y a aussi le spasme coronaire qui peut se rajouter et qui va aggraver la situation en réduisant davantage le débit coronaire. Ce spasme coronaire est dû à la libération de substances vasoactives. Rappelez-vous, on a dit que les plaquettes, le caillot riche en plaquettes va libérer des substances vasoconstructives qui vont provoquer le spasme coronaire.

Et même si l'artère est partiellement occlusif, on peut avoir des poussées de spasmes qui vont

réduire davantage la lumière vasculaire. En ce qui concerne le diagnostic positif, l'interrogatoire est une étape toujours importante. L'angine de poitrine revêt des formes particulières.

Je vous demande de les connaître. Ces formes-là, elles sont importantes et ça permet de ne rien oublier. L'angor de repos, passant jusqu'ici asymptomatique, qui présente un angor d'efforts fréquents et invalidants.

Plusieurs crises par jour ou par semaine pour des efforts modérés ou de plus en plus faibles. Ou bien un angor d'emblée de repos. Quelqu'un qui ne se plaignait de rien et commence à dire j'ai des douleurs comme ça qui me prennent 10 minutes.

C'est des douleurs qu'on appelle des on off. J'ai des douleurs qui durent 5-10 minutes, après ça part. En plus, j'ai encore des douleurs une heure après.

Donc, c'est un angor d'emblée de repos. Parfois, on peut avoir les deux. On parle d'un angor mixte, c'est-à-dire à la fois d'efforts et des fois au repos.

Donc, la sémiologie des crises est proche de l'angor stable, mais ces crises sont de plus en plus longues. 10 à 20 minutes et c'est de moins vite à la prise de trinitrine. L'angor accéléré ou l'angor dit crescendo.

C'est un patient qu'on n'a rien connu, qui a un angor stable, stabilisé par le traitement médical et qui présente un des deux tableaux sus décrits. C'est à dire, il était stable jusque là et il commence à se déstabiliser, à présenter soit un angor de repos, soit à présenter un angor d'efforts pour des douleurs pas très importantes. Angor de repos ou mixte, je vous en ai parlé et un angor post-infarctus.

Quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde revascularisé ou pas et qui va représenter une angine critique. Il doit être toujours positif. C'est à dire, je peux trouver un sous décalage, je peux trouver un sus décalage transitoire et c'est on parle d'équivalent et c'est plus c'est plus sévère.

On peut avoir des modifications de l'endetté initialement en négatif qui peuvent se repositionner ou switcher entre T négatif et T positif. Différents aspects, on va prendre cet ECG de gauche. Le ECG de gauche, qu'est-ce qu'il montre? Il montre un sous décalage dans le territoire D2, D3, AVF.

C'est le territoire inférieur et un sus décalage en AVR. L'AVR n'est jamais inclus dans la répartition des territoires. Mais quand on trouve un sus décalage AVR, on suspecte une atteinte de l'IVA proximale.

Dans cet autre ECG, on a des endettés négatives dans le territoire antérieur. Regardez, V2. Ces endettés sont négatives, pointues, symétriques de V2 à V6.

Le dosage des troponines. On a maintenant à notre disposition les troponines ultrasensibles. Il

faut toujours faire deux dosages.

Quand ce sont des troponines qui ne sont pas ultrasensibles, deux dosages espacés de 6 à 12 heures. Quand ce sont des troponines ultrasensibles, on fait un dosage avec un intervalle entre 1h30 à 3h. Leur élévation même modeste, elle confirme le diagnostic.

Si j'ai une première troponine négative, je dois toujours refaire un deuxième dosage pour voir s'il n'y aura pas une élévation ou bien si ça reste toujours négatif. Elle a une signification pronostique. Elle témoigne de microinfarctus du myocarde suite à des embolisations coronaires distales.

On a vu ça en physiopathologie. Les autres, ils n'ont aucun intérêt. Il ne faut même pas les demander.

Voilà d'autres. D'autres bilans sont à demander en fonction des facteurs de risque. La fonction rénale numération selon l'échocardiographie.

Les principes de l'écho étude de la contractilité de la fonction du ventricule. Éliminer les diagnostics différentiels. Chercher les complications chez le patient dit à faible risque, c'est à dire ST, STa, ST moins à bas risque, c'est à dire où j'ai une douleur.

L'orthoracique. J'ai un ECG pas très parlant. J'ai fait le premier dosage d'étroponine sans négatif.

J'ai refait un deuxième dosage. Il est négatif. Donc, je classe vraiment patient comme à comme quoi comme bas risque ou encore instable.

Et à ce moment là, je suis en droit de lui demander un test d'ISKEMI, un ECG d'effort, échographie d'effort, une scintigraphie myocardique d'effort. La coronagraphe, elle est réalisée en urgence. C'est le patient à très haut risque.

Elle est réalisée dans un délai de 24 à 72 heures chez les patients à haut risque, au risque intermédiaire. Et elle est réalisée après un test d'ISKEMI positif chez le patient à faible risque. Donc, elle va permettre bien sûr de faire le point sur l'anatomie coronaire et de traiter s'il y a besoin de diagnostic différentiel.

Tous les syndromes douloureux thoraciques que vous connaissez déjà. La stratification du risque. C'est une étape très importante où je dois évaluer le risque ischémique du patient et le risque hémorragique.

Donc, le risque ischémique, il est évalué sur des critères cliniques électriques et biologiques en se basant sur certains scores. Vous avez vu que la stratégie thérapeutique, je vous ai dit la coronagraphe, elle est proposée immédiatement. Si le patient est à très haut risque, 24 heures à 72 heures, s'il est à haut risque.

Donc, si je fais cette stratification, c'est pour pouvoir dire guider ma stratégie de prise en charge et dire à quel délai j'envoie ce patient pour faire sa revascularisation. Et puis, il y a la stratification du risque hémorragique. Les facteurs prédictifs de saignement grave sont le sexe féminin, l'âge des personnes âgées, les antécédents hémorragiques.

Si je vous dis j'ai un ulcère qui a saigné, j'ai une hématurie, l'insuffisance rénale et l'abord fémoral qui est maintenant très déconseillé. Il ne faut pas le faire. Il faut utiliser toujours la voie radiale parce que ça évite les complications, les hématomes du point de ponction.

Alors, voici comment je vais stratifier le risque ischémique. Je vais dire classé passant à très haut risque ischémique quand il a une instabilité hémodynamique ou quand il est en choc cardiogénique. Je vais également le classer comme à très haut risque quand il a des douleurs thoraciques intercurrentes, très fréquentes, ne cédant pas malgré le traitement médicamenteux.

S'il a des complications mécaniques, s'il a une insuffisance cardiaque aiguë et s'il a des modifications du segment ST, c'est à dire aussi ces modifications entre le sus-décalage et le sous-décalage. Ce patient là, s'il a un de ces critères là, je vais l'envoyer directement en moins de deux heures vers un centre où il y a la coronarographie pour faire la coro et la revascularisation. S'il est dit à haut risque, le haut risque c'est quoi? C'est l'élévation des troponines ou bien les modifications du segment ST même si elles sont silencieuses, c'est à dire un sous-décalage du segment ST ou bien des entités négatives.

Si vous avez le sus-décalage même transitoire, vous êtes ici dans le très haut risque. Si vous avez une modification du segment ST dans le sens négatif ou bien des entités négatives avec l'élévation des troponines, là, vous pouvez adresser votre patient dans un délai entre 24 et 72 heures. Bien sûr, vous allez administrer avant un traitement médicamenteux.

Et puis, on a le risque intermédiaire où on a encore le temps au delà de 72 heures. Quand le patient est diabétique, quand il a une insuffisance rénale, dysfonction VG moins de 40%, un angor post-IDM, un antécédent de pentage ou un antécédent de dilatation coronaire. Donc là, vous avez encore plus de temps au delà de 72 heures.

S'il n'y a aucun de ces critères là, c'est à dire que vous n'avez que la douleur thoracique et quelques facteurs de risque peut être, mais sans plus ni modification de la troponine, ni modification ECG passé en an diabétique. Et bien là, sachez que vous êtes dans le bas risque et c'est à ce moment là où vous proposez un test d'ISKIMI. Bon, ce score de grille, vous l'avez vu dans la slide d'avant.

C'est un score qui inclut des items. Franchement, c'est un score qu'on n'apprend pas, mais c'est un score qui nous aide à classer aussi le risque ischémique des patients se présentant pour un test témoin. Il y a des items de l'âge, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la créatinine, le stade d'équilibre et modification ECG, la troponine.

Et il est bien corrélé au pronostic du patient. Donc, ça permet également, en plus des critères dont on a parlé, ça permet également de dire est ce que le patient est à faible risque, à haut risque ou à risque intermédiaire. La prise en charge thérapeutique.

Donc, le but, c'est d'éviter l'évolution vers un STA ST plus ainsi que éviter les complications et d'améliorer le pronostic à réduire la mortalité cardiovasculaire. Il faut hospitaliser les patients, unités de soins intensifs. Il faut les monitorer, surveiller leur fréquence cardiaque, pression artérielle, ECG, administrer le traitement médicamenteux et la revascularisation selon les critères d'évaluation.

Traitement médicamenteux, bien sûr. Bithérapie anti agrégante, l'aspirine, le clopidogrel. Les autres anti agrégants plaquettaires, les anti G2B 3A.

C'est en salle de coronagraphie quand on a une charge thrombotique très élevée. En ce qui concerne les anticoagulants, on a le choix, soit le fond d'Aparinus dans le nom commercial Laryxtra, 2,5 mg par jour en souscutanée. Soit l'enoxaparine, 100 unités kilos par 12 heures.

C'est pour les patients de moins de 75 ans. L'éparine non fractionnée, franchement, elle est utilisée uniquement en salle de cathéterisme. Le traitement anti ischémique.

Les bêtas bloquants, première intention, en absence de contre-indications. Cela permet de diminuer la consommation d'oxygène. Plusieurs molécules à notre disposition.

Les dérivés vénitrées, si l'engor est résistant aux récidivants. Les inhibiteurs calciques, on les donne quand l'engor est à caractère plutôt spastique, engor du petit matin, par exemple. Le traitement des facteurs de risque, c'est évident.

Traiter le diabète, l'épidémie, le tabac, sevrage du tabagisme, traiter l'hypertension artérielle. La revascularisation myocardique, elle peut se faire soit par angioplastie coronaire avec mise en place d'endoprothèses coronaires. Le stent actif, qui est couvert d'une substance anti mytotique et qui nécessite une biothérapie anti agrégante pendant une durée d'au moins 12 mois.

Ou bien la revascularisation chirurgicale avec un pontage aorto coronaire sous circulation extracorporelle. Donc, le choix de l'une ou de l'autre dépendra des résultats de la coronarographie. Donc, devant un SCA est témoin, l'hospitalisation en musique, traitement anti thrombotique, traitement anti ischémique et traitement des facteurs de risque.