

12 - 02.2- Complications Aiguës du Diabète - Pr. ABOU ELHASSAN

(0:02 - 0:24)

Bonjour, nous allons entamer notre cours concernant les complications aiguës du diabète. Donc, on a vu la première série, l'acidose cétose diabétique et le coma hyperosmolaire dans ce chapitre. Donc, on va aborder l'acidose lactique et l'hypoglycémie.

(0:24 - 0:53)

L'acidose lactique, c'est un état d'acidose métabolique qui est lié à la libération d'ion H^+ , par l'acide lactique. Sur le plan pratique, il est défini par une acidose métabolique, définie par un pH inférieur à 7,3 et bien sûr, le taux de lactate qui est au-delà de 5 millimoles par litre. Il faut dire que l'acidose lactique est un accident extrêmement rare par rapport à l'acidose cétose diabétique et par rapport au coma hyperosmolaire, mais il est grave.

(0:54 - 1:05)

Il est mortel pratiquement dans la moitié des cas. L'acidose lactique est l'apanage généralement d'une prescription inappropriée des biguanides. Donc, à la limite, c'est des accidents iatrogènes.

(1:07 - 1:20)

La physiopathologie est extrêmement simple. Les lactates sont un sous-produit normal de la glycolyse qu'on peut voir dans ces diabosives là. Les lactates sont réutilisés par le foie pour la néoglycogénèse.

(1:20 - 1:58)

La lactacidémie peut être élevée du fait soit d'une augmentation de la glycolyse lors d'un exercice musculaire intense, par exemple, soit une diminution de la production de la lactate par le foie et par le rein, soit d'une hypoxie ou d'une hypoxie qui est prolongée. Et les biguanides, dans ce cas là, c'est les traitements qui sont responsables de l'acidose lactique généralement. Ils vont inhiber la néoglycogénèse à partir des lactates et pyruvates et donc être responsables d'une hyperlactacidémie.

(1:58 - 2:10)

Donc, les biguanides, c'est les thérapeutiques qui sont responsables généralement de l'acidose lactique. Le rôle des biguanides a été bien élucidé. Donc, il va y avoir une hyperproduction de lactate au niveau intestinal.

(2:10 - 2:36)

Mais il n'y aura d'acidose lactique que s'il y a une accumulation importante des biguanides, donc

généralement en cas d'insolence rénale. Donc, il faut respecter les contre-indications des biguanides, surtout en cas d'insolence rénale et aussi dans toute situation potentiellement à risque. Notamment les patients qui sont ces biguanides et qui vont être injectés par l'iode lors d'une expiration radiologique ou bien lors d'une chirurgie.

(2:37 - 3:03)

Il faut respecter les biguanides. Il faut faire attention lorsqu'on est devant une situation d'hypoxie tissulaire, notamment les insolences cardiaques et respiratoires et s'il y a risque d'accumulation de lactate en cas de baisse d'opération, notamment en matière si nous sommes devant des tableaux d'insolence hépatique. Donc, les contre-indications des biguanides, il faut les respecter d'une façon drastique pour éviter cette complication qui est certes rare, mais elle est extrêmement.

(3:04 - 3:24)

Les circonstances chez le diabétique, c'est généralement les biguanides qui sont responsables. Le fait de ne pas respecter les contre-indications de ce thérapeutique là, peuvent engendrer une acidose et une acidose lactique. Les oeufs trop courts, généralement les hypoxies més sévères, les insolences hépatiques et la prise d'alcool de façon unique.

(3:24 - 3:42)

Le diagnostic, il y a généralement des prodromes, généralement d'attirer l'attention. D'accord, c'est des patients qui sont, qui deviennent asthymiques, qui ont des douleurs abdominales thoraciques, qui ont des crampes. Et lorsque nous dépassons cette phase là de prodromique, nous sommes devant la phase dite confirmée d'acidose lactique.

(3:42 - 4:10)

Et dans ce cas là, on va avoir des signes d'acidose métabolique avec une hyperventilation, un tachycardie, des troubles de conscience, voire un collapsus cardiovasculaire. La notion de diabète traité par le biguanisme fait suspecter du diagnostic qui est confirmé par la biologie. Alors la biologie, c'est une acidose métabolique avec une augmentation de l'actacidémie, des épacalymies, une acidose avec une diminution d'arylacaline et d'EPH sans cétose.

(4:10 - 4:32)

Lorsqu'on va faire un lab6, il n'y aura pas de cétose, mais surtout on aura la présence d'un trou aïnique qui est généralement comblé par l'acide lactique. Le traitement ne se conçoit qu'en unité de soins intensifs. C'est des mesures de réanimation généralement qui vont être mises en oeuvre pour restaurer d'un premier temps une bonne volubilité.

(4:33 - 4:52)

Alors que la correction de l'acidose est faite par une perfusion de sérum bicarbonaté à 2,7%. Une quantité trop importante de bicarbonate risque d'entraîner un surcharge en sodium et une baisse paradoxale de pH endocellulaire. Les quantités à apporter sont vraiment modérées.

(4:53 - 5:06)

Et le deuxième volet thérapeutique pour corriger l'acidose reste la dialyse qui doit être extrêmement large pour traiter ces patients là. Et il ne faut pas oublier l'insulinothérapie. Ce sont des patients qui vont avoir des épidémies.

(5:07 - 5:33)

La prévention, c'est un volet extrêmement capital. Il faut généralement respecter de façon drastique les contre-indications des biguanides qui sont l'inséance rénale, l'inséance hépatique, les états d'époxymie et surtout les sujets extrêmement âgés. Il faut arrêter les biguanides avant tout examen avec un produit de contraste et avant toute procédure risquant d'entraîner une séance rénale fonctionnelle, notamment une intervention chirurgicale.

(5:33 - 5:55)

La dernière complication de diabète est une complication qui n'est pas négligeable, qui est facilement traitable, facilement détectée et peut engendrer des complications, surtout neurologiques. L'hypoglycémie. Alors, les accidents hypoglycémiques sont généralement iatrogènes chez les diabétiques.

(5:55 - 6:08)

Ils sont dus essentiellement à des erreurs thérapeutiques. D'accord par les patients traités par insuline ou par sulfamide. Le patient est donc l'obligation lorsqu'on éduque un patient diabétique.

(6:08 - 6:28)

Il doit apprendre les programmes de l'hypoglycémie et de les connaître et pour traiter en cas d'hypoglycémie. L'hypoglycémie peut être prolongée et grave, voire parfois mortelle sur certains terrains, notamment les sujets âgés. La physiopathologie est extrêmement simple.

(6:28 - 6:44)

Alors, il y a généralement une réaction, une mise en jeu du pancréas et du système sympathique. Lorsqu'on est, lorsque l'organisme a une hypoglycémie, une réponse à l'organisme. Sur ce tableau, on voit comment l'organisme se manifeste lorsqu'on est dans une hypoglycémie.

(6:44 - 7:04)

C'est un patient qui est sans. C'est un patient qui est diabétique type 1. C'est un patient qui est

diabétique type 2. Donc, la mise en jeu du pancréas et du système sympathique, il diffère lorsque vous êtes devant un patient diabétique type 1. Donc, l'insuline, il n'y a pas d'insuline généralement. Par contre, il y a une réponse du glycogène de façon diminuée ou absente.

(7:05 - 7:28)

Alors que le système sympathique, il intervient en augmentant la sécrétion d'adrénaline ou parfois une réponse diminuée. Et les symptômes neurologiques sont moins présents, surtout en cas d'hypoglycémie fréquente pour le patient type 2. Généralement, il y a une diminution de la sécrétion d'insuline ou parfois absente. Le glycogène va être élevé ou une réponse qui est parfois diminuée.

(7:28 - 7:40)

Ces patients sont traités d'une façon très longue. Alors que les systèmes sympathiques, il y aura une augmentation de l'adrénaline ou parfois une réponse diminuée. Les symptômes neurologiques sont élevés ou moins présents chez les patients.

(7:41 - 7:46)

Les hypoglycémies ont certaines causes. Donc, on les a citées. On les revoit d'une façon plus claire.

(7:46 - 7:55)

Soit qu'on a un problème iatrogène d'adaptation des doses. Le problème d'injection ultime d'insuline. Là, les sulfamides aussi.

(7:55 - 8:09)

Donc, les hypoglycémies peuvent être responsables des hypoglycémies. Parfois, on a des erreurs d'alimentation et ou des erreurs éducatives. Parfois, on pratique des activités sportives qui ne sont pas adaptées au régime insulinaire, au régime de traitement qu'on prend.

(8:09 - 8:29)

Parfois, certains médicaments ont été responsables, notamment le bêta bloqueur ou la prise d'alcool. Certains terrains particuliers, notamment l'insuline rénale et hépatique, peuvent être causes de hypoglycémie chez ces patients sous traitement antidiabétique. Sur le plan clinique, on aura des signes adrénergiques à titre de sueur, des palpitations, des tremblements et de la faim.

(8:29 - 8:42)

Essentiellement, parfois, on a des troubles de concentration, difficultés à parler, une

incoordination motrice avec parfois des diplopies ou une hybridité. La stigmie est marquante. Le patient est irritable.

(8:42 - 8:59)

Il est nerveux. À terme, on va avoir des signes neurologiques manifestes centraux, essentiellement avec installation de coma, des signes d'irritation pyramidale, des convulsions et surtout des signes de focalisation. Les signes sont généralement très polymorphes.

(9:00 - 9:19)

À partir de là, la classification de l'hypoglycémie en matière de gravité est classée en trois grands traits de gravité, soit l'hypoglycémie est légère. Le patient va sentir du froid, une situation, une pâleur, une palpitation. Parfois, elle est modérée par l'apparition des céphales et un changement d'humeur, parfois des troubles de concentration.

(9:19 - 9:44)

Elle est sévère lorsqu'on a des troubles neurologiques majeurs, notamment des convulsions, du coma, une perte de conscience. Comment on traite? Là, sur le tableau là, on a les classifications de l'hypoglycémie en léger, modéré et sévère avec les signes et les symptômes et le traitement. Lorsqu'on est léger, il faut donner rapidement aux patients 10 à 15 grammes d'hydrate de carbone.

(9:45 - 9:56)

Et puis, on va calculer ou mesurer la glycémie après 15 minutes. Si la glycémie est encore basse, il faut répéter le traitement par oral. D'accord, on appelle ça le sucrage.

(9:57 - 10:13)

Si la glycémie s'élève au delà de 3,9 millimoles, les signes cliniques ont disparu. Donc, on donnera une collation aux hydrates de carbone complexes et des protéines au repas. Si, par contre, le tableau est extrêmement sévère par des signes neurologiques, essentiellement.

(10:14 - 10:20)

D'accord, c'est la définition des polysèmes graves. C'est l'apparition de signes neurologiques. S'il n'y a pas d'intervention de fruit.

(10:20 - 10:35)

Donc, dans ce cas là, il faut qu'on injecte du glycogène en IM, en IV. D'accord, on donnera du glucose. On mettra du glucose en IV à 4,40%, soit 4,40 millilitres en 1 à 30 minutes.

(10:35 - 10:44)

Puis du glucose à 10% en perfusion continue. Il faut monitorer de façon systématique la glycémie toutes les 15 minutes. Puis, après stabilisation, toutes les deux heures.

(10:45 - 11:02)

Sur ce diapo là, on résume le tableau d'hypoglycémie en matière de glycémie légère. Glycémie modérée et hypoglycémie sévère. Alors, la légère, c'est quand 15 grammes du glucose peros.

(11:02 - 11:17)

On mettra quatre morceaux de sucre ou de raisin ou parfois deux cuillères de café de miel, deux cuillères à soupe de sirop. D'accord. Et parfois du Coca-Cola et de limonade.

(11:17 - 11:26)

C'est aussi une alternative rapide à domicile. Et puis, donc, on vérifie les symptômes s'ils sont disparus. Donc, la glycémie est corrigée.

(11:27 - 11:36)

Donc, on mettra une collation avec un repas. Si, par contre, la glycémie est extrêmement sévère, inférieure à deux, avec des signes neurologiques essentiellement. Ça, c'est le glycogon onyème.

(11:36 - 11:58)

Le glucose en IV à 40%, puis du glucose à 10% en IV en continu et en surveillant la glycémie toutes les 15 minutes. Message important. Toute malaise chez un patient diabétique doit faire penser en premier à une hypoglycémie et entamer le traitement.

(11:59 - 12:14)

On peut à ce moment là accepter l'hyperglycémie. Et il ne faut pas accepter l'hypoglycémie parce que c'est une pathologie qui est grave et qui est facilement traitable. Juste un sucrage en sublingual pourra sauver la famille.

(12:15 - 12:26)

La prévention, c'est un axe extrêmement important. Donc l'éducation des patients sur les signes d'hypoglycémie. Il faut adapter d'une façon continue, d'une façon dynamique le traitement.

(12:27 - 12:40)

Il ne faut pas qu'on ait un traitement statique, mais un traitement adaptatif à la situation des patients, à l'activité qu'il fait de façon continue. Adapter les signes thérapeutiques aussi. Il faut

que le patient ait des zoocontrôles fréquents.

(12:41 - 12:55)

Il faut que le patient ait quand même une hygiène de vie équilibrée avec une alimentation et une pratique du sport. Et équilibrer les autres troubles métaboliques, notamment l'obésité. En conclusion, les conséquences de l'hypoglycémie sur les patients sont parfois fatales.

(12:56 - 13:04)

La prévention, l'éducation personnalisée, avec une évaluation des facteurs de risque, rendent possible un contrôle satisfaisant de vie.