

27 - Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) - Pr. AABBASSI

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui portera sur les troubles du spectre autistique. Au terme de ce cours, vous serez capables de définir l'autisme, de connaître les différentes présentations cliniques de ce trouble, d'orienter les évaluations diagnostiques à la prise en charge et d'accompagner correctement l'enfant et sa famille. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant.

L'autisme, qu'il soit au singulier ou pluriel avec S, ou trouble du spectre autistique abrégé en TSA, est défini comme étant un ensemble de troubles caractérisés par la présence d'anomalies précoces, très tôt dans le développement, et persistantes, c'est-à-dire présentes tout le temps, dans deux domaines. L'interaction sociale et la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, et le comportement et les intérêts restreints, limités et stéréotypés. L'autisme remonte à très loin dans l'histoire humaine.

En 1798, un médecin français Jean-Marc Hétard avait décrit pour la première fois un cas d'éducie de la naissance par privation et manque de soins chez un tout petit enfant qui s'appelait Victor, l'enfant sauvage. Après, Eugène Bleulair a introduit en psychiatrie le terme d'autos, c'est-à-dire le repli sur soi, et ainsi plusieurs cas d'autisme étaient appelés schizophrénie infantile précoce. Le père de l'autisme est Léo Kanner qui, en 1943, a introduit pour la première fois la nomination d'autisme infantile précoce à propos de 11 cas.

L'autisme s'appelait, il y a quelques années, troubles envahissant développement, mais depuis 2015, par l'arrivée de la cinquième version de la classification internationale des troubles mentaux, il s'appelle troubles du spectre autistique. L'autisme est un trouble largement médiatisé, vous allez entendre parler partout. C'est un diagnostic fréquent qui touche 1 à 2% de la population mondiale.

Un enfant sur 100 en France est diagnostiqué autiste, un enfant sur 66 en Belgique est aussi diagnostiqué autiste. Au Maroc, et par rapport à l'enquête nationale des personnes en situation de handicap qui a été faite en 2018, cette enquête avait recensé 340 000 personnes avec autisme. Nous notons une prédominance masculine, 4 garçons pour une fille.

Par rapport à l'âge, les anomalies sont présentes avant l'âge de 6 ans avec un pic de fréquence entre 2 ans et 3 ans. Dans notre contexte, nous notons un grand retard diagnostique. L'éthiopathogénie Brunet-Butelheim avait décrit vers la Deuxième Guerre mondiale la notion de mamans rejetantes et froides qui ne sont pas stimulantes pour leur enfant, ce qui peut être la cause de l'autisme.

Leocaner vient après pour parler de troubles du lien affectif de l'enfant avec son entourage, c'est-à-dire que l'enfant est en difficulté de créer un lien affectif et affectueux avec son entourage. Les théories psychanalytiques sont suivies dans ce sens, mais actuellement, retenez qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental précoce, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies de développement de

cerveau qui commencent très tôt en intra-utérin. Le modèle neurodéveloppemental est multifactoriel.

Il y a une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire un terrain héréditaire. Lorsqu'on a un cas d'autisme dont la fratrie, le risque est x20, chez les parents, s'il y a un cas d'autisme, il y a un risque x10, et chez les jumeaux, il y a un risque de 50 à 60%. Cette vulnérabilité génétique est relevée aussi par l'association fréquente au syndrome génétique, association au trisomie 21 et au syndrome de l'exo-fragile, par exemple.

Il y a aussi des facteurs neurologiques, comme l'altération de circuit de l'empathie et les altérations de cerveau social, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui est responsable de l'analyse de l'expression faciale, de la compréhension du langage et de l'interprétation des émotions, aussi bien les nôtres que d'autres. Aussi, il y a un défaut de traitement de l'information au niveau du lobe temporal et on parle d'anomalies de structure, de chimie et de fonctionnement électrique du cerveau. Ce qu'il faudra retenir, c'est les facteurs environnementaux qui sont très importants.

Ils vont nous définir ce qu'on appelle des populations à risque. C'est le sexe masculin, c'est l'âge de paternité, c'est-à-dire l'âge du papa entre 40 et 49 ans, l'âge de maman qui est au-delà de 40 ans, la grossesse à haut risque, l'HTA gravidique, l'épilepsie, la prise d'antidépresseurs, d'anticonvulsifs ou la prise d'alcool, les menaces d'accouchement prématuré à moins de 20 semaines d'aménorrhée, une prématurité qui est inférieure ou égale à 35 semaines d'aménorrhée, les six jours en soins intensifs néonataux, un faible poids de naissance moins de 2,5 kg, la présence de dysmorphie, la présence d'un antécédent familial de schizophrénie, de troubles du spectre autistique ou de retard mental, ou un antécédent personnel de retard mental, d'infirmité motrice cérébrale, de syndrome d'Owest ou d'encéphalopathie virale ou autre, encéphalopathie ou maladie neurologique. Ce n'est pas la présence d'un seul facteur environnemental qui va définir la population à risque, mais plutôt ce qui doit inquiéter, c'est l'association de plusieurs facteurs.

Nous arrivons à la partie clinique. Nous allons décrire la première forme typique, jadis appelée la triade de Kanner. C'est l'association de difficultés précoces et persistantes dans trois registres, les interactions sociales, la communication verbale et non-verbale, les comportements répétitifs et les intérêts restreints.

Très récemment s'ajoutent deux autres signes qui sont très sensibles de l'autisme, les bizarreries sensorielles et les déséquilibrations émotionnelles. Nous allons voir en détail ces signes-là. Les difficultés de l'interaction sociale.

Devant vous, vous allez voir un enfant qui s'isole, qui paraît indifférent aux autres personnes, qui semble ignorer les autres, qui n'a pas de contact visuel, ou plutôt il a un regard fuyant, qui ne vous salue pas, qui ne se retourne pas à l'appel, qui n'imité pas, qui ne sourit pas en réponse, qui

ne joue pas avec les autres enfants. Ce que nous appelons, en gros, habituellement, un enfant qui est détaché de ce qui se passe autour de lui, qui est dans sa bulle. Difficultés de communication.

Le langage est absent, ou parfois un retard d'acquisition de langage, ou une répétition de mots, une répétition de questions qu'on lui pose, par exemple, puisqu'on lui dit « est-ce que ça va ? », il va répondre « est-ce que ça va ? », au lieu de dire « je vais bien », par exemple. Ou il va parler comme dans un livre, ou il va imiter le discours de dessins animés de la télé. La gestuelle n'est pas orientée à un but social, ne va pas vous tendre la main pour vous saluer.

Absence de pointage, c'est-à-dire qu'il ne pointe pas du doigt, il ne montre pas par le doigt les objets qu'il veut, et ça c'est un signe qui est très spécifique, qui est très sensible de l'autisme. La compréhension est généralement difficile, elle a du mal à comprendre, ou à se faire comprendre. Les comportements répétitifs et stéréotypés.

Il va tourner autour de soi, il va aligner les objets, il va déambuler, il va balancer par son corps, le flapping de la main, ou les mouvements des mains en aile de papillon, dans des moments d'excitation ou de joie. Également, il y a les jeux répétitifs, il va répéter le même jeu maintes fois, il va faire tourner la roue de la petite voiture, sans se lasser, sans s'ennuyer. Les intérêts restreints.

L'enfant a une routine fixe, il ritualise les situations, il doit faire le même trajet, le même chemin à l'école, ou il va faire une crise de pleurs, il doit faire les mêmes étapes pour prendre sa toilette, ou il va se mettre en colère. Il a des intérêts qui sont anormaux par leur intensité, par leur répétition et par le temps qu'on crée par rapport aux objets précis ou des activités précises. Par exemple, des enfants qui vont dessiner le même dessin, ou par exemple, c'est des enfants qui sont passionnés par les chats sans intéresser aux autres animaux.

L'alimentation, elle est sélective, il va manger le même aliment, trois fois par jour. Et vous imaginez que c'est très contraignant pour les parents au quotidien. Cette diapositive vous donne des exemples des difficultés des interactions sociales comme ne pas regarder, ne pas avoir un contact visuel direct, des troubles de communication verbal et non-verbal, ne pointe pas du doigt et des comportements répétitifs comme les mouvements en ailes de papillons ou ce qu'on appelle le flapine de la main et les intérêts restreints.

A la triade symptomatique que nous avons vu, s'ajoutent deux autres signes importants. Les bizarreries sensorielles et la dysrégulation émotionnelle et le tempérament négatif. Les bizarreries sensorielles veut dire que les sens qui sont bizarres et étranges, le goût, il a besoin de mettre tout le temps des choses dans la bouche ou par exemple, il préfère le goût sucré au goût salé.

L'odorat, il va sentir tout le temps les objets, il va les mettre au contact de son nez ou même il va sentir les personnes. Le toucher, c'est qu'il a besoin de toucher face à des personnes. Le bruit,

soit on y pose sensorialité, c'est à dire qu'il va provoquer des bruits forts, il va taper sur les portes, il va taper sur le sol et sur les tables.

On y perd sensorialité, c'est que les bruits vont les déranger, il va à chaque petit bruit, se cacher les oreilles. La lumière, c'est quelque chose qui est très fréquente, c'est que ces enfants, ils vont jouer à l'interrupteur de lumière pour éteindre et pour allumer la lumière et regarder au contact La décirculation émotionnelle, tempérament négative, ce sont des enfants qui se mettent facilement en colère, qui sont agressifs, ils vont se mordre, s'arracher les cheveux, qui vont pleurer et crier, qui ont des sous d'humeur très fréquents, tantôt il est triste, tantôt il est joyeux, avec une grande intolérance au changement et à la contrariété. Ça c'est la forme typique.

Il y en a d'autres formes. Il a des difficultés avec les autres, de jouer avec les autres et de partager des activités avec les autres et il a des difficultés des apprentissages. La forme adolescente est caractérisée par une clinique bruyante, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, qu'on peut passer à côté de l'autisme.

Les troubles de comportement sont très particuliers. La fréquence de comorbidité psychiatrique à cet âge, c'est-à-dire que l'autisme peut s'accompagner de dépressions, de troubles anxieux ou de troubles déficits selon le genre. Il y a ce qu'on appelle le camouflage symptomatique chez la fille.

La fille va montrer moins de signes cliniques que le garçon. Les filles, par la nature et le tempérament, ils s'encalment, ils s'isolent, ils jouent toutes seules, ils parlent peu et donc on peut passer à côté de l'autisme chez une fille, selon la sévérité qui est définie par le degré de besoin d'aide au quotidien. Si on a besoin d'une aide légère, ça sera un autisme léger.

L'autisme léger, c'est un enfant qui parle, qui peut faire correctement sa toilette tout seul, qui est autonome pour les repas et pour les apprentissages. La partie diagnostic Le diagnostic positif est purement clinique, c'est-à-dire que vous n'aurez besoin d'aucun marqueur radiologique, biologique ou morphologique pour poser le diagnostic. Vous, en tant que clinicien de première ligne, vous êtes capable de poser le diagnostic positif et après vous allez nous orienter c'est-à-dire faire les équipes spécialisées pédopsychiatriques ou de neurologie pédiatrique pour vous confirmer le diagnostic ou l'infirmier, pour évaluer correctement l'enfant sur d'autres aspects et troisièmement pour instaurer la prise en charge.

Le diagnostic positif clinique commence par l'anamnèse, on va déployer l'histoire de développement, on va rechercher les antécédents pour rechercher les éléments et les facteurs de risque, les autres signes cliniques et on peut s'aider d'échelle diagnostique l'ADIR entre 3 et 5 ans qui est un entretien avec les parents. On va passer en revue tout le développement de l'enfant jusqu'à l'âge actuel pour relever les choses qui sont en difficulté et les compétences aussi de l'enfant. Le CARS c'est un summite entretien, si on veut dire c'est un ADIR qui est un peu réduit, qui est résumé et qui nous permet aussi de définir où il est sévère.

La dose se fait à partir de l'âge de 12 mois, il peut se faire jusqu'à l'âge adolescent. Ce sont des entretiens avec l'enfant, des questions et aussi des mises en situation. On va observer l'enfant dans des situations de dessin ou dans des situations de jeu.

Et on cède aussi des bilans orthophoniques et psychomoteurs. Le diagnostic différentiel garder à l'esprit que chez l'enfant, toujours on élimine d'autres causes organiques avant de retenir les causes psychiatriques et développementales. Certaines affections organiques peuvent mimer le tableau de l'autisme.

Comme un déficit sensoriel, une surdité peut nous donner un retard de langage ou des troubles de comportement d'origine expressive. L'épilepsie comme le syndrome de West de l'endocléphène avec une régression de langage avec des mouvements qui sont stéréotypés et des troubles de comportement et des difficultés de communication. Les syndromes génétiques comme le retard de langage sain, comme le retard mental, comme le trouble de l'attachement ou la dépression qui vont donner des enfants qui vont s'isoler et qui vont être en retrait relationnel et le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Le diagnostic différentiel se fait par une anamnèse minutieuse, un examen somatique complet, ORL cutanée dysmorphique neurologique, par des tests et des bilans qui sont systématiques, l'avis ORL avec exploration de l'audition, un cariotype avec recherche de l'ex fragile et selon l'orientation, on peut demander un EEG ou une IRM cérébrale. Le dépistage précoce c'est une tâche qui vous sera confiée autant que clinicien de première ligne. Pensez à l'autisme à chaque évaluation clinique d'enfants en bas âge et chez la population à risque qui est définie comme on a vu tout à l'heure par certains facteurs environnementaux qui vont s'associer et se regrouper.

Les premiers signes apparaissent entre 12 mois et 18 mois et ce sont les difficultés de l'interaction sociale. Elle est difficile de parler d'enfant à risque avant de 12 mois. Les premiers signes parmi les triades symptomatiques sont les difficultés de l'interaction sociale.

L'absence d'attention conjointe. Attention conjointe veut dire que deux interlocuteurs vont regarder au même moment le même objet. Si je vous dis regarder la porte, on va la regarder tous les deux.

L'enfant autiste est incapable d'effectuer cette tâche. L'enfant autiste est susceptible du virage. L'enfant autiste ne peut pas filmer sa face car il est tremblant.

Les besoins de filmer son visage sont très importants pour s'assurer qu'il est bien éveillé. Si on ne peut pas filmer sa face c'est le problème de la dysqualification parce que lui n'a pas pas ce qu'il doit. aux parents et vous allez après conclure par un score qui va vous définir un enfant à risque d'autisme ou un enfant qui n'a pas de risque d'autisme et pour l'enfant qui a le risque d'autisme est-ce que le risque il est important ou il est moins important et de cette manière vous serez capable de préciser pour chaque enfant qu'elle conduit à tenir fer est-ce que vous allez

juste le surveiller ou est-ce que vous allez l'orienter vers une prise en charge spécialisée par exemple on prend une comme ça une question au hasard est-ce que votre enfant utilise son index pour demander quelque chose les parents vont répondre par oui ou par non et à la fin nous avons un score qui va nous définir le risque est-ce qu'il est moyen est-ce qu'il est léger est-ce qu'il est sévère et maintenant on serait capable d'orienter vers une prise en charge pour une évaluation plus poussée le traitement donc maintenant nous avons diagnostiqué un cas d'autisme nous avons éliminé tous les diagnostics différentiels comment on va traiter la prise en charge doit être précoce continue régulière et on est à plusieurs autour de l'enfant cette prise en charge elle vise à préserver les compétences et le capital cognitif de l'enfant et d'améliorer sa qualité de vie ainsi que celle de la famille les interventions psychosociales ils se font toujours en première intention nous indiquant nous recommandons une orthophonie c'est à dire une aide pour le développement de langage et de communication non verbale la psychomotricité pour stimuler ce cerveau et pour stimuler le développement psychomoteur il ya des programmes éducatifs détaillés comme l'abea le teach et le pecs ce sont des programmes éducatifs qui se basent sur les comportements par exemple l'abea c'est la modification de comportement qu'on ne veut pas qui est désagréable qui est vers un comportement qui est souhaitable par le renforcement les pecs c'est un système de communication alternative qui consiste à un échange d'images entre l'enfant et son interlocuteur pour pouvoir communiquer le teach c'est un ensemble d'activités c'est un ensemble d'organisation d'autonomie et de structuration de cadre de vie de l'enfant ainsi que de ses repères spatiaux temporels on peut des aménagements scolaires comme une éducatrice spécialisée qui va l'accompagner à l'école ou mettre l'enfant en classe intégrée et parfois on peut indiquer une psychothérapie qu'elle soit individuelle de l'enfant ou familiale de l'enfant avec sa femme voilà un exemple de la méthode pecs que vous voyez sur l'image d'en bas pour que l'enfant formule son besoin de manger c'est qu'il a faim il va mettre les trois cartes la carte de je veux la carte de pain et la carte de formule de politesse s'il te plaît sur l'image d'en haut vous voyez que l'enfant il a montré l'image de peu du chien peluche et que son interlocuteur la dame a montré le petit chien les interventions médicamenteuses sont à garder en deuxième intention c'est un traitement symptomatique c'est pas un traitement curatif on sait de neuroleptique surtout la risperidone qui est la molécule la plus prescrite ou l'aripiprazole ou l'halopéridone on va utiliser une seule molécule c'est ce que j'entends par monothérapie en dose minimale efficace avec un suivi clinique et régulier la mélatonine et un consensus international sur son efficacité dans les troubles de sommeil il n'y a aucune efficacité d'antidépresseurs d'atome oxygène de multivitamines ou d'oméga 3 donc par exemple si nous avons des troubles de sommeil on va le traiter par la mélatonine si nous avons des agitations des troubles de comportement un enfant qui est agressif envers soi ou vers les autres on peut prescrire des neuroleptiques les autres interventions c'est la guidance parentale c'est le fait d'informer les parents sur l'autisme de les soutenir les accompagner au quotidien aucune efficacité n'est prouvée d'autres méthodes bio médicales vous allez entendre parler de régime sans gluten de régime sans caseïne d'oxygène à thérapie hyper bas ce sont des choses qui n'ont pas prouvé scientifiquement leur efficacité donc ils sont à bannir vous êtes des praticiens de première ligne

et donc vous aurez à assurer un suivi médical régulier de ces enfants vous allez les évaluer sur le plan somatique et développemental vous allez évaluer les symptômes et l'évolution sous prise en charge vous allez orchestrer les avis et les interventions autour de l'enfant rappelez vous qu'on a dit qu'on est à plusieurs autour de l'enfant il ya le médecin référent il ya le pédiatre il ya le psychologue de l'enfant il ya l'orthophoniste le psychomotricien les éducatrices l'école il ya la famille on va rechercher aussi les éventuels effets secondaires du traitement et vous allez accompagner et soutenir les parents dans leur quotidien pour ce qui est du pronostic sachez que c'est un trouble chronique qui ne guérit pas c'est un trouble handicapant pour l'enfant et pour sa famille généralement si on prend en charge l'enfant de façon précoce et adaptée les troubles de comportement vont s'améliorer les difficultés interactionnelles par contre et perdure c'est à dire qu'il va rester quand même une fermeture sociale l'accès aux apprentissages est possible et il ya une fréquence de problèmes psychiatriques à l'âge adulte de l'ordre de la dépression des troubles anxieux et même de suicide les trois éléments de mauvais pronostic chez un enfant autiste sont l'absence de langage au delà de six ans la sévérité de troubles du spectre autistique et la présence conjointe d'un retard mental en conclusion vous serez amené à recevoir des enfants autistes et vous serez interpellé par les parents qui viennent chercher auprès de vous médecin une information une confirmation de diagnostic diagnostiquer un enfant comme enfant autiste est une véritable étiquette très handicapant sur l'ensemble de ces domaines de vie qu'elle soit l'autonomie qu'elle soit le développement qu'elle soit la scolarité que ce soit les relationnels donc tout l'intérêt d'évaluer soigneusement les situations de porter correctement le diagnostic et d'orienter précocement vers une prise en charge spécialisée tout cela afin de préserver les compétences de l'enfant et lui assurer une bonne qualité de vie