

# Index par lésions élémentaires

# Macule érythémateuse

Balanite candidosique 174  
Candidose génito-fessière infantile (nourrisson) 176  
Carcinome basocellulaire pagétoïde  
(carcinome basocellulaire superficiel) 451  
Cheilité actinique 437  
Cheilité consécutive à la prise systémique  
d'isotrétinoïne 345  
Cheilité de contact allergique 344  
Conjonctivite atopique 55  
Dartre sèche furfuracée 57  
Dermatite atopique : eczéma rétro-auriculaire  
infecté 49  
Dermatite atopique de l'enfance 50  
Dermatite atopique des mains chez l'adulte 56  
Dermatite atopique du visage chez le nourrisson 48  
Dermatite d'irritation aiguë 45  
Dermatite d'irritation chronique 46  
Dermatite péri-orale 314

Dermatite séborrhéique 110  
Dermatomyosite 253  
Dermatomyosite 254  
Dermatose plantaire juvénile 58  
Dermatose plantaire juvénile 59  
Dermographisme 74  
Eczéma craquelé (ou érythème craquelé) 69  
Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Eczéma de contact aigu suintant 36  
Eczéma de contact bulleux 40  
Eczéma de contact bulleux 41  
Eczéma de contact chronique d'origine  
professionnelle 37  
Eczéma de contact sec, érythématosquameux 44  
Eczéma de contact vésiculeux 38  
Eczéma de contact vésiculeux 39  
Eczéma de stase 62  
Eczéma des mamelons 52  
Eczéma dysidrosique palmaire 68  
Eczéma nummulaire (eczéma discoïde) 60



Eczéma nummulaire (eczéma discoïde) 61  
Eczéma séborrhéique de la lisière du cuir chevelu 64  
Eczéma séborrhéique du thorax 63  
Eczéma séborrhéique du visage 65  
Eczéma séborrhéique du visage 65  
Emboles septiques 127  
Engelures 331  
Eruption photo-allergique médicamenteuse 321  
Eruption phototoxique médicamenteuse 320  
Eruption psoriasiforme 323  
Erysipèle 124  
Erysipèle 125  
Erythème annulaire centrifuge (de Darier) 356  
Erythème annulaire centrifuge (de Darier) 357  
Érythème migrateur ou maladie de Lyme 128  
Érythème migrateur ou maladie de lyme 129  
Erythème pigmenté fixe 315  
Erythème polymorphe 282  
Erythème polymorphe 283  
Erythème polymorphe 284  
Erythrodermie psoriasique 216

Erythrodermie psoriasique 217  
Érythroplasie de Queyrat  
(carcinome intra-épithélial du gland) 441  
Exanthème maculo-papuleux  
(morbilliforme) 316  
Folliculite 121  
Gonococcie génitale 151  
Herpès de type I 84  
Herpès de type II (génital) 85  
Impétigo croûteux d'emblée 119  
Intertrigo 134  
Intertrigo candidosique 171  
Intertrigo candidosique 172  
Lucite polymorphe 330  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 246  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 248  
Lupus érythémateux subaigu 249  
Lupus érythémateux systémique 250  
Lupus érythémateux systémique 251  
Lupus médicamenteux induit 324  
Lymphomes malins - mycosis fongoïde 467



Maladie de Bowen 439  
Maladie de Bowen 440  
Maladie de Paget 456  
Maladie mains-pieds - bouche 104  
Maladie mains-pieds - bouche 105  
Maladie mains-pieds - bouche 106  
Mastocytoses cutanées 402  
Mastocytoses cutanées 403  
Mégalérythème épidémique 101  
Mégalérythème épidémique 102  
Métastases cutanées 457  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 373  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 374  
Nécrobiose lipoïdique 267  
Nécrobiose lipoïdique 268  
Parapsoriasis digitiforme 231  
Parapsoriasis en grandes plaques 232  
Pemphigus érythémateux 291  
Pemphigus érythémateux 292

Pityriasis lichénoïde ou "parapsoriasis en gouttes" 228  
Pityriasis rosé de Gibert 226  
Pityriasis rosé de Gibert 227  
Pityriasis versicolor 177  
Pityriasis versicolor 178  
Psoriasis des muqueuses 223  
Psoriasis des muqueuses 224  
Psoriasis des ongles 220  
Psoriasis des plis 219  
Psoriasis du cuir chevelu 221  
Psoriasis du visage (sébopsoriasis) 222  
Psoriasis palmoplantaire 218  
Psoriasis pustuleux 213  
Psoriasis pustuleux 214  
Psoriasis pustuleux 215  
Psoriasis vulgaire 205  
Psoriasis vulgaire 206  
Psoriasis vulgaire 207  
Psoriasis vulgaire 208  
Psoriasis vulgaire 209  
Psoriasis vulgaire 210



Psoriasis vulgaire 211  
Psoriasis vulgaire 212  
Pyorrhée alvéolodentaire 112  
Rosacée 312  
Rosacée 313  
Rougeole 103  
Rubéole 107  
Rubéole 107  
Sclérodermies circonscrites 255  
Syphilides papuleuses 150  
Syphilis secondaire (roséole syphilitique) 148  
Test de provocation aux gants en latex 73  
Tinea corporis 153  
Tinea corporis 154  
Tinea cruris 157  
Tinea faciei 155  
Tinea faciei 156  
Tinea manuum 158  
Tinea manuum 159  
Tinea pedum ou athlete's foot 160  
Tinea pedum ou athlete's foot 161

Urticaire au froid 76  
Urticaire figurée 80  
Urticaire papuleuse 79  
Varicelle 86  
Vasculite urticarienne 82  
Vulvo-vaginite candidosique 173  
Zona ophtalmique 89  
Zona thoracique 88

## Macule vasculaire

Angiomes 410  
Angiomes 411  
Angiomes 412  
Angiomes 413  
Angiomes 414  
Angiomes 419  
Angiosarcome de Kaposi 466

# Macule purpurique

- Atrophie cortisonique 325
- Lichen scléreux 260
- Livedo vasculitis 273
- Livedo vasculitis 274
- Périartérite noueuse 275
- Ulcère d'origine capillaritique 361
- Vasculite allergique 271
- Vasculite allergique 272

# Macules pigmentées

- Chloasma (mélasma) 328
- Erythème pigmenté fixe 315
- Erythrasma 142
- Lentigos simples (lentigines) 423
- Mastocytoses cutanées 402

- Mastocytoses cutanées 403
- Mélanome à extension superficielle (SSM) 460
- Mélanome des extrémités  
(acral lentiginous melanoma) 463
- Mélanome développé sur précancérose de Dubreuilh 462
- Mélanome malin 459
- Mélanose de Dubreuilh 445
- Métastases de mélanome 464
- Naevus bleu 430
- Naevus de Becker (naevus épidermique pigmenté et pileux; mélanose de Becker) 375
- Naevus de sutton (halo-naevus) 431
- Naevus de sutton (halo-naevus) 432
- Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 425
- Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 426
- Naevus mélanocytaires pileux 427
- Naevus pigmentaire congénital 428
- Naevus unguéal 433
- Neurocristopathies 405
- Neurocristopathies 406



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique

Taches mongoliques 424  
Xeroderma pigmentosum 444

## Macules ardoisées

Sarcoïdose 265

## Macules achromiques

Dartre sèche furfuracée 57  
Eczéma séborrhéique du thorax 63  
Leucoplasie (nicotinique) 438  
Lichen plan buccal 237  
Lichen plan buccal 236  
Lichen scléreux 260  
Lichen scléreux 261  
Muguet 169

Naevus de sutton (halo-naevus) 431  
Naevus de sutton (halo-naevus) 431  
Naevus de sutton (halo-naevus) 432  
Pityriasis versicolor 179  
Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) 242  
Sclérodermies circonscrites 255

## Papules épidermiques

Gale humaine ou scabiose 186  
Gonococcie génitale 151  
Leucoplasie chevelue 97  
Maladie de Darier 346  
Molluscum contagiosum 98  
Molluscum contagiosum 113  
Molluscums contagiosums multiples 99  
Papulose Bowenoïde 442  
Verrues vulgaires 90

# Papules dermatiques

Acné infantile (Acne infantum) 311  
Acné vulgaire 305  
Acné vulgaire 306  
Adénomes sébacés séniles (hyperplasies sébacées) 384  
Adénomes sébacés séniles (hyperplasies sébacées) 385  
Angiomes 415  
Dermatite herpétiforme 294  
Dermatite herpétiforme 295  
Dermatite péri-orale 314  
Dermographisme 74  
Eruption acnéiforme du visage 322  
Eruption photo-allergique médicamenteuse 321  
Erythema elevatum diutinum 276  
Folliculite 121  
Furoncle 122  
Gale animale 187  
Grains de milium 382  
Larva migrans (larbisch 201

Larva migrans (larbisch) 200  
Leishmaniose 197  
Leishmaniose 198  
Lucite estivale bénigne 329  
Lucite polymorphe 330  
Lupus érythémateux systémique 251  
Maladie de Jessner et Kanof 252  
Maladie de Kaposi 114  
Maladie de Kaposi 115  
Mastocytoses cutanées 402  
Mastocytoses cutanées 403  
Mégalérythème épidémique 101  
Mégalérythème épidémique 102  
Oedème de quincke (urticaire profonde) 81  
Papules ortiéées 78  
Parapsoriasis varioliforme 229  
Parapsoriasis varioliforme 230  
Pemphigoïde bulleuse 287  
Piqûres de puces 195  
Prick test au latex 72  
Prurigo strophulus 194



Rosacée 313  
Rougeole 103  
Sporotrichose 180  
Syphilides papuleuses 150  
Syphilis secondaire tardive 149  
Syringomes 387  
Test de provocation aux gants en latex 73  
Tricho-épithéliomes 383  
Trombiculose 192  
Trombiculose 193  
Urticaire à la pression 75  
Urticaire au froid 76  
Urticaire de contact au latex 71  
Urticaire figurée 80  
Urticaire papuleuse 79  
Urticaire solaire 77  
Vasculite allergique 270  
Vasculite allergique 271  
Vasculite allergique 272  
Vasculite urticarienne 82  
Vasculites 269

Xanthélasma 399  
Xanthomes tubéreux 397  
Xanthomes tubéreux 398

## Papules dermo-épidermiques

Dermatite atopique de l'adulte :  
xérose, lichénifications et prurigo 54  
Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Eczéma des mamelons 52  
Eruptions lichénoïdes 318  
Eruptions lichénoïdes 319  
Erythème polymorphe 282  
Erythème polymorphe 283  
Erythème polymorphe 284  
Lichen plan cutané simple 233



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Lichen plan cutané simple 234  
Lichen plan cutané simple 235  
Lichen scléreux 259  
Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 425  
Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 426  
Naevus mélanocytaires pileux 427  
Naevus pigmentaire congénital 428  
Orf 100  
Prurigo excorié 244  
Prurigo excorié 245  
Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) 241  
Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) 242

## Nodules

Acanthome à cellules claires 376  
Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 378  
Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 379  
Acné conglobata 309

Acné conglobata 310  
Acné vulgaire 305  
Acné vulgaire 308  
Angiomes 413  
Angiomes 414  
Angiomes 416  
Angiomes 417  
Angiomes 418  
Angiosarcome de Kaposi 466  
Anthrax 123  
Bécigite 138  
Bromides et iodides (halogénides) 326  
Carcinome basocellulaire nodulaire 447  
Carcinome basocellulaire pigmenté 450  
Carcinome basocellulaire plan cicatriciel ("sclérodermiforme") 449  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Carcinome spinocellulaire de la verge 455  
Carcinome spinocellulaire du visage 453  
Carcinomes spinocellulaires 452  
Cellulite rétro-orbitaire 126



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Cylindromes 390  
Erythema elevatum diutinum 276  
Erythème noueux 277  
Erythème noueux 278  
Fibrosarcome de Darier-Ferrand  
  (dermatofibrosarcome protuberans) 465  
Gale humaine ou scabiose 185  
Granulome annulaire 266  
Histiocytofibrome (fibrome cutané) 391  
Histiocytofibrome (fibrome cutané) 392  
Hypodermites nodulaires 279  
Kérato-acanthome 377  
Kérion de celse 164  
Kérion de celse 165  
Kyste épidermoïde 380  
Kyste trichilemmal (kyste pilaire) 381  
Lipomes 400  
Lymphomes malins - mycosis fongoïde 467  
Maladie de Kaposi 114  
Maladie de Kaposi 115  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 133

Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 132  
Mélanome des extrémités  
  (acral lentiginous melanoma) 463  
Mélanome développé sur précancérose  
  de Dubreuilh 462  
Mélanome malin 459  
Mélanome nodulaire 461  
Mélanome nodulaire 461  
Métastases cutanées 457  
Métastases cutanées 458  
Métastases de mélanome 464  
Mycétome (pied de madura) 181  
Mycobactériose par mycobacterium chelonei 141  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 139  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 140  
Naevus bleu 430  
Naevus juvénile de Spitz 429  
Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 426  
Naevus mélanocytaires pileux 427  
Naevus pigmentaire congénital 428  
Naevus sébacé de Jadassohn (hamartome sébacé) 386



Neurocristopathies 404  
Neurocristopathies 405  
Neurocristopathies 406  
Neurocristopathies 407  
Nodule douloureux de l'oreille 421  
Périartérite noueuse 275  
Porome eccrine 388  
Porome eccrine 389  
Prurigo 111  
Pseudo-kyste mucoïde 422  
Pseudolymphome à type de borreliose 130  
Sarcoïdose 262  
Sarcoïdose 263  
Sarcoïdose 264  
Sarcoïdose 265  
Sporotrichose 180  
Syndrome de sweet  
    (dermatose aiguë fébrile neutrophilique) 286  
Tungose ou puce chique 202  
Tungose ou puce chique 203  
Ulcus rodens 448

Xanthogranulome juvénile 396  
Xanthomes tubéreux 397  
Xanthomes tubéreux 398  
Xeroderma pigmentosum 444

## Tubercules

Acanthome à cellules claires 376  
Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 378  
Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 379  
Acné conglobata 309  
Acné conglobata 310  
Acné vulgaire 305  
Acné vulgaire 308  
Angiomes 413  
Angiomes 414  
Angiomes 416  
Angiomes 417  
Angiomes 418

Angiosarcome de Kaposi 466  
Anthrax 123  
Bécigite 138  
Bromides et iodides (halogénides) 326  
Carcinome basocellulaire nodulaire 447  
Carcinome basocellulaire pigmenté 450  
Carcinome basocellulaire plan cicatriciel ("sclérodermiforme") 449  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Carcinome spinocellulaire de la verge 455  
Carcinome spinocellulaire du visage 453  
Carcinomes spinocellulaires 452  
Cellulite rétro-orbitaire 126  
Cylindromes 390  
Erythema elevatum diutinum 276  
Erythème noueux 277  
Erythème noueux 278  
Fibrosarcome de Darier-Ferrand (dermatofibrosarcome protuberans) 465  
Gale humaine ou scabiose 185  
Granulome annulaire 266

Histiocytofibrome (fibrome cutané) 391  
Histiocytofibrome (fibrome cutané) 392  
Hypodermites nodulaires 279  
Kérato-acanthome 377  
Kérian de celse 164  
Kérian de celse 165  
Kyste épidermoïde 380  
Kyste trichilemmal (kyste pilaire) 381  
Lipomes 400  
Lymphomes malins - mycosis fongoïde 467  
Maladie de Kaposi 114  
Maladie de Kaposi 115  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 133  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 132  
Mélanome des extrémités (acral lentiginous melanoma) 463  
Mélanome développé sur précancérose de Dubreuilh 462  
Mélanome malin 459  
Mélanome nodulaire 461  
Mélanome nodulaire 461



Métastases cutanées 457  
Métastases cutanées 458  
Métastases de mélanome 464  
Mycétome (pied de madura) 181  
Mycobactériose par mycobacterium chelonei 141  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 139  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 140  
Naevus bleu 430  
Naevus juvénile de Spitz 429  
Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires) 426  
Naevus mélanocytaires pileux 427  
Naevus pigmentaire congénital 428  
Naevus sébacé de Jadassohn (hamartome sébacé) 386  
Neurocristopathies 404  
Neurocristopathies 405  
Neurocristopathies 406  
Neurocristopathies 407  
Nodule douloureux de l'oreille 421  
Périartérite noueuse 275

Porome eccrine 388  
Porome eccrine 389  
Prurigo 111  
Pseudo-kyste mucoïde 422  
Pseudolymphome à type de borreliose 130  
Sarcoïdose 262  
Sarcoïdose 263  
Sarcoïdose 264  
Sarcoïdose 265  
Sporotrichose 180  
Syndrome de sweet  
    (dermatose aiguë fébrile neutrophilique) 286  
Tungose ou puce chique 202  
Tungose ou puce chique 203  
Ulcus rodens 448  
Xanthogranulome juvénile 396  
Xanthomes tubéreux 397  
Xanthomes tubéreux 398  
Xeroderma pigmentosum 444



# Végétations

Condylomes acuminés 116  
Condylomes acuminés 93  
Hyperplasie gingivale 327  
Langue noire villeuse 341

# Verrucosités

Acrokératose paranéoplasique de Bazex 470  
Angiomes 419  
Fibrokératome digital acquis 393  
Leucoplasie (nicotinique) 438  
Lichen plan cutané verruqueux 238  
Lichen plan cutané verruqueux 239  
Naevus épidermique verruqueux  
(hamartome épidermique) 371

Naevus épidermique verruqueux  
(hamartome épidermique) 372  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire  
et linéaire (N.E.V.I.L.) 373  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire  
et linéaire (N.E.V.I.L.) 374  
Neurocristopathies 408  
Papillome corné filiforme 96  
Verrues plantaires en mosaïque 95  
Verrues séborrhéiques (kératoses séborrhéiques) 369  
Verrues séborrhéiques (kératoses séborrhéiques) 370  
Verrues vulgaires 90

# Kératoses

Acné infantile (Acne infantum) 311  
Acné vulgaire 305  
Acné vulgaire 307  
Acrokératose paranéoplasique de Bazex 470

Angiomes 415  
Angiomes 419  
Dermatite d'irritation chronique 46  
Dermatite d'irritation chronique palmaire 47  
Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle 37  
Kératodermie palmo-plantaire héréditaire (maladie de Thost-Unna) 351  
Kératose pilaire (kératose folliculaire rouge atrophiante) 354  
Kératose pilaire (kératose folliculaire rouge atrophiante) 355  
Kératoses actiniques 435  
Kératoses actiniques 436  
Lichénification 243  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 246  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 247  
Maladie de Darier 346  
Naevus épidermique verruqueux (hamartome épidermique) 371

Naevus épidermique verruqueux (hamartome épidermique) 372  
Nodule douloureux de l'oreille 421  
Pityriasis rubra pilaire 352  
Pityriasis rubra pilaire 353  
Verrue plantaire 94  
Verrues séborrhéiques (kératoses séborrhéiques) 369  
Verrues séborrhéiques (kératoses séborrhéiques) 370  
Verrues vulgaires 90  
Xeroderma pigmentosum 444

## Vésicules

Dermatite atopique du visage chez le nourrisson 48  
Dermatite herpétiforme 294  
Dermatite herpétiforme 295  
Dermatose phototoxique bulleuse (dermite des prés) 304  
Dysidrose bulleuse palmaire 67



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Dysidrose des doigts 66  
Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Eczéma de contact aigu suintant 36  
Eczéma de contact bulleux 40  
Eczéma de contact bulleux 41  
Eczéma de contact vésiculeux 38  
Eczéma de contact vésiculeux 39  
Eczéma des mamelons 52  
Eczéma dysidrosique palmaire 68  
Eczéma nummulaire (eczéma discoïde) 60  
Eruption photo-allergique médicamenteuse 321  
Herpès de type I 84  
Herpès de type II (génital) 85  
Leishmaniose 197  
Leishmaniose 198  
Lymphangiome 420  
Maladie mains-pieds - bouche 104  
Maladie mains-pieds - bouche 105  
Maladie mains-pieds - bouche 106

Pemphigus chronique bénin familial  
(maladie de Hailey-Hailey) 293  
Prurigo strophulus 194  
Tinea cruris 157  
Varicelle 86  
Zona ophtalmique 89  
Zona thoracique 88

## Bulles

Bulloze des diabétiques 301  
Dermatite herpétiforme 294  
Dermatite herpétiforme 295  
Dermatose à IgA linéaires 296  
Dermatose phototoxique bulleuse  
(dermite des prés) 304  
Dysidrose bulleuse palmaire 67  
Eczéma de contact bulleux 40  
Eczéma de contact bulleux 41

Epidermolyses bulleuses dystrophiques 299  
Epidermolyses bulleuses dystrophiques 300  
Epidermolyses bulleuses simples  
(non dystrophiques) 297  
Epidermolyses bulleuses simples  
(non dystrophiques) 298  
Erythème pigmenté fixe 315  
Erythème polymorphe 284  
Impétigo bulleux 118  
Pemphigoïde bulleuse 287  
Pemphigoïde bulleuse 288  
Pemphigus auto-immuns 289  
Pemphigus chronique bénin familial  
(maladie de Hailey-Hailey) 293  
Pemphigus érythémateux 291  
Pemphigus érythémateux 292  
Piqûres de puces 196  
Porphyrie cutanée tardive 302  
Syndrome de lyell (nécrolyse épidermique toxique) 317  
Zona thoracique 88

## Pustules

Acné conglobata 309  
Acné conglobata 310  
Acné infantile (Acne infantum) 311  
Acné vulgaire 305  
Acné vulgaire 306  
Anthrax 123  
Aphtes, aphtose, maladie de Behçet 340  
Bromides et iodides (halogénides) 326  
Dermatite péri-orale 314  
Emboles septiques 127  
Eruption acnéiforme du visage 322  
Folliculite 121  
Furoncle 122  
Gale humaine ou scabiose 186  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire  
et linéaire (N.E.V.I.L.) 373  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire  
et linéaire (N.E.V.I.L.) 374



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique

Parapsoriasis varioliforme 229  
Parapsoriasis varioliforme 230  
Périmyxis et onyxis candidosiques 175  
Psoriasis pustuleux 213  
Psoriasis pustuleux 214  
Psoriasis pustuleux 215  
Pyoderma gangrenosum 280  
Pyoderma gangrenosum 281  
Rosacée 313

## Squames

Carcinome basocellulaire pagétoïde  
(carcinome basocellulaire superficiel) 451  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Cheilité actinique 437  
Cheilité atopique 53  
Cheilité de contact allergique 344  
Dartre sèche furfuracée 57

Dermatite atopique des mains chez l'adulte 56  
Dermatite d'irritation chronique 46  
Dermatite séborrhéique 110  
Dermatose plantaire juvénile 58  
Dermatose plantaire juvénile 59  
Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle 37  
Eczéma de contact sec, érythématosquameux 44  
Eczéma de stase 62  
Eczéma dysidrosique palmaire 68  
Eczéma nummulaire (eczéma discoïde) 61  
Eczéma séborrhéique de la lisière du cuir chevelu 64  
Eczéma séborrhéique du thorax 63  
Eczéma séborrhéique du visage 65  
Eruption psoriasiforme 323  
Eruptions lichénoïdes 318  
Eruptions lichénoïdes 319  
Erythrasma 142  
Erythrodermie psoriasique 216  
Erythrodermie psoriasique 217  
Ichtyose liée au sexe 349



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

causes

lésions élémentaires

image

alphabétique

Ichtyose liée au sexe 350  
Ichtyose vulgaire 348  
Intertrigo candidosique 171  
Intertrigo candidosique 172  
Kérotoses actiniques 435  
Kérotoses actiniques 436  
Lupus érythémateux subaigu 249  
Maladie de Bowen 439  
Maladie de Bowen 440  
Maladie de Paget 456  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 373  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 374  
Parapsoriasis digitiforme 231  
Parapsoriasis en grandes plaques 232  
Pemphigus érythémateux 291  
Pemphigus érythémateux 292  
Pityriasis lichenoïde ou "parapsoriasis en gouttes" 228  
Pityriasis rosé de Gibert 226  
Pityriasis rosé de Gibert 227

Pityriasis versicolor 177  
Pityriasis versicolor 178  
Psoriasis des ongles 220  
Psoriasis des plis 219  
Psoriasis du cuir chevelu 221  
Psoriasis du visage (sébopsoriasis) 222  
Psoriasis palmoplantaire 218  
Psoriasis pustuleux 214  
Psoriasis pustuleux 215  
Psoriasis vulgaire 205  
Psoriasis vulgaire 206  
Psoriasis vulgaire 207  
Psoriasis vulgaire 208  
Psoriasis vulgaire 209  
Psoriasis vulgaire 210  
Psoriasis vulgaire 211  
Psoriasis vulgaire 212  
Syphilides papuleuses 150  
Tinea capitis ou teigne 163  
Tinea corporis 153  
Tinea corporis 154



Tinea cruris 157  
Tinea faciei 155  
Tinea faciei 156  
Tinea manuum 158  
Tinea manuum 159  
Tinea pedum ou athlete's foot 160  
Tinea pedum ou athlete's foot 161  
Tinea pedum ou athlete's foot 162  
Vulvo-vaginite candidosique 173

## Croûtes

Automutilation à type de pathomimie 366  
Automutilation à type de pathomimie 367  
Automutilation cutanée à type de simulation 364  
Automutilation cutanée à type de simulation 365  
Bromides et iodides (halogénides) 326  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Cellulite rétro-orbitaire 126

Cheilite actinique 437  
Dermatite atopique : eczéma rétro-auriculaire infecté 49  
Ecthyma 120  
Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Eczéma nummulaire (eczéma discoïde) 60  
Epidermolyses bulleuses dystrophiques 299  
Herpès de type II (génital) 85  
Impétigo bulleux 118  
Impétigo croûteux d'emblée 119  
Maladie de Bowen 439  
Maladie de Bowen 440  
Maladie de Paget 456  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 133  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 132  
Parapsoriasis varioliforme 229  
Parapsoriasis varioliforme 230  
Pédiculose 188  
Pemphigus érythémateux 291  
Pemphigus érythémateux 292



Ulcère d'origine capillaritique 361  
Ulcère de jambe d'origine artérielle 360  
Varicelle 86

# Excoriations (ou exulcérations)

Chancre syphilitique 146  
Chancre syphilitique 147  
Dermatite atopique de l'adulte :  
  xérose, lichénifications et prurigo 54  
Dermatite atopique des plis chez l'enfant 51  
Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Gale humaine ou scabiose 184  
Kératolyse ponctuée 144  
Lichénification 243  
Muguet 169

Prurigo 111  
Prurigo excorié 244  
Prurigo excorié 245

# Fissures

Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 378  
Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma) 379  
Cheilite atopique 53  
Cheilite consécutive à la prise systémique  
  d'isotrétinoïne 345  
Dermatite atopique : eczéma rétro-auriculaire  
  infecté 49  
Dermatite atopique de l'enfance 50  
Dermatite atopique des mains chez l'adulte 56  
Dermatite d'irritation chronique 46  
Dermatite d'irritation chronique palmaire 47  
Dermatose plantaire juvénile 58  
Dermatose plantaire juvénile 59



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Eczéma craquelé (ou érythème craquelé) 69  
Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle 37  
Pemphigus chronique bénin familial (maladie de Hailey-Hailey) 293  
Perlèche 170  
Tinea pedum ou athlete's foot 160  
Tinea pedum ou athlete's foot 161

## Ulcérations

Acné conglobata 309  
Acné conglobata 310  
Aphtes, aphtose, maladie de Behçet 338  
Aphtes, aphtose, maladie de Behçet 339  
Automutilation à type de pathomimie 366  
Automutilation à type de pathomimie 367  
Automutilation cutanée à type de simulation 364  
Automutilation cutanée à type de simulation 365

Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Dermatose à IgA linéaires 296  
Ecrouelles 137  
Ecthyma 120  
Epidermolyses bulleuses dystrophiques 299  
Erythème polymorphe 285  
Langue géographique (glossite exfoliatrice marginée) 343  
Lichen plan buccal 237  
Lymphomes malins - mycosis fongoïde 468  
Mal perforant plantaire (ulcère neurotrophique) 362  
Mal perforant plantaire (ulcère neurotrophique) 363  
Maladie des griffures de chat (cat scratch disease) 133  
Mycobactériose par mycobacterium chelonei 141  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 139  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 140  
Pemphigus auto-immuns 289  
Pemphigus vulgaire 290  
Porphyrie cutanée tardive 302  
Pyoderma gangrenosum 280  
Pyoderma gangrenosum 281



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique

Pyorrhée alvéolodentaire 112  
Radiodermite 443  
Syndrome de lyell (nécrolyse épidermique toxique) 317  
Ulcère d'origine capillaritique 361  
Ulcère de jambe d'origine veineuse 358  
Ulcère de jambe d'origine veineuse 359  
Ulcère de jambe d'origine artérielle 360  
Ulcus rodens 448  
Zona nécrotique 108

## Gangrène

Infection par proteus 131  
Livedo vasculitis 274  
Livedo vasculitis 273  
Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 373

Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.) 374  
Vasculite allergique 272  
Zona nécrotique 108

## Atrophie

Atrophie cortisonique 325  
Carcinome basocellulaire plan cicatriciel ("sclérodermiforme") 449  
Etats pseudopeladiques 335  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 248  
Nécrobiose lipoïdique 267  
Nécrobiose lipoïdique 268  
Radiodermite 443  
Sclérodermies circonscrites 256  
Ulcère d'origine capillaritique 361  
Ulcère de jambe d'origine veineuse 358  
Xeroderma pigmentosum 444



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

# Cicatrice

Acné conglobata 309  
Acné conglobata 310  
Acné vulgaire 308  
Atrophie cortisonique 325  
Automutilation cutanée à type de simulation 364  
Automutilation cutanée à type de simulation 365  
Cheilite consécutive a la prise systémique  
d'isotrétinoïne 345  
Chéloïde 394  
Ecrouelles 137  
Etats pseudopeladiques 335  
Kérion de celse 166

Leishmaniose 199  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 248  
Lupus tuberculeux 135  
Naevus épidermique verrueux inflammatoire  
et linéaire (N.E.V.I.L.) 373  
Nécrobiose lipoïdique 267  
Nécrobiose lipoïdique 268  
Parapsoriasis varioliforme 229  
Parapsoriasis varioliforme 230  
Porphyrie cutanée tardive 303  
Radiodermite 443  
Sclérodermies circonscrites 256  
Varicelle 87  
Zona nécrotique 109



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

# Sclérose

Carcinome basocellulaire plan cicatriciel  
("sclérodermiforme") 449

Lichen scléreux 259

Lichen scléreux 260

Lichen scléreux 261  
Nécrobiose lipoïdique 267  
Nécrobiose lipoïdique 268  
Sclérodermie généralisée (systémique) 257  
Sclérodermie généralisée (systémique) 258  
Sclérodermies circonscrites 255  
Sclérodermies circonscrites 256

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

# Index par causes



dernière page vue



précédente



suivante

# Facteurs mécaniques

Acanthome fissuré  
(spectacle frame acanthoma) ,378

Acanthome fissuré  
(spectacle frame acanthoma) ,379

Angiomes ,418

Automutilation à type de pathomimie ,366

Automutilation à type de pathomimie ,367

Automutilation cutanée à type de simulation ,364

Automutilation cutanée à type de simulation ,365

Chéloïde ,394

Dermatite atopique de l'adulte :  
xérose, lichénifications et prurigo ,54

Dermatite d'irritation chronique palmaire ,47

Dermographisme ,74

Epidermolyses bulleuses dystrophiques ,299

Epidermolyses bulleuses dystrophiques ,300

Epidermolyses bulleuses simples  
(non dystrophiques) ,297

Epidermolyses bulleuses simples  
(non dystrophiques) ,298

Fibrokératome digital acquis ,393

Histiocytofibrome (fibrome cutané) ,391

Histiocytofibrome (fibrome cutané) ,392

Lichen plan cutané simple ,235

Lichénification ,243

Maladie des griffures de chat  
(cat scratch disease) ,133

Maladie des griffures de chat  
(cat scratch disease) ,132

Mycobactériose par mycobacterium  
chelonei ,141

Nodule douloureux de l'oreille ,421

Porphyrie cutanée tardive ,302

Porphyrie cutanée tardive ,303

Psoriasis vulgaire ,212

Sarcoïdose ,265

Trichotillomanie ,336

Urticaire à la pression ,75



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

# Chaleur

Engelures 331  
Rosacée 312  
Rosacée 313

# Froid

Engelures 331  
Lupus érythémateux systémique 251  
Urticaire au froid 76

# Soleil, ultraviolets

Adénomes sébacés séniles  
(hyperplasies sébacées) 384

Adénomes sébacés séniles  
(hyperplasies sébacées) 385  
Carcinome basocellulaire nodulaire 447  
Carcinome basocellulaire pigmenté 450  
Carcinome basocellulaire plan cicatriciel  
("sclérodermiforme") 449  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure 454  
Carcinome spinocellulaire du visage 453  
Carcinomes spinocellulaires 452  
Cheilité actinique 437  
Chloasma (mélasma) 328  
Dermatose phototoxique bulleuse  
(dermite des prés) 304  
Eruption photo-allergique médicamenteuse 321  
Eruption phototoxique médicamenteuse 320  
Ichtyose vulgaire 348  
Kérato-acanthome 377  
Kératose pilaire  
(kératose folliculaire rouge atrophiante) 354  
Kératose pilaire  
(kératose folliculaire rouge atrophiante) 355



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Kératoses actiniques 435  
Kératoses actiniques 436  
Lucite estivale bénigne 329  
Lucite polymorphe 330  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 246  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 247  
Lupus érythémateux chronique ("discoïde") 248  
Lupus érythémateux subaigu 249  
Lupus érythémateux systémique 250  
Maladie de Darier 346  
Maladie de Darier 347  
Mélanome développé sur précancerose de Dubreuilh 462  
Mélanose de Dubreuilh 445  
Porphyrie cutanée tardive 302  
Porphyrie cutanée tardive 303  
Ulcus rodens 448  
Urticaire solaire 77  
Xeroderma pigmentosum 444

# Rayons X

Radiodermite 443

# Agents chimiques

Atrophie cortisonique 325  
Bécigite 138  
Bromides et iodides (halogénides) 326  
Cheilite consécutive à la prise systémique d'isotrétinoïne 345  
Cheilite de contact allergique 344  
Chloasma (mélasma) 328  
Dermatite d'irritation aiguë 45  
Dermatite d'irritation chronique 46  
Dermatite d'irritation chronique palmaire 47  
Dermatose phototoxique bulleuse (dermite des prés) 304



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Eczéma croûteux 42  
Eczéma croûteux 43  
Eczéma de contact aigu suintant 36  
Eczéma de contact bulleux 40  
Eczéma de contact bulleux 41  
Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle 37  
Eczéma de contact sec, érythématosquameux 44  
Eczéma de contact vésiculeux 38  
Eczéma de contact vésiculeux 39  
Eruption acnéiforme du visage 322  
Eruption photo-allergique médicamenteuse 321  
Eruption phototoxique médicamenteuse 320  
Eruption psoriasiforme 323  
Eruptions lichénoïdes 318  
Eruptions lichénoïdes 319  
Erythème pigmenté fixe 315  
Exanthème maculo-papuleux (morbilliforme) 316  
Hyperplasie gingivale 327  
Leucoplasie (nicotinique) 438  
Lupus médicamenteux induit 324

Papules ortiéées 78  
Pemphigus érythémateux 291  
Pemphigus érythémateux 292  
Prick test au latex 72  
Syndrome de lyell (nécrolyse épidermique toxique) 317  
Test de provocation aux gants en latex 73  
Urticaire de contact au latex 71  
Urticaire figurée 80  
Urticaire papuleuse 79

## Infection

Anthrax 123  
Balanite candidosique 174  
Candidose génito-fessière infantile (nourrisson) 176  
Cellulite rétro-orbitaire 126  
Chancre syphilitique 146  
Chancre syphilitique 147  
Condylomes acuminés 116



Condylomes acuminés 93  
Dermatite séborrhéique 110  
Ecrouelles 137  
Ecthyma 120  
Emboles septiques 127  
Erysipèle 124  
Erysipèle 125  
Érythème migrateur ou maladie de Lyme 128  
Érythème migrateur ou maladie de lyme 129  
Erythrasma 142  
Folliculite 121  
Furoncle 122  
Gale animale 187  
Gale humaine ou scabiose 183  
Gale humaine ou scabiose 184  
Gale humaine ou scabiose 185  
Gale humaine ou scabiose 186  
Gonococcie génitale 151  
Herpès de type I 84  
Herpès de type II (génital) 85  
Impétigo bulleux 118

Impétigo croûteux d'emblée 119  
Infection par proteus 131  
Intertrigo 134  
Intertrigo candidosique 171  
Intertrigo candidosique 172  
Kératolyse ponctuée 144  
Kérian de celse 164  
Kérian de celse 165  
Kérian de celse 166  
Larva migrans (larbush 201  
Larva migrans (larbush) 200  
Leishmaniose 197  
Leishmaniose 198  
Leishmaniose 199  
Leucoplasie chevelue 97  
Lupus tuberculeux 135  
Lupus tuberculeux 136  
Maladie de Kaposi 114  
Maladie de Kaposi 115  
Maladie des griffures de chat  
(cat scratch disease) 132



Maladie mains-pieds - bouche 104  
Maladie mains-pieds - bouche 105  
Maladie mains-pieds - bouche 106  
Mégalérythème épidémique 101  
Mégalérythème épidémique 102  
Molluscum contagiosum 98  
Molluscum contagiosum 113  
Molluscums contagiosums multiples 99  
Morpions 190  
Morpions 191  
Muguet 169  
Mycétome (pied de madura) 181  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 139  
Mycobactériose par mycobacterium marinum 140  
Onychomycose à dermatophytes 167  
Onychomycose à dermatophytes 168  
Orf 100  
Papillome corné filiforme 96  
Pédiculose 188  
Pédiculose 189  
Péronyxis et onyxis candidosiques 175

Perlèche 170  
Piqûres de puces 195  
Piqûres de puces 196  
Pityriasis versicolor 177  
Pityriasis versicolor 178  
Pityriasis versicolor 179  
Prurigo 111  
Prurigo strophulus 194  
Pseudolymphome a type de borreliose 130  
Pyorrhée alvéolodentaire 112  
Rougeole 103  
Rubéole 107  
Sporotrichose 180  
Syphilides papuleuses 150  
Syphilis secondaire tardive 149  
Syphilis secondaire (roséole syphilitique) 148  
Tinea capitis ou teigne 163  
Tinea corporis 153  
Tinea corporis 154  
Tinea cruris 157  
Tinea faciei 155



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique

Tinea faciei 156  
Tinea manuum 158  
Tinea manuum 159  
Tinea pedum ou athlete's foot 160  
Tinea pedum ou athlete's foot 161  
Tinea pedum ou athlete's foot 162  
Trichomycose axillaire 143  
Trombiculose 192  
Trombiculose 193  
Tungose ou puce chique 202  
Tungose ou puce chique 203  
Varicelle 86

Varicelle 87  
Verrue plantaire 94  
Verrues planes 91  
Verrues planes 92  
Verrues plantaires en mosaïque 95  
Verrues vulgaires 90  
Vulvo-vaginite candidosique 173  
Zona nécrotique 108  
Zona nécrotique 109  
Zona ophtalmique 89  
Zona thoracique 88



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

# Index alphabétique

alphabétique

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

# A

Acanthome à cellules claires, 376  
Acanthome fissuré, 378–379  
Acné comédonienne, 307  
Acné conglobata, 309–310  
Acné et rosacée, 305–314  
Acné infantile (*Acne infantum*), 311  
Acné nodulo-kystique, 308  
Acné papulo-pustuleuse, 306  
Acné vulgaire, 305–308  
Acrokératose, 470  
Acrokératose paranéoplasique de Bazex, 470  
Adénomes sébacés séniles, 384–385  
Alopécie, 333–337  
Alopécie androgénogénétique, 337  
Angiokératome, 415  
Angiome, 410–419  
Angiome plan, 412  
Angiome sous-cutané, 414

Angiome stellaire, 410  
Angiome tubéreux, 413  
Angiosarcome de Kaposi, 466  
Anthrax, 123  
Aphtes, 338  
Aphtes, aphtose, maladie de Behçet, 338–340  
Arthropodes, 182  
Athlete's foot, 160–162  
Atrophie, 32  
Atrophie cortisonique, 325  
Automutilation à type de pathomimie, 366–367  
Automutilation cutanée à type de simulation, 364–365

# B

Balanite candidosique, 174  
Bazex, 470  
Bécégite, 138  
Becker, 375



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

Behçet, maladie de, 338–340  
Borreliose, 128–130  
Botriomycome, 418  
Bourneville, 407  
Bowen, maladie de, 439–440  
Bromides et iodides (halogénides), 326  
Bulles, 24  
Bullose des diabétiques, 301

## C

Candidose, 169–176  
Candidose génito-fessière infantile, 176  
Carcinome basocellulaire, 447–451  
Carcinome basocellulaire nodulaire, 447  
Carcinome basocellulaire pagétoïde, 451  
Carcinome basocellulaire pigmenté, 450  
Carcinome basocellulaire plan cicatriciel, 449  
Carcinome basocellulaire superficiel, 451

Carcinome intra-épithélial du gland, 441  
Carcinome spinocellulaire, 452–455  
Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure, 454  
Carcinome spinocellulaire de la verge, 455  
Carcinome spinocellulaire du visage, 453  
Cat scratch disease, 132–133  
Cellulite rétro-orbitaire, 126  
Chancre syphilitique, 146–147  
Cheilite, 53, 344–345, 437  
Cheilite actinique, 437  
Cheilite atopique, 53  
Cheilite consécutive, 345  
Cheilite de contact allergique, 344  
Chéloïde, 394  
Chloasma (mélasma), 328  
Cicatrice, 33  
Condylomes acuminés, 93, 116  
Conjonctivite atopique, 55  
Corynébactérioses, 142–144  
Croûtes, 27  
Cylindromes, 390



a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

# D

- Darier, maladie de, 346–347  
Darier-Ferrand, Fibrosarcome de, 465–466  
Dartre sèche furfuracée, 57  
Dermatite atopique, 48–56  
Dermatite atopique de l'adulte, 54  
Dermatite atopique de l'enfance, 50  
Dermatite atopique des mains chez l'adulte, 56  
Dermatite atopique des plis chez l'enfant, 51  
Dermatite atopique du visage chez le nourrisson, 48  
Dermatite d'irritation aiguë, 45  
Dermatite d'irritation chronique, 46  
Dermatite d'irritation chronique palmaire, 47  
Dermatite herpétiforme, 294–295  
Dermatite péri-orale, 314  
Dermatite séborrhéique, 63, 110  
Dermatites d'irritation, 36  
Dermatofibrosarcome protuberans, 465–466  
Dermatologie topographique – chapitre, 332

- Dermatologie topographique divers, 346–357  
Dermatomyosite, 253–254  
Dermatophyties, 153–168  
Dermatose à IgA linéaires, 296  
Dermatose phototoxique bulleuse, 304  
Dermatose plantaire juvénile, 58–59  
Dermatoses dues a des agents physiques, 329–331  
Dermographisme, 74  
Dubreuilh, 462  
Dysidrose bulleuse palmaire, 67  
Dysidrose des doigts, 66  
Dysidrose et eczéma dysidrosique, 66–68

# E

- Ecrouelles, 137  
Ecthyma, 120  
Eczéma – chapitre, 35



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

Eczéma constitutionnel ou dermatite atopique, 48–58  
Eczéma craquelé (ou érythème craquelé), 69  
Eczéma croûteux, 42–43  
Eczéma de contact aigu suintant, 36  
Eczéma de contact bulleux, 40–41  
Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle, 37  
Eczéma de contact sec, érythématosquameux, 44  
Eczéma de contact vésiculeux, 38–39  
Eczéma de stase, 62  
Eczéma des mamelons, 52  
Eczéma discoïde, 60–61  
Eczéma dysidrosique, 66  
Eczéma dysidrosique palmaire, 68  
Eczéma nummulaire (eczéma discoïde), 60–61  
Eczéma rétro-auriculaire infecté, 49  
Eczéma séborrhéique (dermatite séborrhéique), 63–65  
Eczéma séborrhéique de la lisière du cuir chevelu, 64

Eczéma séborrhéique du thorax, 63  
Eczéma séborrhéique du visage, 65  
Eczémas de contact allergiques et dermatites d'irritation, 36–47  
Emboles septiques, 127  
Engelures, 331  
Epidermolyses bulleuses, 297–300  
Epidermolyses bulleuses dystrophiques, 299–300  
Epidermolyses bulleuses simples, 297–298  
Epstein-Barr, 97  
Eruption acnéiforme du visage, 322  
Eruption photo-allergique médicamenteuse, 321  
Eruption phototoxique médicamenteuse, 320  
Eruption psoriasiforme, 323  
Eruptions lichénoïdes, 318–319  
Eruptions médicamenteuses, 315–328  
Erysipèle, 124–125  
Erythema elevatum diutinum, 276  
Erythème annulaire centrifuge (de Darier), 356–357  
Erythème craquelé, 69  
Érythème migrateur ou maladie de Lyme, 128–129



a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z



Erythème noueux, 277–278  
Erythème pigmenté fixe, 315  
Erythème polymorphe, 282–285  
Erythrasma, 142  
Erythrodermie psoriasique, 216–217  
Érythroplasie de Queyrat, 441  
Etats pseudopeladiques, 335  
Exanthème maculo-papuleux, 316  
Excoriations, 28  
Exulcérations, 28

## F

Fibrokératome digital acquis, 393  
Fibrome cutané, 391–392  
Fibrosarcome de Darier-Ferrand, 465–466

Fissures, 29  
Folliculite, 121  
Formes topographiques particulières, 218–224  
Furoncle, 122

## G

Gale animale, 187  
Gale humaine ou scabiose, 183–186  
Gangrène, 31  
Glossite exfoliatrice marginée, 343  
Gonococcie génitale, 151  
Grains de milium, 382  
Granulome annulaire, 266  
Griffures de chat, 132–133  
GVHD, 241–242



# H

- Hailey-Hailey, maladie de, 293
- Hamartome épidermique, 371–372
- Hamartome sébacé, 386
- Herpès de type I, 84
- Herpès de type II (génital), 85
- Herpès virus, 84–89
- Histiocytofibrome (fibrome cutané), 391–392
- Hyperplasie gingivale, 327
- Hyperplasies sébacées, 384–385
- Hypertrichose lanugineuse, 471–472
- Hypodermites nodulaires, 279

# I

- Ichtyose liée au sexe, 349–350
- Ichtyose vulgaire, 348

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)

Impétigo, 118–119

Impétigo bulleux, 118

Impétigo croûteux d'emblée, 119

Infection par proteus, 131

Infections bactériennes – chapitre, 117

Intertrigo, 134

Intertrigo candidosique, 171–172

# J

- Jadassohn, 386
- Jessner, 252

# K

- Kanof, 252
- Kaposi, 114–115
- Kérato-acanthome, 377

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

[dernière page vue](#)[précédente](#) [suivante](#)

Kératodermie palmo-plantaire héréditaire, 351  
Kératolyse ponctuée, 144  
Kératose, 22, 354–355, 369–370, 435–436  
Kératose folliculaire rouge atrophiante, 354–355  
Kératose pilaire, 354–355  
Kératoses actiniques, 435–436  
Kératoses séborrhéiques, 369–370  
Kérion de celse, 164–166  
Koebner, phénomène de, 212  
Koënen, 408  
Kyste épidermoïde, 380  
Kyste pilaire, 381  
Kyste trichilemmal (kyste pilaire), 381

## L

Langue géographique, 343  
Langue noire villeuse, 341  
Langue scrotale, 342

Larva migrans (larbush), 200–201  
Leiomyomes, 401  
Leishmaniose, 197–199  
Lentigo malin, mélanome de Dubreuilh, 445  
Lentigos simples (lentigines), 423  
Lésions élémentaires – chapitre, 8  
Leucoplasie (nicotinique), 438  
Leucoplasie chevelue, 97  
Lichen plan, 233–240  
Lichen plan buccal, 236–237  
Lichen plan cutané simple, 233–235  
Lichen plan cutané verruqueux, 238–239  
Lichen plan des ongles, 240  
Lichen scléreux, 259–261  
Lichénification, 54, 243  
Lipomes, 400  
Livedo vasculitis, 273–274  
Lucite estivale bénigne, 329  
Lucite polymorphe, 330  
Lupus érythémateux, 246–251  
Lupus érythémateux chronique, 246–248



recherche



contenu



imprimer

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z



dernière page vue



précédente suivante

Lupus érythémateux subaigu, 249  
Lupus érythémateux systémique, 250–251  
Lupus médicamenteux induit, 324  
Lupus tuberculeux, 135–136  
Lyme, maladie de, 128–129  
Lymphangiome, 420  
Lymphomes malins, 467–468

## M

Macule, 9–14  
Macule érythémateuse, 9  
Macule purpurique, 11  
Macule vasculaire, 10  
Macules achromiques, 14  
Macules ardoisées, 13  
Macules pigmentaires, 12–14  
Macules pigmentées, 12  
Mal perforant plantaire, 362–363

Maladie de Behçet, 338  
Maladie de Bowen, 439–440  
Maladie de Darier, 346–347  
Maladie de Hailey-Hailey, 293  
Maladie de Jessner et Kanof, 252  
Maladie de Kaposi, 114–115  
Maladie de Lyme, 128–129  
Maladie de Paget, 456  
Maladie de Thost-Unna, 351  
Maladie des griffures de chat, 132–133  
Maladie mains-pieds – bouche, 104–106  
Maladies des muqueuses, 338–343  
Maladies sexuellement transmissibles, 145  
Maladies virales – chapitre, 83  
Mastocytoses cutanées, 402–403  
Mégalérythème épidémique, 101–102  
Mélanome, 459–464  
Mélanome à extension superficielle, 460  
Mélanome des extrémités  
(acral lentiginous melanoma), 463



Mélanome développé sur précancérose de Dubreuilh, 462  
Mélanome malin, 459–461, 463–464  
Mélanome nodulaire, 461  
Mélanose de Dubreuilh, 445  
Métastases cutanées, 457–458  
Métastases de mélanome, 464  
Métastases nodulaires dermohypodermiques, 458  
Molluscum contagiosum, 98, 113  
Molluscum pendulum, 395  
Molluscums contagiosums multiples, 99  
Morpions, 190–191  
Muguet, 169  
Mycétome (pied de madura), 181  
Mycobactériose par mycobacterium chelonei, 141  
Mycobactériose par mycobacterium marinum, 139–140  
Mycobactérioses atypiques, 139–141  
Mycobacterium chelonei, 141  
Mycobacterium marinum, 139–140  
Mycoses – chapitre, 152

Mycoses profondes, 180–181  
Mycosis fongoïde, 467–468

## N

N.E.V.I.L., 373–374  
Naevus bleu, 430  
Naevus de Becker, 375  
Naevus de sutton (halo-naevus), 431–432  
Naevus épidermique, 373–374  
Naevus épidermique verruqueux, 371–374  
Naevus juvénile de Spitz, 429  
Naevus mélanocytaires, 423–433  
Naevus mélanocytaires pileux, 427  
Naevus naevocellulaires, 425–426  
Naevus pigmentaire congénital, 428  
Naevus sébacé de Jadassohn, 386  
Naevus unguéal, 433  
Nécrobiose lipoïdique, 267–268



a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

Neurocristopathies, 404–409  
Neurofibromes, 404  
Nodule, 18, 421  
Nodule douloureux de l'oreille, 421

## O

Oedème de quincke (urticaire profonde), 81  
Onychomycose à dermatophytes, 167–168  
Onyxis candidosiques, 175  
Orf, 100

## P

Paget, maladie de, 456  
Papillomavirus, 90–96  
Papillome corné filiforme, 96  
Papules, 15–17, 78

Papules dermiques, 16  
Papules dermo-épidermiques, 17  
Papules épidermiques, 15  
Papules ortiéees, 78  
Papulose Bowenoïde, 442  
Parapsoriasis, 228–232  
Parapsoriasis digitiforme, 231  
Parapsoriasis en grandes plaques, 232  
Parapsoriasis varioliforme, 229–230  
Parasitoses – Arthropodes – chapitre, 182  
Pathomimies, 364–367  
Pédiculose, 188–189  
Pelade, 333–334  
Pemphigoïde bulleuse, 287–288  
Pemphigus auto-immuns, 289–292  
Pemphigus chronique bénin familial, 293  
Pemphigus érythémateux, 291–292  
Pemphigus vulgaire, 289–290  
Périartérite noueuse, 275  
Périonyxis et onyxis candidosiques, 175  
Perlèche, 170



a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

Pied de madura, 181  
Piqûres d'insectes, 192–196  
Piqûres de puces, 195–196  
Pityriasis lichénoïde, 228  
Pityriasis rosé de Gibert, 226–227  
Pityriasis rubra pilaire, 352–353  
Pityriasis versicolor, 177–179  
Porome eccrine, 388–389  
Porphyrie cutanée tardive, 302–304  
Pox et parapoxvirus, 98–100  
Prick test au latex, 72  
Proteus, 131  
Prurigo, 54, 111  
Prurigo excorié, 244–245  
Prurigo strophulus, 194

Pseudo-kyste mucoïde, 422  
Pseudolymphome à type de borreliose, 130  
Psoriasis - chapitre, 204  
Psoriasis des muqueuses, 223–224  
Psoriasis des ongles, 220  
Psoriasis des plis, 219  
Psoriasis du cuir chevelu, 221  
Psoriasis du visage (sébopsoriasis), 222  
Psoriasis palmoplantaire, 218  
Psoriasis pustuleux, 213–215  
Psoriasis vulgaire, 205–212  
Puce chique, 202–203  
Pustules, 25  
Pyoderma gangrenosum, 280–281  
Pyorrhée alvéolodentaire, 112

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

**R**

- Radiodermite, 443  
 Rappel histologique, 1  
 Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD), 241–242  
 Rendu-Osler-Weber, maladie de, 411  
 Rosacée, 305, 312–313  
 Roséole syphilitique, 148  
 Rougeole, 103  
 Rubéole, 107

**S**

- Sarcoïdose, 262–265  
 Scabiose, 183–186  
 Sclérodermie généralisée (systémique), 257–258  
 Sclérodermies, 255–258  
 Sclérodermies circonscrites, 255–256

- Sclérose, 34  
 Sclérose tubéreuse de Bourneville, 407  
 Sida, 108–116  
 Spitz, 429  
 Sporotrichose, 180  
 Squames, 26  
 Syndrome de lyell, 317  
 Syndrome de sweet, 286  
 Syndromes paranéoplasiques, 469–472  
 Syphilides papuleuses, 150  
 Syphilis, 146–150  
 Syphilis secondaire (roséole syphilitique), 148  
 Syphilis secondaire tardive, 149  
 Syringomes, 387

**T**

- Tache rubis, 419  
 Taches mongoliennes, 424



recherche



contenu



imprimer

 a  
 b  
 c  
 d  
 e  
 f  
 g  
 h  
 i  
 j  
 k  
 l  
 m  
 n  
 o  
 p  
 q  
 r  
 s  
 t  
 u  
 v  
 w  
 x  
 y  
 z


dernière page vue



précédente



suivante

Teigne, 163  
Test de provocation aux gants en latex, 73  
Thost-Unna, 351  
Tinea capitis ou teigne, 163  
Tinea corporis, 153–154  
Tinea cruris, 157  
Tinea faciei, 155–156  
Tinea manuum, 158–159  
Tinea pedum ou athlete's foot, 160–162  
Tréponématoses et autres maladies  
    sexuellement transmissibles – chapitre, 145  
Tricho-épithéliomes, 383  
Trichomycose axillaire, 143  
Trichotillomanie, 336  
Trombiculose, 192–193  
Tubercules, 19  
Tuberculose cutanée, 135–138  
Tumeur glomique, 416–417  
Tumeurs cutanées bénignes – chapitre, 368  
Tumeurs cutanées malignes – chapitre, 446  
Tumeurs cutanées précancéreuses – chapitre, 434

Tumeurs de Koënen, 408  
Tumeurs du tissu conjonctif, 391–422  
Tumeurs épidermiques, 369–379  
Tumeurs pilaires et sébacées, 380–386  
Tumeurs sudorales, 387–390  
Tungose ou puce chique, 202–203

## U

Ulcérations, 30  
Ulcère d'origine capillaritique, 361  
Ulcère de jambe d'origine veineuse, 358–359  
Ulcère de jambe d'origine artérielle, 360  
Ulcère neurotrophique, 362–363  
Ulcères de jambe, 358–363  
Ulcus rodens, 448  
Urticaire – chapitre, 70  
Urticaire à la pression, 75  
Urticaire au froid, 76



recherche



contenu



imprimer

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z



dernière page vue



précédente suivante

Urticaire de contact au latex, 71  
Urticaire figurée, 80  
Urticaire papuleuse, 79  
Urticaire profonde, 81  
Urticaire solaire, 77  
Urticaires alimentaires, 78  
Urticaires communes (médicamenteuses, alimentaires, idiopathiques), 78–82  
Urticaires de contact, 71–73  
Urticaires idiopathiques, 78  
Urticaires médicamenteuses, 78  
Urticaires physiques, 74–77

# V

Varicelle, 86–87  
Varicelle zona, 86  
Vasculite, 82, 269–276  
Vasculite allergique, 270–272  
Vasculite urticarienne, 82  
Végétations, 20  
Verrucosités, 21  
Verrue plantaire, 94  
Verrues planes, 91–92  
Verrues plantaires en mosaïque, 95  
Verrues séborrhéiques, 369–370  
Verrues vulgaires, 90  
Vésicules, 23  
Virus, 101–107  
Virus d'Epstein-Barr, 97  
Von Recklinghausen, 405–406  
Vulvo-vaginite candidosique, 173

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

# X

- Xanthélasma, 399
- Xanthogranulome juvénile, 396
- Xanthomes tubéreux, 397–398
- Xeroderma pigmentosum, 444
- Xérose, 54

# Z

- Zona, 86
- Zona nécrotique, 108–109
- Zona ophtalmique, 89
- Zona thoracique, 88

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente




suivante

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z


# Index par images




Peau de la région axillaire




Peau de la région du front




Peau de visage chez un sujet âgé



Structure de l'épiderme



Structure de l'épiderme



Structure de l'épiderme



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Macule érythémateuse



Macule vasculaire



Macule purpurique



Macules pigmentées



Macules ardoisées



Macules achromiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Papules épidermiques



Papules dermiques



Papules dermo-épidermiques



Nodule



Tubercules



Végétations

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Verrucosités



Kératose



Vésicules



Bulles



Pustules



Squames



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Croûtes



Excoriations



Fissures



Ulcérations



Gangrène



Atrophie

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Cicatrice



Sclérose



Eczéma de contact aigu suintant



Eczéma de contact chronique  
d'origine professionnelle



Eczéma de contact  
vésiculeux



Eczéma de contact  
vésiculeux



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Eczéma de contact bulleux



Eczéma de contact bulleux



Eczéma croûteux



Eczéma croûteux

Eczéma de contact sec,  
érythématosquameux

Dermatite d'irritation aiguë

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Dermatite d'irritation chronique



Dermatite d'irritation chronique palmaire



Dermatite atopique du visage chez le nourrisson



Dermatite atopique



Dermatite atopique de l'enfance



Dermatite atopique des plis chez l'enfant



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Eczéma des mamelons



Cheilite atopique



Dermatite atopique de l'adulte



Conjonctivite atopique



Dermatite atopique des mains chez l'adulte



Dartre sèche furfuracée

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Dermatose plantaire juvénile



Dermatose plantaire juvénile



Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)



Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)



Eczéma de stase



Eczéma séborrhéique du thorax



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Eczéma séborrhéique de la  
lisière du cuir chevelu



Eczéma séborrhéique du  
visage



Dysidrose des doigts



Dysidrose bulleuse palmaire



Eczéma dysidrosique  
palmaire



Eczéma craquelé (ou  
érythème craquelé)



recherche



contenu



imprimer




dernière page vue



précédente suivante



Urticaire de contact au latex



Prick test au latex



Test de provocation aux gants en latex



Dermographisme



Urticaire à la pression



Urticaire au froid





Urticaire solaire



Papules ortiéées



Urticaire papuleuse



Urticaire figurée

Oedème de quincke  
(urticaire profonde)

Vasculite urticarienne

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Herpès de type I



Herpès de type II (génital)



Varicelle zona



Varicelle



Zona thoracique



Zona ophtalmique



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Verrues vulgaires



Verrues planes



Verrues planes



Condylomes acuminés



Verrue plantaire



Verrues plantaires en mosaïque



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Papillome corné filiforme



Leucoplasie chevelue



Molluscum contagiosum



Molluscums contagiosums multiples



Orf



Mégalérythème épidémique



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Mégalérythème épidémique



Rougeole



Maladie mains-pieds-bouche



Maladie mains-pieds-bouche



Maladie mains-pieds-bouche



Rubéole



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Zona nécrotique



Zona nécrotique



Dermatite séborrhéique



Prurigo



Pyorrhée alvéolodentaire



Molluscum contagiosum



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Maladie de Kaposi



Maladie de Kaposi




Condylomes acuminés



Impétigo bulleux



Impétigo croûteux d'emblée



Ecthyma



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Folliculite



Furoncle



Anthrax



Erysipèle



Erysipèle



Cellulite rétro-orbitaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Emboles septiques



Érythème migrateur ou maladie de lyme



Érythème migrateur ou maladie de lyme



Pseudolymphome à type de borreliose



Infection par proteus



Maladie des griffures de chat



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Maladie des griffures de chat



Intertrigo



Lupus tuberculeux



Lupus tuberculeux



Ecrouelles



Bécigite

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Mycobactériose par  
mycobacterium marinum



Mycobactériose par  
mycobacterium marinum



Mycobactériose par  
mycobacterium chelonei



Erythrasma



Trichomycose axillaire



Kératolyse ponctuée



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Chancre syphilitique



Chancre syphilitique



Syphilis secondaire  
(roséole syphilitique)



Syphilis secondaire tardive



Syphilides papuleuses



Gonococcie génitale



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Tinea corporis



Tinea corporis



Tinea faciei



Tinea faciei



Tinea cruris



Tinea manuum



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Tinea manuum

Tinea pedum ou  
athlete's footTinea pedum ou  
athlete's footTinea pedum ou  
athlete's foot

Tinea capitis ou teigne



Kérion de celse



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Kérion de celse



Kérion de celse

Onychomycose à  
dermatophytesOnychomycose à  
dermatophytes

Muguet



Perlèche



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Intertrigo candidosique



Intertrigo candidosique



Vulvo-vaginite candidosique



Balanite candidosique



Péryonyxis et onyxis candidosiques



Candidose génito-fessière infantile



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Pityriasis versicolor



Pityriasis versicolor



Pityriasis versicolor



Sporotrichose



Mycétome (pied de madura)



Gale humaine ou scabiose



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Gale humaine ou scabiose



Gale humaine ou scabiose



Gale humaine ou scabiose



Gale animale



Pédiculose



Pédiculose



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Morpions



Morpions



Trombiculose



Trombiculose



Prurigo strophulus



Piqûres de puces

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Piqûres de puces



Leishmaniose



Leishmaniose



Leishmaniose



Larva migrans (larbisch)



Larva migrans (larbisch)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Tungose ou puce chique



Tungose ou puce chique



Psoriasis vulgaire



Psoriasis vulgaire



Psoriasis vulgaire



Psoriasis vulgaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Psoriasis vulgarire



Psoriasis vulgarire



Psoriasis vulgarire



Psoriasis vulgarire



Psoriasis pustuleux



Psoriasis pustuleux



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Psoriasis pustuleux



Erythrodermie psoriasique



Erythrodermie psoriasique



Psoriasis palmoplantaire



Psoriasis des plis



Psoriasis des ongles



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



Psoriasis du cuir chevelu

Psoriasis du visage  
(sébopsoriasis)

Psoriasis des muqueuses



Psoriasis des muqueuses



Pityriasis rosé de Gibert



Pityriasis rosé de Gibert



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Pityriasis lichenoïde



Parapsoriasis varioliforme



Parapsoriasis varioliforme



Parapsoriasis digitiforme



Parapsoriasis en grandes plaques



Lichen plan cutané simple

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Lichen plan cutané simple



Lichen plan cutané simple



Lichen plan buccal



Lichen plan buccal

Lichen plan cutané  
verruqueuxLichen plan cutané  
verruqueux

recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Lichen plan des ongles



Réaction du greffon contre  
l'hôte (GVHD)



Réaction du greffon contre  
l'hôte (GVHD)



Lichenification



Prurigo excorié



Prurigo excorié



recherche



contenu



imprimer




dernière page vue



précédente



suivante



Lupus érythémateux chronique



Lupus érythémateux chronique



Lupus érythémateux chronique



Lupus érythémateux subaigu



Lupus érythémateux systémique



Lupus érythémateux systémique



recherche



contenu



imprimer




dernière page vue



précédente suivante



Maladie de Jessner et Kanof



Dermatomyosite



Dermatomyosite



Sclérodermies circonscrites



Sclérodermies circonscrites

Sclérodermie généralisée  
(systémique)

recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Sclérodermie généralisée  
(systémique)



Lichen scléreux



Lichen scléreux



Lichen scléreux



Sarcoïdose



Sarcoïdose



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Sarcoïdose



Sarcoïdose



Granulome annulaire



Nécrobiose lipoïdique



Nécrobiose lipoïdique



Vasculite

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Vasculite allergique



Vasculite allergique



Vasculite allergique



Livedo vasculitis



Livedo vasculitis



Périartérite noueuse



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Erythema elevatum diutinum



Erythème noueux



Erythème noueux



Hypodermites nodulaires



Pyoderma gangrenosum



Pyoderma gangrenosum



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Erythème polymorphe



Erythème polymorphe



Erythème polymorphe



Erythème polymorphe



Syndrome de sweet



Pemphigoïde bulleuse



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



Pemphigoïde bulleuse



Pemphigus vulgaire



Pemphigus vulgaire



Pemphigus érythémateux



Pemphigus érythémateux



Pemphigus chronique bénin familial



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Dermatite herpétiforme



Dermatite herpétiforme



Dermatose à IgA linéaires



Epidermolyses bulleuses simples



Epidermolyses bulleuses simples



Epidermolyses bulleuses dystrophiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Epidermolyses bulleuses dystrophiques



Bullose des diabétiques



Porphyrie cutanée tardive



Porphyrie cutanée tardive



Dermatose phototoxique bulleuse



Acné vulgaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Acné vulgaire



Acné vulgaire



Acné vulgaire



Acné conglobata



Acné conglobata

Acné infantile  
(Acne infantum)

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Rosacée



Rosacée



Dermatite péri-orale



Erythème pigmenté fixe



Exanthème maculo-papuleux



Syndrome de lyell



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Eruptions lichénoïdes



Eruptions lichénoïdes

Eruption phototoxique  
médicamenteuseEruption photo-allergique  
médicamenteuse

Eruption acnéiforme du visage



Eruption psoriasiforme



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Lupus médicamenteux induit



Atrophie cortisonique

Bromides et iodides  
(halogénides)

Hyperplasie gingivale



Chloasma (mélasma)



Lucite estivale bénigne



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Lucite polymorphe



Engelures



Pelade



Pelade



Etats pseudopeladiques



Trichotillomanie



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Alopécie  
androgénogénétique



Aphtes



Aphtes, aphtose, maladie  
de Behçet



Aphtes, aphtose, maladie  
de Behçet



Langue noire villeuse



Langue scrotale



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Langue géographique



Cheilité de contact  
allergique



Cheilité consécutive



Maladie de Darier



Maladie de Darier



Ichtyose vulgaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Ichtyose liée au sexe



Ichtyose liée au sexe



Kératodermie palmo-plantaire héréditaire



Pityriasis rubra pilaire



Pityriasis rubra pilaire



Kératose pilaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Kéatose pilaire



Erythème annulaire  
centrifuge (de Darier)



Erythème annulaire  
centrifuge (de Darier)



Ulcère de jambe d 'origine  
veineuse



Ulcère de jambe d 'origine  
veineuse



Ulcère de jambe d'origine  
artérielle



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Ulcère d'origine capillaritique



Mal perforant plantaire



Mal perforant plantaire



Automutilation cutanée à type de simulation



Automutilation cutanée à type de simulation



Automutilation à type de pathomimie



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente suivante



suivante



Automutilation à type de pathomimie



Verrues séborrhéiques



Verrues séborrhéiques



Naevus épidermique  
verruqueux



Naevus épidermique  
verruqueux



Naevus épidermique



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Naevus épidermique



Naevus de Becker



Acanthome à cellules claires



Kérato-acanthome



Acanthome fissuré



Acanthome fissuré



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Kyste épidermoïde

Kyste trichilemmal  
(kyste pilaire)

Grains de milium



Tricho-épithéliomes



Adénomes sébacés séniles



Adénomes sébacés séniles



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



Naevus sébacé de Jadassohn



Syringomes



Porome eccrine



Porome eccrine



Cylindromes

Histiocytofibrome  
(fibrome cutané)

recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Histiocytofibrome  
(fibrome cutané)



Fibrokératome digital acquis



Chéloïde



Molluscum pendulum



Xanthogranulome juvénile



Xanthomes tubéreux



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Xanthomes tubéreux



Xanthélasma



Lipomes



Leiomyomes



Mastocytoses cutanées



Mastocytoses cutanées



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Neurocristopathies



Neurocristopathies



Neurocristopathies



Neurocristopathies



Neurocristopathies



Neurocristopathies

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Angiome



Angiome



Angiome



Angiome



Angiome



Angiome

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Angiome



Angiome



Angiome



Angiome



Lymphangiome

Nodule douloureux de  
l'oreille

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Pseudo-kyste mucoïde



Lentigos simples (lentigines)



Taches mongoliques



Naevus mélanocytaires



Naevus mélanocytaires



Naevus mélanocytaires pileux



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Naevus pigmentaire  
congénital



Naevus juvénile de Spitz



Naevus bleu



Naevus de Sutton  
(halo-naevus)



Naevus de Sutton  
(halo-naevus)



Naevus unguéal

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Kératoses actiniques



Kératoses actiniques



Cheilite actinique



Leucoplasie (nicotinique)



Maladie de Bowen



Maladie de Bowen

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Érythroplasie de Queyrat



Papulose Bowenoïde



Radiodermite



Xeroderma pigmentosum



Mélanose de Dubreuilh



Carcinome basocellulaire  
nodulaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Ulcus rodens

Carcinome basocellulaire  
plan cicatricielCarcinome basocellulaire  
pigmentéCarcinome basocellulaire  
pagétoïde

Carcinome spinocellulaire



Carcinome spinocellulaire



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Carcinome spinocellulaire



Carcinome spinocellulaire



Maladie de Paget



Métastases cutanées



Métastases cutanées



Mélanome malin



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



Mélanome à extension superficielle



Mélanome nodulaire



Mélanome



Mélanome



Métastases de mélanome



Fibrosarcome de Darier-Ferrand



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Angiosarcome de Kaposi



Lymphomes malins



Lymphomes malins



Syndromes paranéoplasiques



Acrokératose



Hypertrichose lanugineuse



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



Hypertrichose lanugineuse

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Table des matières . . . . .	1
Rappel histologique de la structure de la peau humaine. . . . .	1
Les lésions élémentaires . . . . .	8
Eczémas. . . . .	35
Urticaires. . . . .	70
Maladies virales . . . . .	83
Infections bactériennes . . . . .	117
Tréponématoses et autres maladies sexuellement transmissibles . . . . .	145
Mycoses. . . . .	152
Parasitoses – Arthropodes . . . . .	182

Psoriasis . . . . .	204
Autres dermatoses . . . . .	225
Dermatologie topographique . . . . .	332
Tumeurs cutanées bénignes . . . . .	368
Tumeurs cutanées précancéreuses. . . . .	434
Tumeurs cutanées malignes . . . . .	446
Approche algorithmique d'une mise au point dermatologique . . . . .	473
Index par images . . . . .	487
Index alphabétique . . . . .	565
Index par causes. . . . .	581
Index par lésions élémentaires . . . . .	599



# Table des matières

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

**Sommaire****Rappel histologique de la structure de la peau humaine****Les lésions élémentaires**

<i>Les macules</i> .....	9
<i>Les papules</i> .....	15
<i>Les nodules</i> .....	18
<i>Les tubercules</i> .....	19
<i>Les végétations</i> .....	20
<i>Les verrucosités</i> .....	21
<i>Les kératoses</i> .....	22
<i>Les vésicules</i> .....	23
<i>Les bulles</i> .....	24
<i>Les pustules</i> .....	25
<i>Les squames</i> .....	26
<i>Les croûtes</i> .....	27
<i>Les excoriations (ou exulcérations)</i> .....	28
<i>Les fissures</i> .....	29
<i>Les ulcérasions</i> .....	30

<i>La gangrène</i> .....	31
<i>L'atrophie</i> .....	32
<i>La cicatrice</i> .....	33
<i>La sclérose</i> .....	34

**Eczémas**

<i>Eczémas de contact allergiques et dermatites d'irritation</i> .....	36
<i>Eczéma constitutionnel ou dermatite atopique</i> ..48	
<i>Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)</i> .. 60	
<i>Eczéma de stase</i> .....	62
<i>Eczéma séborrhéique(dermatite séborrhéique)</i> ...63	
<i>Dysidrose et eczéma dysidrosique</i> .....	66
<i>Eczéma craquelé (ou érythème craquelé)</i> .. 69	

**Urticaires**

<i>Urticaires de contact</i> .....	71
<i>Urticaires physiques</i> .....	74
<i>Urticaires communes (médicamenteuses, alimentaires, idiopathiques)</i> .....	78

**Maladies virales**

<i>Groupe des herpès virus</i> .....	84
<i>Groupe des papillomavirus</i> .....	90
<i>Virus d'Epstein-Barr</i> .....	97
<i>Groupe des pox et parapoxvirus</i> .....	98
<i>Autres virus</i> .....	101
<i>Signes cutanéo-muqueux du sida</i> .....	108

**Infections bactériennes**

<i>Impétigo</i> .....	118
<i>Ecthyma</i> .....	120
<i>Folliculite</i> .....	121
<i>Furoncle</i> .....	122
<i>Anthrax</i> .....	123
<i>Erysipèle</i> .....	124
<i>Cellulite rétro-orbitaire</i> .....	126
<i>Emboles septiques</i> .....	127
<i>Borrellose</i> .....	128
<i>Infection par proteus</i> .....	131
<i>Maladie des griffures de chat (cat scratch disease)</i> .....	132

<i>Intertrigo</i> .....	134
<i>Tuberculose cutanée</i> .....	135
<i>Mycobactéries atypiques</i> .....	139
<i>Corynélabactéries</i> .....	142

**Tréponématoses et autres maladies sexuellement transmissibles**

<i>Syphilis</i> .....	146
<i>Gonococcie génitale</i> .....	151

**Mycoses**

<i>Dermatophyties</i> .....	153
<i>Candidoses</i> .....	169
<i>Pityriasis versicolor</i> .....	177
<i>Mycoses profondes</i> .....	180

**Parasитoses – Arthropodes**

<i>Gale humaine ou scabiose</i> .....	183
<i>Gale animale</i> .....	187
<i>Pédiculose</i> .....	188
<i>Morpions</i> .....	190

Piqûres d'insectes .....	192
Leishmaniose .....	197
Larva migrans (larbishi) .....	200
Tungose ou puce chique .....	202

**Psoriasis**

Aspects cliniques .....	205
Formes topographiques particulières .....	218

**Autres dermatoses**

Pityriasis rosé de Gibert .....	226
Parapsoriasis .....	228
Lichen plan .....	233
Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) .....	241
Lichénification .....	243
Prurigo excorié .....	244
Lupus érythémateux .....	246
Maladie de Jessner et Kanof .....	252
Dermatomyosite .....	253
Sclérodermies .....	255
Lichen scléreux .....	259

Sarcoïdose .....	262
Granulome annulaire .....	266
Nécrobiose lipoïdique .....	267
Vasculites .....	269
Erythème noueux .....	277
Hypodermites nodulaires .....	279
Pyoderma gangrenosum .....	280
Erythème polymorphe .....	282
Syndrome de sweet (dermatose aiguë fébrile neutrophilique) .....	286
Pemphigoïde bulleuse .....	287
Pemphigus auto-immuns .....	289
Pemphigus chronique bénin familial (maladie de Hailey-Hailey) .....	293
Dermatite herpétiforme .....	294
Dermatose à IgA linéaires .....	296
Epidermolyses bulleuses .....	297
Bullose des diabétiques .....	301
Porphyrie cutanée tardive .....	302
Acné et rosacée .....	305
Eruptions médicamenteuses .....	315

*Dermatoses dues à des agents physiques* . . . . . 329

## Dermatologie topographique

<i>Alopécies</i> . . . . .	333
<i>Maladies des muqueuses</i> . . . . .	338
<i>Cheilites</i> . . . . .	344
<i>Divers</i> . . . . .	346
<i>Ulcères de jambe</i> . . . . .	358
<i>Pathomimies</i> . . . . .	364

## Tumeurs cutanées bénignes

<i>Tumeurs épidermiques</i> . . . . .	369
<i>Tumeurs pilaires et sébacées</i> . . . . .	380
<i>Tumeurs sudorales</i> . . . . .	387
<i>Tumeurs du tissu conjonctif</i> . . . . .	391
<i>Naevus mélanocytaires</i> . . . . .	423

## Tumeurs cutanées précancéreuses

## Tumeurs cutanées malignes

<i>Carcinomes basocellulaires</i> . . . . .	447
---	-----

*Carcinomes spinocellulaires* . . . . . 452

*Maladie de Paget* . . . . . 456

*Métastases cutanées* . . . . . 457

*Mélanome malin* . . . . . 459

*Fibrosarcome de Dasier-Ferrand*

(*dermatofibrosarcome protuberans*) . . . . . 465

*Lymphomes malins - mycosis fongoïde* . . . . . 467

*Syndromes paranéoplasiques* . . . . . 469

## Approche algorithmique d'une mise au point dermatologique

*Urticaire* . . . . . 474

## Index par images


## Index alphabétique

## Index par causes

## Index par lésions élémentaires

Chapitre 1:

# Rappel histologique de la structure de la peau humaine




## Peau de la région axillaire

Les trois constituants sont de haut en bas l'épiderme (coloré en rouge), le derme (coloré en bleu) et l'hypoderme (ou tissu adipocytaire sous-cutané) bourré de glandes sudoripares de petite taille (glandes eccrines) et de grande taille (glandes apocrines).

Des poils et des glandes sébacées de petite taille sont identifiables dans le derme (coloration : trichrome bleu de Masson; grossissement : x 25).






## Peau de la région du front

Elle illustre bien les variétés régionales du tégument, lorsqu'on la compare à la peau axillaire.

Les trois constituants sont bien reconnaissables de haut en bas: l'épiderme (mince liseré rouge), le derme (coloré en orange) et le tissu adipocytaire sous-cutané. Les poils de duvet et les glandes sébacées sont très nombreux dans le derme, mais on ne constate qu'un petit nombre de glandes sudoripares (coloration : hémalun-éosine-safran; grossissement : x 25).






## Peau de visage chez un sujet âgé

Tous les signes de photovieillissement physiologique sont rassemblés : épiderme désorganisé, transformation élastotique des fibres collagènes du derme. Sous une mince bande de tissu collagène sous-épidermique normale (colorés en jaune) apparaissent les grosses fibres collagènes dégénérées, élastotiques (colorées en rouge), (coloration : hémalun-éosine-safran; grossissement : x 100).






## Structure de l'épiderme

Vue rapprochée de l'épiderme. Celui-ci comporte trois types cellulaires : les kératinocytes, les mélanocytes et les cellules de Langerhans.

Deux sont reconnaissables sur ce cliché : les kératinocytes très cohérents entre eux et dans l'assise basale quelques mélanocytes entourés par un halo clair (coloration : hémalun-éosine-safran; grossissement : x 250). ▶






## Structure de l'épiderme

*continuation*

Vue rapprochée de l'épiderme. Coloration de la mélanine par la méthode de Fontana. Les mélanocytes apparaissent comme des cellules étoilées, dendritiques dans l'assise basale de l'épiderme. Ils transfèrent la mélanine aux kératinocytes qui s'en trouvent tatoués de manière diffuse (grossissement: x 250). ▶





## Structure de l'épiderme

*continuation*

Vue rapprochée de l'épiderme. Mise en évidence des cellules de Langerhans qui apparaissent comme des cellules dendritiques couvrant la totalité de l'épiderme vivant. Ces cellules appartiennent à la lignée des cellules histiocytaires et jouent le rôle immunologique de cellules présentatrices d'antigènes (Immunomarquage OKT6 en peroxydase; grossissement : x 250).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

Chapitre 2:

# Les lésions élémentaires

## 2.1 Les macules



### Macule érythémateuse

Les macules sont des taches non infiltrées, qui se diffèrentient de la peau avoisinante par leur coloration.

La coloration de la peau varie du rose pâle au rouge foncé et s'efface à la vitropression. Elle est secondaire à une vasodilatation plus ou moins intense.  
(ex.: érythème pudique)





## Macule vasculaire

Ces taches permanentes, qui s'effacent partiellement ou complètement à la vitropression, sont dues à la présence d'un lacis abondant de vaisseaux dilatés dans le derme superficiel.  
(ex.: télangiectasie)





## Macule purpurique

Les macules de couleur rouge ne s'effacent pas à la vitropression. Elles résultent d'épanchements sanguins dans le derme.  
(ex.: purpura de bateman)  
Leur teinte vire à l'ocre avec le temps.





## Macules pigmentaires

*Macules pigmentées*

Les macules pigmentées de taille variée et de couleur allant de l'ocre au brun foncé, correspondent à des hyperpigmentations mélaniques de l'épiderme (ex.: éphélides). ►



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Macules pigmentaires

*continuation*

### *Les macules ardoisées*

Les macules ardoisées sont secondaires à des dépôts de mélanine, s'étendant plus ou moins profondément dans le derme.  
(ex.: notalgie paresthésique) ►



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Macules pigmentaires

*continuation*

### *Les macules achromiques*

Les macules achromiques sont des taches blanches, de forme et de taille variées, consécutives à la diminution de la teneur en mélanine de l'épiderme.  
(ex.: vitiligo)



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 2.2 Les papules



Les papules sont des élevures plus ou moins bien délimitées, de taille variée. Elles sont de 3 types :

### Les papules épidermiques

correspondent à un épaississement global de l'épiderme.  
(ex.: verrues planes). ▶



## Les papules dermiques

correspondent à un épaississement du derme, de nature oedémateuse, inflammatoire ou proliférative.  
(ex.: papule ortie de l'urticaire)





## Les papules dermo-épidermiques

correspondent à un épaississement mixte de l'épiderme et du derme.  
(ex.: lichen plan)



## 2.3 Les nodules



Les nodules sont des élevures hémisphériques secondaires à des infiltrations inflammatoires et oedématueuses du derme profond et de l'hypoderme (ex.: nodule rhumatismal).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

## 2.4 Les tubercules



Les tubercules sont des formations solides, saillantes, circonscrites, enchâssées superficiellement dans le derme. Ils s'ulcèrent parfois en cours d'évolution (ex.: lupus tuberculeux).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 2.5 Les végétations



Les végétations sont des excroissances d'allure filiforme ou lobulée, de consistance généralement molle (ex.: condylome acuminé).



## 2.6 Les verrucosités



Les verrucosités sont des végétations recouvertes d'un enduit corné plus ou moins épais.  
(ex.: verrue vulgaire)



## 2.7 Les kératoses



Les kératoses consistent en des lésions épidermiques, caractérisées par une accumulation localisée de kératine (ex.: corne cutanée).



## 2.8 Les vésicules



Les vésicules sont des saillies cutanées de petite taille, centrées par une cavité contenant un liquide clair. Elles sont souvent hémisphériques et peuvent être déprimées en leur centre.  
(ex.: varicelle)



## 2.9 Les bulles



Les bulles sont des élevures plus volumineuses, centrées par une cavité contenant un liquide clair, louche ou hémorragique. Elles diffèrent entre elles par leur dimension, leur tension: bulles flasques ou tendues.  
(ex.: bulle d'une brûlure thermique)

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

## 2.10 Les pustules



Les pustules sont des saillies de taille variée, centrées par une cavité renfermant un liquide purulent. Elles surviennent de novo ou correspondent à l'évolution de vésicules ou de bulles.  
(ex.: pustulose palmo-plantaire)



## 2.11 Les squames



Les squames sont des agrégats de cellules cornées plus ou moins secs formés par les couches superficielles de l'épiderme. Elles se détachent par fragments de taille variée (ex.: ichtyose).



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## 2.12 Les croûtes



Les croûtes sont des concrétions de consistance plus ou moins dure, secondaires au dessèchement de lésions suintantes, hémorragiques ou purulentes (ex.: impétigo).



## 2.13 Les excoriations (ou exulcérations)



Les excoriations sont des plaies très superficielles. Le derme est mis à nu.  
(ex.: excoriations par grattage)



## 2.14 Les fissures



Les fissures sont des exulcérations linéaires, bordées ou non d'hyperkératose, entamant le derme superficiel (ex.: pied d'athlète).

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

## 2.15 Les ulcéras



Les ulcéras sont des pertes de substance plus importantes, entamant le derme en profondeur.  
(ex.: escarre)




## 2.16 La gangrène



La gangrène est une nécrose tissulaire, liée à une oblitération artérielle ou artériolaire (ex.: gelure).



## 2.17 L'atrophie



L'atrophie consiste en un amincissement de la peau, une diminution de sa consistance et de son élasticité (ex.: atrophie sénile).



## 2.18 La cicatrice



La cicatrice correspond à des modifications du derme et de l'épiderme, signes d'un processus fibreux d'intensité variable. Elle est le témoin de la réparation d'une plaie, d'une perte de substance.  
(ex.: cicatrice après brûlure)



## 2.19 La sclérose




La sclérose correspond à une induration du tégument, qui perd sa souplesse normale. Elle est liée à une condensation fibreuse dermique (ex: morphée).



Chapitre 3:

# Eczémas

### 3.1 Eczémas de contact allergiques et dermatites d'irritation



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

#### Eczéma de contact aigu suintant

Eczéma de contact allergique aigu, suintant, des faces de flexion des avant-bras et des bras après applications répétées d'une lotion antiseptique. Réaction allergique à l'hexamidine.

Sur un fond d'érythème congestif, d'innombrables petites vésicules translucides se sont rompues, laissant sourdre une sérosité claire.



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Eczéma de contact chronique d'origine professionnelle

Lésions érythématosquameuses, discrètement kératosiques, crevassées et infectées du dos des doigts chez un maçon.  
Réaction allergique aux sels de chrome présents dans les ciments.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Kératoses;  
Squames; Fissures

causes:

Agents chimiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Eczéma de contact vésiculeux

Eczéma de contact allergique aigu, érythémato-papulo-vésiculeux du dos des mains chez un kinésithérapeute.

Réaction allergique à la lanoline présente dans une crème de massage. La main droite est plus atteinte que la gauche. L'érythème diffus, mal limité, émietté en bordure, se couvre de petites vésicules translucides. ►

alphabétique



## Eczéma de contact vésiculeux

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Bulles

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

## Eczéma de contact bulleux

Eczéma de contact allergique aigu du dos de l'avant-pied et des orteils. Réaction allergique aux sels de chrome, agent tannant du cuir des chaussures. Des bulles se sont formées sur fond érythémato-vésiculeux. ►



dernière page vue



précédente suivante



## Eczéma de contact bulleux

*continuation*

alphabététique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Bulles

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

Macule érythémateuse; Papules dermo-épidermiques; Vésicules; Croûtes; Excoriations (ou exulcérations)

Agents chimiques

## Eczéma croûteux

Eczéma de contact allergique au nickel d'un bouton de jeans. A l'endroit du contact, existe un placard croûteux, grisâtre, et partiellement érodé par des excoriations de grattage. En bordure, s'étend un eczéma érythémato-papulo-vésiculeux aux limites floues. ►



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

causes:

Macule érythémateuse; Papules dermo-épidermiques; Vésicules; Croûtes; Excoriations (ou exulcérations)  
Agents chimiques

## Eczéma croûteux

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Dermatite d'irritation aiguë

Dermatite d'irritation aiguë du dos de la main et des doigts consécutive à un contact avec des détergents. Erythème diffus, prurigineux.

Les limites de l'erythème sont nettes, correspondant à la zone de contact avec les agents irritants.



dernière page vue



précédente suivante



## Dermatite d'irritation chronique

Dermatite d'irritation chronique du dos de la main et des doigts consécutive à un contact avec des détergents. Erythème squameux, kératosique et craquelé entraînant prurit et sensations douloureuses.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Kéroses;  
Squames; Fissures

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Kératoses; Fissures



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques; Agents chimiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## 3.2 Eczéma constitutionnel ou dermatite atopique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

### Dermatite atopique du visage chez le nourrisson

Placards eczémateux de couleur rouge vif, oedémateux, vésiculosoïdants.

Les limites sont mal définies.

Les lésions prédominent sur les zones convexes du visage:  
front, joues, menton.



dernière page vue



précédente



suivante



## Dermatite atopique : eczéma rétro-auriculaire infecté

Lésions érythémato-suintantes prurigineuses du sillon rétro-auriculaire, centrées sur une crevasse au fond du pli. Des croûtes jaunâtres sont le signe d'une infection microbienne. Ces lésions, classiques dans l'enfance, peuvent subsister à l'âge adulte.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Croûtes;  
Fissures

causes:

Non spécifiques





## Dermatite atopique de l'enfance

Lésions très prurigineuses d'eczéma suintant des paupières et perlèche atopique.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Fissures

causes: Non spécifiques





lésions élémentaires:

Excoriations (ou exulcérations)



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante




lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Papules  
dermo-épidermiques; Vésicules

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Squames; Fissures



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Cheilitis atopique

La cheilitis atopique envahit les lèvres supérieure et inférieure et déborde sur la région péribuccale. Lésions eczémateuses, sèches entraînant une desquamation chronique.



dernière page vue



précédente



suivante



## Dermatite atopique de l'adulte : xérose, lichénifications et prurigo

Polymorphisme lésionnel très particulier : peau d'apparence sèche et rugueuse (xérose), placards lichénifiés. S'y ajoutent des papules de taille variée, très infiltrées, de consistance dure et souvent excoriées. Ce sont les papules de prurigo (qu'on appelait autrefois "prurigo de Besnier").

lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Facteurs mécaniques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Conjonctivite atopique

Conjonctivite atopique associée à une blépharite. Cette inflammation des conjonctives est gênante, parfois douloureuse, et souvent d'une désespérante chronicité. Elle n'est pas inhabituelle chez l'atopique adulte.



dernière page vue



précédente



suivante



## Dermatite atopique des mains chez l'adulte

Eczéma chronique érythématosquameux du dos des mains. Un élément assez caractéristique est l'irrégularité de la distribution des lésions ("patchy pattern"). Certains doigts sont atteints, alors que d'autres ne le sont pas. Le dos des mains est irrégulièrement atteint. Ce caractère "illogique" de la topographie des lésions se rencontre fréquemment dans l'atopie.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;

Macules achromiques;

Squames

Non spécifiques

causes:





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## Dermatose plantaire juvénile

*continuation*



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

causes

alphabétique

### 3.3 Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)



*Variété suintante*

Plaque érythémateuse ronde  
(nummulus = pièce de monnaie)  
persillée de nombreuses vésicules  
suintantes évoluant vers de petites  
croûtelles. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Croûtes

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Eczéma nummulaire (eczéma discoïde)

*continuation*

*Variété sèche de l'eczéma nummulaire*

Plusieurs plaques érythémateuses rondes ou ovalaires, bien délimitées et isolées les unes des autres, dont le diamètre varie de un à plusieurs centimètres. Elles sont recouvertes de fines squames sèches



dernière page vue



précédente suivante

## 3.4 Eczéma de stase



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 3.5 Eczéma séborrhéique (dermatite séborrhéique)



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Macules achromiques; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Eczéma séborrhéique de la lisière du cuir chevelu

Il se caractérise sur le scalp par un érythème diffus, prurigineux, recouvert de squames grasses. Les lésions débordent parfois, comme dans le cas présent, sur le front où elles forment ce qu'on appelle communément la corona seborrheica : taches érythémateuses, parsemées de squames stéatoïdes qui, tout en suivant la lisière du cuir chevelu, dessinent, en bordure, des festons et des arcatures.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Eczéma séborrhéique du visage

Les lésions, érythématosquameuses, bien limitées, ont des localisations caractéristiques : lisière du cuir chevelu, plis nasogéniens, pli vertical médiофrontal, bord libre des paupières inférieures.



dernière page vue



précédente suivante

## 3.6 Dysidrose et eczéma dysidrosique



lésions élémentaires:

Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

### Dysidrose des doigts

Les vésicules de dysidrose sont regroupées sur les faces latérales des doigts, dures au toucher, enchâssées dans l'épiderme, translucides, comparées classiquement à des "grains de sagou ou de tapioca cuit". Elles s'accompagnent d'un prurit intense.



dernière page vue



précédente suivante



## Dysidrose bulleuse palmaire

Les vésicules enchaînées dans l'épiderme palmaire coalescent pour former de véritables bulles, parfois hémorragiques.

lésions élémentaires:

Vésicules; Bulles

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Squames

recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 3.7 Eczéma craquelé (ou érythème craquelé)



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Fissures

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

Chapitre 4:

# Urticaires



dernière page vue



précédente



suivante

## 4.1 Urticaires de contact



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques

### Urticaire de contact au latex


Papules urticariennes survenant dans les minutes qui suivent le port de gants chirurgicaux en latex. Ces papules peuvent déborder l'endroit strict du contact car il s'agit d'une urticaire immuno-allergique (avec parfois présence d'IgE spécifiques). Une urticaire généralisée avec manifestations générales peut donc survenir : rhinite allergique, conjonctivite, crises asthmatiformes, choc anaphylactique.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Agents chimiques





**lésions élémentaires:**


Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

**causes:**

Agents chimiques



## 4.2 Urticaires physiques



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermatiques

causes:

Facteurs mécaniques





lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Froid





lésions élémentaires:

Papules dermiques



causes:

Soleil, Ultraviolets



## 4.3 Urticaires communes (médicamenteuses, alimentaires, idiopathiques)



lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

### Papules ortiées

Eruption de papules oedémateuses, ortiées pouvant confluir en vastes placards. Le prurit est constant et peut empêcher le sommeil. Cette urticaire peut être la première manifestation d'un choc anaphylactique.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

## Urticaire papuleuse

Papules urticariennes disséminées sur le corps de manière symétrique. Les médicaments sont les agents responsables les plus souvent incriminés. Les aliments peuvent parfois provoquer ce type d'urticaire (urticaire aiguë). Les fraises, les crustacés, les poissons, certaines céréales, le lait, les oeufs, ainsi que certains additifs alimentaires sont les plus souvent en cause. Le diagnostic est basé essentiellement sur les tests de provocation (suppression et réintroduction du médicament ou de l'aliment incriminés).



dernière page vue



précédente suivante





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

## Urticaire figurée

Les papules urticariennes dessinent des arabesques ou des formes géographiques. Dans ce cas, l'origine médicamenteuse pourrait être plus fréquemment retrouvée (aspirine, codéine, pénicilline ...). Ici encore, l'épreuve de suppression avec éventuelle réintroduction permet d'obtenir un diagnostic précis.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Oedème de quincke (urticaire profonde)

Urticaire profonde, peu prurigineuse atteignant essentiellement le visage (paupières et lèvres en particulier) ainsi que la glotte voire le larynx. Il s'agit d'une urgence nécessitant des mesures rapides sur le plan thérapeutique (adrénaline et corticostéroïdes en particulier). Les causes médicamenteuses ne sont pas exceptionnelles.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Non spécifiques

## Vasculite urticarienne

Association d'urticaire et de lésions de vascularite leucocytoclasique. Les lésions urticariennes sont beaucoup plus fixes que dans l'urticaire classique. Elles perdurent 2 à 3 jours et s'accompagnent fréquemment d'arthralgies et de fièvre. Une hypocomplémentémie est fréquemment observée.



dernière page vue




précédente suivante

Chapitre 5:

# Maladies virales

## 5.1 Groupe des herpès virus



### Herpès de type I

*Herpès du visage*

Vésicules multiples groupées "en bouquet" sur un socle érythémateux. Les lésions sont le plus souvent douloureuses et la plupart du temps précédées par une sensation de cuisson ou de prurit. Les vésicules se rompent spontanément après quelques jours et l'asséchement survient ultérieurement. Les récidives sont classiques (herpès récurrent), le plus souvent au même endroit.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Vésicules

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Croûtes

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Croûtes

causes:

Infection





## Varicelle

*continuation*

L'évolution se fait vers la formation d'une croûte adhérente qui, lorsqu'elle se détache, laisse parfois subsister une cicatrice déprimée.

lésions élémentaires:

Cicatrice

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Bulles

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Zona ophthalmique

Dans l'observation présente, la topographie des lésions permet d'affirmer que deux branches sont atteintes par le processus infectieux : la branche ophthalmique et la branche maxillaire supérieure. La troisième branche, maxillaire inférieure, est épargnée. La présence de vésicules sur l'aile du nez signe l'atteinte du nerf nasociliaire.



dernière page vue



précédente suivante

## 5.2 Groupe des papillomavirus



Les Papillomavirus sont responsables de l'apparition de divers types de tumeurs bénignes, les verrues virales.

### Verrues vulgaires

Petites tumeurs kératosiques grisâtres, rugueuses au toucher, siégeant sur le dos des doigts. Les verrues vulgaires sont contagieuses et auto-inoculables.

lésions élémentaires:

Papules épidermiques; Verrucosités;  
Kératoses

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection




dernière page vue



précédente



suivante



## Verrues planes

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Végétations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



## Verrue plantaire

Formation kératosique nettement délimitée souvent profondément enchaîssée dans la peau plantaire. La disparition des dermatoglyphe est classique sur toute la surface des verrues plantaire et permet de différencier cette lésion du durillon. La verrue plantaire unique est classiquement appelée myrmécie.

lésions élémentaires:

Kératoses

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Verrucosités



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante



## Papillome corné filiforme

Petit papillome pédiculé atteignant essentiellement le visage (nez, faces latérales du cou et joues). Il est classique de rencontrer les papillomes cornés filiformes chez les hommes (rôle du rasage, surtout mécanique, dans la dissémination).

lésions élémentaires:

Verrucosités

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

## 5.3 Virus d'Epstein-Barr



lésions élémentaires:

Papules épidermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente



suivante

image

lésions élémentaires

alphabétique

## 5.4 Groupe des pox et parapoxvirus



lésions élémentaires:

Papules épidermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

### Molluscum contagiosum

Petite papule arrondie à surface lisse souvent d'aspect brillant de quelques millimètres de diamètre. Il existe fréquemment une petite dépression centrale (cratère souvent rempli d'un matériel blanchâtre, crémeux). Ces lésions atteignent le plus souvent l'enfant et peuvent secondairement s'accompagner d'une eczématisation péri-lésionnelle. Le molluscum contagiosum est dû à un Poxvirus.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Papules épidermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Molluscums contagiosums multiples

Illustration de la phase de dissémination des lésions. La préférence de topographie pour l'aisselle est caractéristique. Dans certains cas, les molluscums contagiosums peuvent s'enflammer et se surinfecter. Chez l'adulte, le molluscum contagiosum est fréquemment rencontré sur les régions génitales. Un bilan immunitaire est indispensable en cas de lésions très nombreuses (surtout si elles se rencontrent au visage).



dernière page vue



précédente suivante



## Orf

Papule érythémato-violacée, pseudovésiculeuse, apparaissant à la face dorsale d'un doigt.  
Incubation de trois à quinze jours après un contact avec un animal malade (essentiellement les ovins).  
Evolution vers la disparition sans complication en une quinzaine de jours. Une surinfection bactérienne n'est pas rare. L'orf est provoqué par un parapoxvirus.

lésions élémentaires: Papules dermo-épidermiques

causes: Infection



## 5.5 Autres virus



### Mégalérythème épidémique

Eruption maculopapuleuse du visage donnant un aspect soufflé "en ailes de papillon". L'évolution biphasique des lésions du visage est classique. ➤

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Infection

## Mégalérythème épidémique

*continuation*

Lors de la seconde "poussée", il existe souvent de nombreuses maculopapules rosées à contours polycycliques ou circinés, dessinant des arabesques sur les membres. L'éruption disparaît en une dizaine de jours et est provoquée par le parvovirus B19.



dernière page vue



précédente suivante



## Rougeole

Eruption maculopapuleuse, très intense du visage. Un énanthème est également présent. Quelques espaces de peau saine sont toujours reconnaissables. Il existe souvent une surinfection bactérienne de la sphère otorhinolaryngologique ainsi qu'une injection des conjonctives. La rougeole est provoquée par un paramyxovirus.


lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Vésicules

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Vésicules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Maladie mains-pieds - bouche

*continuation*

Apparition de petites vésicules ovalaires des mains et des pieds d'environ 3 à 4 millimètres de diamètre. Ces vésicules sont blanc grisâtre et entourées d'un halo érythémateux. Il existe une vague sensation douloureuse. ▶



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Maladie mains-pieds - bouche

*continuation*

La disparition est rapide; quelques adénopathies disséminées peuvent être présentes. Parfois, on constate l'existence de lésions semblables aux fesses. L'affection est en général provoquée par le virus Coxsackie A16. D'autres virus Coxsackie pourraient être également responsables.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Rubéole

Eruption érythémateuse maculeuse relativement discrète accompagnée de volumineuses adénopathies rétro-occipitales. La coloration rose pâle et l'atteinte discrète de l'état général sont également des éléments à prendre en considération. Chez l'adulte et l'adolescent, la symptomatologie est souvent plus explosive (fièvre et éruption plus intenses). Le virus responsable est un Togavirus.



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 5.6 Signes cutanéo-muqueux du sida



### Zona nécrotique

Ulcérations multiples faisant suite à des placards nécrotiques. Ces lésions ulcérées ont pris une extension importante. ►

lésions élémentaires: Gangrène; Ulcérrations

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



## Zona nécrotique

*continuation*

Après plusieurs semaines les lésions ont laissé subsister des placards cicatriciels légèrement atrophiques.

lésions élémentaires:

Cicatrice

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Dermatite séborrhéique

Une dermatite séborrhéique souvent sévère et rebelle aux traitements classiques peut se voir au cours de l'infection par le VIH. Dans le cas présent, l'atteinte de l'ensemble de la pyramide nasale a été le premier signe révélateur de l'infection par le VIH.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Nodules;  
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Ulcération

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique




lésions élémentaires:

Papules épidermiques

causes:

Infection





## Maladie de Kaposi

Lésion papuleuse, angiomeuse, de couleur violine. L'atteinte préférentielle du visage est classique chez les patients atteints de sida. Dans le cas présent, on constate la coexistence de nodules de Kaposi et de molluscums contagiosums. Les nodules de Kaposi peuvent survenir en grand nombre sur l'ensemble du tégument. ►

lésions élémentaires:

Papules dermiques; Nodules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

image



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Nodules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Maladie de Kaposi

*continuation*

Ces nodules gardent toujours des limites nettes à bords anguleux. Ici encore, la coloration violette est caractéristique. Ces nodules sont en général totalement indolores.

alphabétique

image

lésions élémentaires

causes



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Végétations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Condylomes acuminés

Une extension anormalement importante ou rapidement évolutive de condylomes acuminés doit toujours faire suspecter la présence d'une séropositivité pour le VIH. Dans le cas présent, les condylomes acuminés ont envahi l'ensemble de la vulve ainsi que le canal vaginal.



dernière page vue



précédente suivante

Chapitre 6:

# Infections bactériennes

## 6.1 Impétigo



lésions élémentaires:

Bulles; Croûtes



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

### Impétigo bulleux

Bulles à contenu trouble souvent entourées par un halo érythémateux. Ces bulles se rompent facilement et sont rapidement remplacées par des placards croûteux extensifs. L'impétigo bulleux est classiquement provoqué par le staphylocoque doré.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Croûtes

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## 6.2 Ecthyma



lésions élémentaires:

Croûtes; Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 6.3 Folliculite



Papule inflammatoire centrée par une pustule folliculaire. L'agent responsable est la plupart du temps un staphylocoque. Les folliculites sont fréquemment multiples et siègent classiquement sur les fesses, les cuisses ou le visage.

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques; Pustules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 6.4 Furoncle



Folliculite aiguë profonde débutant par une papule érythémateuse douloureuse, avec apparition d'une pustule centrale. Après évacuation (spontanée ou provoquée) de la composante purulente, le furoncle laisse souvent place à une cicatrice indélébile. Le staphylocoque doré est l'agent responsable.

lésions élémentaires: Papules dermiques; Pustules

causes: Infection



## 6.5 Anthrax



Par définition, l'anthrax résulte de la coalescence de plusieurs furoncles juxtaposés. Un gros macaron douloureux est parsemé de pustulettes qui affleurent à la surface du tégument.

lésions élémentaires:

Nodules; Pustules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente



suivante

## 6.6 Erysipèle



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante



## Erysipèle

*continuation*

A la jambe, on constate l'existence de vastes placards extensifs, identiques à ceux du visage mais dont la composante périphérique est moins accentuée. Ici encore, l'état général est altéré et la fièvre constante. La plupart du temps, une infection mixte (bactéries gram positif et/ou bactéries gram négatif) peut être mise en évidence. Il existe souvent une porte d'entrée comme par exemple une crevasse interdigitoplantaire ou une plaie consécutive à un traumatisme.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Infection



## 6.7 Cellulite rétro-orbitaire



(Dermo-hypodermite bactérienne profonde)

Infection profonde rétro-orbitaire se manifestant à la peau par un oedème péri-orbitaire avec atteinte de l'état général et fièvre élevée. Il s'agit d'une pathologie d'une évidente sévérité étant donné la possible extension vers le sinus caverneux.

lésions élémentaires:

Nodules; Croûtes

causes:

Infection



## 6.8 Emboles septiques



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Pustules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 6.9 Borreliose



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

### Érythème migrateur ou maladie de Lyme

Vaste placard érythémateux d'évolution centrifuge avec pseudoguérison centrale. Parfois, une petite lésion cicatricielle est retrouvée au milieu (trace d'une morsure de tique). ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:


Macule érythémateuse



causes:

Infection





lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Pseudolymphome à type de borreliose

Dans certains cas, la borreliose se reconnaît cliniquement par l'existence d'un ou de plusieurs nodules empâtés siégeant essentiellement aux parties découvertes. Les lobules de l'oreille sont la localisation la plus classique. Ce type de "Pseudolymphome" entre également dans le cadre des borrelioses. On peut assimiler cette lésion à l'ancien "lymphocytome cutané bénin".

alphabétique

image

lésions élémentaires

causes



dernière page vue



précédente



suivante

## 6.10 Infection par proteus



Rarement, lors de plaies contuses, non soignées, un germe gram négatif comme le proteus ou le pseudomonas peut provoquer une nécrose de l'extrémité distale d'un doigt.

lésions élémentaires:

Gangrène

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 6.11 Maladie des griffures de chat (cat scratch disease)



Nodules plus ou moins fluctuants avec ulcération et croûte centrale accompagnées de volumineuses adénopathies. Le jeune patient a été griffé par son chat quelques semaines auparavant. ►

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Nodules; Croûtes



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection; Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente



suivante



## Maladie des griffures de chat (cat scratch disease)

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Nodules; Croûtes; Ulcération



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente



suivante

## 6.12 Intertrigo



Placards érythémateux vernissés ("en feuillets de livre" centrés sur le fond d'un grand pli). La macération et l'infection par germes banaux est classique.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante

## 6.13 Tuberculose cutanée



### Lupus tuberculeux

Grande lésion jaune rougeâtre atteignant la face et le lobule de l'oreille. Aspect de pseudo guérison centrale. La vitropression permet de mettre en évidence une coloration rouge orangé tout à fait caractéristique, que les dermatologues du début de ce siècle comparaient à du "sucre d'orge", friandise tombée aujourd'hui en désuétude. ►

lésions élémentaires:

Tubercules; Cicatrice

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Lupus tuberculeux

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Tubercules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Ulcérations; Cicatrice

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Ecrouelles

Adénopathie cervicale tuberculeuse chronique avec ulcération cutanée.

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



## Bécégite

Abcération non spécifique faisant suite à un vaccin par le BCG.  
La bécégite fait en général suite à une injection trop profonde.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques



dernière page vue




précédente



suivante

## 6.14 Mycobactéries atypiques



lésions élémentaires:

Nodules; Ulcération



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

### Mycobactérose par *mycobacterium marinum*

Cette pathologie se retrouve essentiellement chez les aquariophiles (maladie des aquariums) et se présente classiquement sous la forme de nodules plus ou moins nombreux étagés "en chapelet" s'étendant le long d'un trajet lymphatique. Il s'agit de papulonodules plus ou moins kératosiques et/ou ulcérés. En général, il n'existe que peu de douleurs. La biopsie profonde avec mise en culture sur milieu adéquat permet très facilement de mettre la mycobactérie en évidence. Les papulonodules peuvent être uniques. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Mycobactérose par mycobacterium marinum

*continuation*

Les papulonodules peuvent être multiples. Dans ce dernier cas, on parle parfois de forme sporotrichoïde de la mycobactérose.

lésions élémentaires: Nodules; Ulcérations

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



## Mycobactérose par *mycobacterium chelonei*

Abcès et nodules violacés survenant quelques semaines après injections multiples en mésothérapie (dans le cadre du traitement d'une "cellulite").

lésions élémentaires:

Nodules; Ulcérasions

causes:

Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 6.15 Corynélactéoses



lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

### Erythrasma

Vaste macule brunâtre ou jaune chamois, nettement délimitée, aux bords arrondis, la plupart du temps symétrique, touchant soit les aines, soit les aisselles. Ces lésions sont homogènes et finement squameuses. Le germe responsable est le corynebacterium minutissimum. L'examen en lumière de Wood permet de visualiser une fluorescence rougeâtre saumonée.




dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Kératolyse ponctuée

Petites érosions ponctuées et serpigneuses de la couche cornée se retrouvant essentiellement aux régions d'appui des plantes entraînant une interruption des empreintes plantaires. Souvent, il existe une hyperhidrose plantaire associée.

Les érosions correspondent à des desquamations en bloc de la couche cornée envahie de corynabactéries.

lésions élémentaires:

Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Infection



Chapitre 7:

# Tréponématoses et autres maladies sexuellement transmissibles

## 7.1 Syphilis



### Chancre syphilitique

Exulcération avec érosion siégeant sur le gland ou le fourreau.  
Induration nette au palper.  
Adénopathie inguinale volumineuse le plus souvent unilatérale. ►

lésions élémentaires: Excoriations (ou exulcérations)

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Excoriations (ou exulcérations)



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Chancre syphilitique continuation

Chez la femme, le chancre est souvent accompagné d'un oedème important des grandes lèvres. Les caractéristiques du chancre féminin sont identiques à celui de l'homme.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

alphabétique



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Syphilis secondaire tardive

Papules rouge sombre, parfois brunâtres, non prurigineuses, très nettement indurées, situées au tronc ainsi que sur les régions proximales des membres.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques; Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Syphilides papuleuses

Macules discrètement rougeâtres avec collerette desquamative périphérique (collerette de Biett). Ces syphilides papuleuses surviennent de quatre à douze mois après le chancre.



dernière page vue



précédente



suivante

## 7.2 Gonococcie génitale



Rougeur diffuse du gland, gouttelette purulente au niveau du méat, dysurie importante, pollakiurie. Il faut noter la présence simultanée de deux molluscums contagiosums également transmis sexuellement.

alphabétique

image

lésions élémentaires

causes

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules épidermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## Chapitre 8:

# Mycoses

## 8.1 Dermatophyties



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique




lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





## Tinea faciei

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Vésicules;  
Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Tinea cruris

Dermatophytie du pli inguinal (également appelée eczéma marginé de Hebra).

Cette dermatophytie atteint plus souvent l'homme que la femme. Une bordure vésiculeuse très nette circonscrit une région centrale érythémateuse, parfois brunâtre, toujours squameuse. L'extension vers la face interne de la cuisse est classique.



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



causes:

Infection





## Tinea manuum

*continuation*

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Tinea pedum ou athlete's foot

*continuation*

Parfois, toute la région est érodée,  
signe d'une surinfection  
microbienne. ►

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Tinea pedum ou athlete's foot

*continuation*

La dermatophytie peut s'étendre à la région plantaire qu'elle envahit plus ou moins largement.

Dans certains cas associant tinea manuum et tinea pedum, trois des quatre extrémités sont atteintes (par exemple une main, deux pieds).

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



alphabétique



lésions élémentaires:

Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Tinea capitis ou teigne

Atteinte du cuir chevelu par un dermatophyte. Les enfants sont le plus souvent atteints. Grande plaque alopécique, présence de nombreux cheveux cassés courts sur fond grisâtre et squameux. Le *microsporum canis* est le plus souvent responsable. La teigne est caractéristique de la période prépubertaire: elle se distingue par son aspect farineux de la pelade ou des états pseudo-peladiques.



dernière page vue



précédente



suivante



## Kérion de celse

Placard croûteux, bien délimité, suppurratif, parfois "pseudotumoral". La localisation la plus classique pour l'enfant est le cuir chevelu. ►

lésions élémentaires:

Nodules



causes:


Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique





## Kérion de celse

*continuation*

La localisation la plus classique pour l'adulte est la barbe. ➔

lésions élémentaires:

Nodules

causes:

Infection





## Kérion de celse

*continuation*

L'évolution se fait vers une cicatrice définitive. L'agent responsable en est le *trichophyton mentagrophytes* ou le *trichophyton verrucosum*.

lésions élémentaires:

Cicatrice

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Onychomycose à dermatophytes

Ongle épaisse et opaque,  
onycholyse distale.  
L'ongle devient friable.  
Il n'existe pas de périonyxie  
associé. ►

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Onychomycose à dermatophytes

*continuation*

Plus rarement, l'onychomycose dermatophytique entreprend la tablette superficielle de la lame unguéale et se présente sous la forme de petites taches blanchâtres opaques bien délimitées (aspect de leuconychie). La surface devient secondairement plus friable.

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante

alphabétique

## 8.2 Candidoses



### Muguet

Le muguet est la forme classique de la candidose intrabuccale, caractérisée par un enduit blanchâtre, de consistance crémeuse, recouvrant une surface érosive rouge vif. Un coup de curette enlève l'enduit et met à nu l'érosion. La face interne des joues et la langue sont également atteintes. La muqueuse environnante est inflammatoire. Il existe d'importantes sensations de brûlures. L'agent responsable est le candida albicans.

lésions élémentaires:

Macules achromiques; Excoriations  
(ou exulcérations)

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Fissures



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Perlèche

Fissures le plus souvent symétriques, localisées aux commissures labiales, entourées de petites croûtes d'allure impétiginisée. Les patients édentés ou ayant un dentier mal ajusté sont les plus souvent atteints. Il existe très fréquemment une surinfection bactérienne.



dernière page vue



précédente



suivante



## Intertrigo candidosique

Placard érythémato-suintant plus ou moins symétrique de l'aisselle avec petites lésions satellites à distance. Il existe fréquemment une collerette desquamative périphérique. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





## Intertrigo candidosique

*continuation*

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



## Vulvo-vaginite candidosique

Atteinte symétrique des organes génitaux externes avec collerette desquamative périphérique et petites lésions érythémateuses, punctiformes à distance parfois discrètement pustuleuses. Le prurit est généralement important. Il existe fréquemment une leucorrhée blanchâtre associée.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





## Balanite candidosique

Erythème vernissé entouré d'un fin liseré blanchâtre, atteignant le gland et le sillon balano-préputial. Sensation de brûlures relativement intenses. Les récidives sont fréquentes.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse

causes: Infection





## Péronyxis et onyxis candidosiques

Ongle épaisse, friable, jaunâtre, accompagné d'un péronyxis inflammatoire d'où la pression peut faire sourdre une gouttelette purulente. La douleur est classique. Certains cas de péronyxis candidosiques sont précédés par une dermatite d'irritation, le plus souvent à des protéines végétales ou animales (protein contact dermatitis).

lésions élémentaires:

Pustules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Candidose génito-fessière infantile (nourrisson)

Vaste placard érythémateux vernissé de toute la zone génitofessière avec lésions à distance. Le début de l'affection commence classiquement par le fond des plis (plis inguinaux, pli interfessier ou région anale).



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 8.3 Pityriasis versicolor



Petits placards jaune chamois ou de coloration brunâtre bien délimités, siégeant essentiellement sur le thorax ou sur le cou. ➤

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Pityriasis versicolor continuation

Le prurit est modéré ou absent. Le grattage à la curette permet de mettre en évidence une squame se détachant d'un bloc: signe du copeau. La forme achromante peut être soit squameuse dès le début et donc contagieuse, soit résiduelle après exposition solaire d'un pityriasis versicolor pigmenté.



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Macules achromiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Pityriasis versicolor

continuation

Dans ce cas, elle est non contagieuse et ne représente qu'une séquelle d'un ancien pityriasis versicolor après traitement. En cas de doute, l'examen mycologique permet de mettre en évidence la présence de courts filaments mycéliens accompagnés d'amas de petites spores arrondies (*Malassezia furfur*). A l'examen en lumière de Wood, on constate l'existence d'une fluorescence jaunâtre.



dernière page vue



précédente



suivante

## 8.4 Mycoses profondes



### Sporotrichose

Multiples lésions papulonodulaires, violacées, se développant le long des voies lymphatiques, liées à l'infection par *Sporothrix Schenckii*. Les membres sont le plus souvent atteints.

lésions élémentaires: Papules dermiques; Nodules

causes: Infection





## Mycétome (pied de madura)

Volumineuse tumeur inflammatoire localisée le plus souvent au pied, laissant sourdre par de fines brèches un matériel purulent contenant des grains. Les agents responsables peuvent être des eumycètes ou des actinomycètes.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante

Chapitre 9:

# Parasitoses - Arthropodes

## 9.1 Gale humaine ou scabiose



lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

Maladie parasitaire due au sarcoptes scabiei. Sillons noirâtres, de 5 à 15 mm de long, terminés en une extrémité par un renflement ("éminence acarienne"). Les faces latérales des doigts ainsi que les faces antérieures du poignet en sont les endroits de prédilection.

NOMBREUSES traces d'excoriations parfois accompagnées de fines vésicules plus ou moins translucides disséminées sur l'ensemble du tégument. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Gale humaine ou scabiose

*continuation*

Ces excoriations sont essentiellement le signe d'un prurit vespéral et nocturne très important. ►

lésions élémentaires:

Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Gale humaine ou scabiose

*continuation*

Nodules scabieux : lésions nodulaires rougeâtres très nettement infiltrées, extrêmement prurigineuses des aisselles, du scrotum et de la verge, subsistant même après un traitement bien conduit. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Gale humaine ou scabiose

*continuation*

Chez l'enfant, les lésions atteignent le plus souvent les pieds : nombreuses papules excoriées extrêmement prurigineuses.

lésions élémentaires: Papules épidermiques; Pustules

causes: Infection



## 9.2 Gale animale



NOMBREUSES PETITES PAPULES PRURIGINEUSES DISSÉMINÉES SUR L'ENSEMBLE DU TÉGUMENT. L'ÉVOLUTION EN EST SPONTANÉMENT RÉGRESSIVE.  
IL N'EXISTE PAS DE SILLON.  
L'ATTEINTE DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE EST CLASSIQUEMENT RETROUVEE (CHAT OU CHIEN).

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## 9.3 Pédocephalose



lésions élémentaires:

Croûtes



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

Vaste placard impétiginisé de la région de la nuque lié au grattage à mettre en relation avec une pédocephalose très importante non diagnostiquée. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Pédiculose

*continuation*

Zone d'attache d'une lente sur un cheveu.



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## 9.4 Morpions



Excoriations et présence de lentes fermement accrochées sur les poils pubiens. Il existe également des morpions (*phthirus pubis*) s'accrochant sur des poils pubiens. Sur le corps, on constate parfois l'existence de macules bleu grisâtre relativement discrètes (maculae cerulae). ►

lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macules ardoisées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection



dernière page vue



précédente



suivante

## 9.5 Piqûres d'insectes



lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



### Trombiculose

Réactions immunologiques à des piqûres d'aoûtats (larves hématophages de trombiculae). Petites lésions prurigineuses parfois en ligne siégeant en un endroit quelconque du tégument avec une préférence pour les zones de striction. On retrouve parfois une acumination centrale.





## Trombiculose

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



## Prurigo strophulus

Survenant essentiellement chez l'enfant, le prurigo strophulus se présente sous forme de nombreuses petites papules érythémateuses parfois finement vésiculeuses. Essentiellement présentes sur les jambes, ces lésions sont extrêmement prurigineuses et sont volontiers excoriées. Parfois, on constate une disposition linéaire, ce qui rend le diagnostic beaucoup plus évident. En général, le prurigo strophulus est provoqué par un ectoparasite, hôte d'un chat ou d'un chien.

lésions élémentaires:

Papules dermiques; Vésicules

causes:

Infection





lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Bulles



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Piqûres de puces

*continuation*

Dans certains cas, les lésions deviennent franchement bulleuses, voire hémorragiques.



dernière page vue



précédente



suivante

## 9.6 Leishmaniose



Volumineuse lésion papulocroûteuse entourée d'un "bourrelet inflammatoire". Il n'existe ni douleur ni adénopathie associée. ➤

lésions élémentaires: Papules dermiques; Vésicules

causes: Infection





lésions élémentaires:

Papules dermiques; Vésicules

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Leishmaniose

*continuation*

L'évolution est chronique et cette lésion résiste aux traitements antiseptiques classiques. ►

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Cicatrice



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Leishmaniose

continuation

Après quelques mois, la lésion s'affaisse et laisse subsister une cicatrice plus ou moins visible. Un protozoaire du genre leishmania est responsable. Le phlébotome en est l'agent vecteur, ce qui explique que, dans la majorité des cas, les lésions de leishmaniose se retrouvent sur les zones découvertes (visage en particulier).



dernière page vue



précédente



suivante

## 9.7 Larva migrans (larbush)



Trajet serpiginieux inflammatoire terminé par une petite papule extrêmement prurigineuse. La larva migrans est provoquée par une larve d'ankylostome qui va migrer d'environ 1 centimètre par jour provoquant de la sorte un allongement du trajet inflammatoire. ►

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Infection



recherche



contenu



imprimer

## Larva migrans (larbush)

*continuation*

L'homme se contamine la plupart du temps au bord de la plage (sol pollué par des déjections animales).

Les larves migrantes cutanées se retrouvent essentiellement aux pieds ou aux fesses.

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante

## 9.8 Tungose ou puce chique



Nodule prurigineux, inflammatoire, centré par un petit pertuis noirâtre situé dans la région péri-unguiale d'un orteil. Il peut exister une surinfection secondaire (abcédation). La tungose est provoquée par une puce hématophage : la *Tunga penetrans*.



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Infection

## Tungose ou puce chique

*continuation*

La contamination se fait classiquement aux pieds (marche à pieds nus dans les zones d'endémie, surtout Afrique et Amérique Centrale).



dernière page vue



précédente



suivante

Chapitre 10:

# Psoriasis

## 10.1 Aspects cliniques



### Psoriasis vulgaire

*Forme érythémateuse*

Psoriasis très extensif.  
Grands placards confluents,  
essentiellement érythémateux,  
recouverts de fines squames. 

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Psoriasis vulgaire

continuation

### Forme plâtreuse

Lésions étendues de psoriasis sur le tronc et les membres supérieurs. Dans le cas présent, les squames, épaisses et adhérentes, masquent l'érythème qui apparaît ici et là comme un mince liseré en bordure des lésions. L'aspect des squames est tel qu'on parle souvent de psoriasis crétacé, ou de manière plus imagée, de "squames plâtreuses". ►



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

## Psoriasis vulgaire

### Séméiologie clinique

continuation

Tache de bougie. ►



## Psoriasis vulgaire

### Séméiologie clinique

continuation

Rosée sanglante. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Psoriasis vulgaire

*Psoriasis en gouttes*

continuation

Le psoriasis en gouttes est constitué par d'innombrables petites taches érythématosquameuses, de quelques millimètres de diamètre, réparties dans le cas présent sur la totalité du tégument. ►

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante



## Psoriasis vulgaire

*Psoriasis en gouttes*

continuation

Dans de nombreux cas, il s'agit d'un psoriasis éruptif de l'enfance ou de l'adolescence. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



## Psoriasis vulgaire

continuation

Phénomène de Koebner  
(réaction isomorphe)

Des lésions de psoriasis ont fait leur apparition autour d'une cicatrice d'intervention chirurgicale.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Psoriasis pustuleux

### Corps

Psoriasis pustuleux de la face d'extension de l'avant-bras. Grand placard érythémateux, aux limites nettes, parsemé d'un semis de pustules aplatis, blanc jaunâtre, groupées en amas confluents. ►

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Pustules

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Pustules;  
Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Psoriasis pustuleux

Pieds

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Pustules;  
Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Erythrodermie psoriasique

Le psoriasis érythrodermique est étendu à tout le corps. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## 10.2 Formes topographiques particulières



### Psoriasis palmoplantaire

Psoriasis palmaire. Taches érythématosquameuses aux contours nettement arrondis. Les squames de recouvrement sont épaisses, d'aspect nacré.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Psoriasis des ongles

L'image, très complète, associe une onycholyse distale de coloration jaune, des dépressions cupuliformes dans la partie centrale, un effritement majeur de la tablette unguéale dans la partie proximale. De plus, des lésions psoriasiques classiques occupent toute la région du périonyx.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse; Squames

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Psoriasis du cuir chevelu

Les taches psoriasiques arrondies, érythématosquameuses débordent la lisière du cuir chevelu pour envahir la région cervicale.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Psoriasis des muqueuses

*continuation*

### 2. Psoriasis du gland

Grandes taches non infiltrées, bien limitées, rouges, non squameuses, d'évolution chronique, posant des problèmes de diagnostic différentiel avec d'autres balanites.



dernière page vue



précédente



suivante

Chapitre 11:

# Autres dermatoses

## 11.1 Pityriasis rosé de Gibert



L'éruption se compose de macules ovalaires rosées, d'un diamètre de 1 à 3 cm, présentant une fine desquamation en collerette périphérique. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



## Pityriasis rosé de Gibert

*continuation*

La lésion initiale, en médaillon ovalaire, se distingue habituellement par sa plus grande taille (diamètre de 5 à 6 cm), et son bord accentué. Son orientation oblique sur le thorax est caractéristique.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

image

## 11.2 Parapsoriasis



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

image

lésions élémentaires

alphabétique



## Parapsoriasis varioliforme

L'éruption atteint le tronc et les membres. Elle est polymorphe : lésions papulopustuleuses, lésions nécrotiques souvent hémorragiques, croûtes, cicatrices varioliformes. ►

lésions élémentaires:

Papules dermiques; Pustules;  
Croûtes; Cicatrice

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



## Parapsoriasis varioliforme

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Papules dermiques; Pustules;  
Croûtes; Cicatrice

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Parapsoriasis digitiforme

Les lésions sont ovalaires, de 2 à 5 cm de diamètre, bien limitées, planes, rose jaunâtre, avec une fine desquamation. Ces taches se disposent en traînées dont l'orientation est assez stéréotypée : obliquement sur le thorax le long du trajet des côtes, longitudinalement sur les membres.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Parapsoriasis en grandes plaques

Les lésions sont constituées de vastes placards (10 à 20 cm) de diamètre, siégeant sur le tronc et la racine des membres. L'aspect est polymorphe : plaques érythématosquameuses, de couleur bistre, lésions atrophiques, voire poïkilodermiques.



dernière page vue



précédente suivante

## 11.3 Lichen plan



lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires: Papules dermo-épidermiques

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Lichen plan cutané simple

*continuation*

Des papules peuvent apparaître le long des excoriations par grattage: signe de Koebner. ►

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente




suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Macules achromiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Lichen plan buccal

Les lésions sont blanches, réticulées. Elles siègent avec préférence sur la langue et la partie postéro-inférieure des joues (aspect dit en feuille de fougère).



dernière page vue

précédente

suivante





## Lichen plan buccal

*continuation*

Une forme particulière est le lichen plan érosif : ulcérations rouges, douloureuses, sans tendance spontanée à la guérison. Les ulcérations sont entourées d'un liseré blanchâtre, lichénien.

lésions élémentaires:

Macules achromiques; Ulcérations

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



### Lichen plan cutané verruqueux

Les lésions sont ovalaires, ou coalescentes, infiltrées, de coloration rosée ou violacée. Leur surface est hyperkératosique. Cette dermatose atteint classiquement la face antérieure des jambes. ►

lésions élémentaires:

Verrucosités



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Lichen plan cutané verruqueux

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Verrucosités



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



## Lichen plan des ongles

Ptérygion dorsal et ailerons unguéaux latéraux.

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 11.4 Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD)



Au stade subaigu, la réaction du greffon contre l'hôte peut se manifester par une éruption de type lichénoïde. Les lésions sont disséminées à l'ensemble du tégument. ►

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires: Papules dermo-épidermiques

causes: Non spécifiques



recherche



contenu




imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macules achromiques; Papules  
dermo-épidermiques

causes:

Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer

## Réaction du greffon contre l'hôte (GVHD)

*continuation*

Les lésions peuvent s'accompagner  
d'une atteinte muqueuse.

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante

alphabétique

## 11.5 Lichénification



Placard prurigineux épais, hyperkératosique, bien délimité de la cheville, formant un quadrillage parsemé de stries de grattage. Le terme de névrodermite est parfois utilisé pour définir cette entité.

lésions élémentaires:

Kératoses;  
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.6 Prurigo excorié



lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Prurigo excorié

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Excoriations (ou exulcérations)

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer




dernière page vue



précédente suivante

## 11.7 Lupus érythémateux



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

lésions élémentaires

image

alphabétique

### Lupus érythémateux chronique ("discoïde")

#### 1. Visage

L'éruption est faite de placards érythémateux recouverts d'une hyperkératose adhérente, à prédominance folliculaire. Elle évolue vers une atrophie cicatricielle. Une forme particulière est le lupus érythémateux tumidus.



dernière page vue

précédente

suivante





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Kérotoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Lupus érythémateux chronique ("discoïde")

*continuation*

### 1. Visage

L'érythème s'associe à un oedème important réalisant un ou plusieurs placards saillants à bords nets, à surface lisse, à consistance oedématueuse. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Atrophie;  
Cicatrice

causes:

Soleil, Ultraviolets





## Lupus érythémateux subaigu

L'éruption correspond à une forme profuse, faite de placards annulaires, érythémateux, discrètement squameux, polycycliques, à évolution dépigmentante et télangiectasique.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Soleil, Ultraviolets





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Soleil, Ultraviolets





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse

causes:

Froid



recherche



contenu



imprimer

## Lupus érythémateux systémique

*continuation*

### 2. Doigts

Les lésions des doigts sont habituellement péri-unguérales, érythémateuses et télangiectasiques, parfois violacées (aspect d'"engelures").




dernière page vue



précédente suivante

## 11.8 Maladie de Jessner et Kanof



lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente



suivante

# 11.9 Dermatomyosite



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 1. Visage

Erythème oedémateux, télangiectasique, diffus du visage. Les lésions prédominent habituellement sur les paupières.



dernière page vue

précédente

suivante





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Dermatomyosite

continuation

### 2. Mains et doigts

Lésions d'érythème lilacé prédominant sur la face dorsale des articulations des mains et des doigts, principalement dans les régions supra-articulaires



dernière page vue



précédente suivante



suivante

# 11.10 Sclérodermies



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Macules achromiques; Sclérose

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Atrophie; Cicatrice; Sclérose

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Sclérose



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Sclérodermie généralisée (systémique)

La sclérodermie systémique se localise principalement au visage et aux extrémités. Le visage apparaît figé. L'effilement du nez et le rétrécissement de l'orifice buccal entouré de plis radiés aggravent l'absence de mimique.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Sclérose



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Sclérodermie généralisée (systémique)

*continuation*

La sclérodactylie est caractérisée par un effilement des doigts qui se figent en flexion. Des ulcérations douloureuses siègent sur les pulpes.



dernière page vue




précédente



suivante

# 11.11 Lichen scléreux



lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Sclérose

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule purpurique;  
Macules achromiques; Sclérose

recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Macules achromiques; Sclérose



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Lichen scléreux

*continuation*

### Gland

Taches blanches porcelaines, soit disséminées, soit plus souvent péri-méatiques.



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.12 Sarcoïdose



lésions élémentaires:

Nodules; Tubercules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques


dernière page vue

précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Sarcoïdose

*continuation*

### *Forme à gros nodules*

Nodules de plus grande taille (diamètre de 5 à 10 mm), lisses, fermes, de coloration violacée ou rouge brunâtre, avec le même aspect d'infiltration lupoïde, jaunâtre, à la vitropression. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Sarcoïdose

*continuation*

### *Forme angiolupoïde*

Cette variété clinique très particulière consiste en une infiltration rouge violacé, saillante, arrondie ou ovale, siégeant sur le nez. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:



recherche

contenu

imprimer

Macules ardoisées; Nodules;  
Tubercules

causes:

Facteurs mécaniques

## Sarcoïdose

continuation

*Sarcoïdes sur cicatrices ("scar sarcoidosis")*

Développement de nodules sarcoïdes autour de matériel étranger inclus dans une cicatrice. Ces nodules apparaissent parfois dans le cadre d'une sarcoïdose systémique active. Parfois, au contraire, ils représentent une simple réaction locale granulomateuse.

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue

précédente

suivante

alphabétique

## 11.13 Granulome annulaire



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.14 Nécrobiose lipoïdique



Grande plaque préribiale, scléro-atrophique, à bords nets, rouges et télangiectasiques. Sa surface est brillante, ce qui explique le "coup de flash" lors de la prise du cliché photographique. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Atrophie;  
Cicatrice; Sclérose

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

image

lésions élémentaires

alphabétique



## Nécrobiose lipoïdique

*continuation*

Le centre de la plaque est lisse, d'aspect cicatriciel, souvent jaunâtre par surcharge graisseuse.

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)

**lésions élémentaires:**

Macule érythémateuse; Atrophie;  
Cicatrice; Sclérose

**causes:**

Non spécifiques

[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## 11.15 Vasculites



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Vasculite allergique

La vasculite allergique est sur le plan histologique caractérisée par une infiltration de polynucléaires neutrophiles souvent pycnotiques dans et autour de la paroi vasculaire, d'où le terme de vasculite leucocytoclasique souvent utilisé. Elle se présente principalement sous deux formes bien définies : purpurique et nécrotique. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule purpurique;  
Papules dermiques

recherche

contenu

imprimer

causes:

Non spécifiques

## Vasculite allergique

*continuation*

### *Forme purpurique*

Dans cette forme, les lésions correspondent essentiellement à des papules purpuriques infiltrées qui atteignent principalement les jambes et peuvent s'étendre sur d'autres territoires tégmentaires.



lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue

précédente

suivante



lésions élémentaires:

Macule purpurique;  
Papules dermiques; Gangrène

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Vasculite allergique continuation

### *Forme nécrotique*

Des papules purpuriques coexistent avec des lésions vésiculobulleuses, pustuleuses ou nécrotiques, d'où l'appellation ancienne dans la littérature française de : "trisymptôme de Gougerot".



lésions élémentaires:

Macule purpurique; Gangrène



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Livedo vasculitis

Image de vasculite chronique des régions malléolaires, caractérisée par un purpura rapidement nécrotique, laissant place à des ulcérasions de très petite taille, douloureuses, bordées par un anneau violacé. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Livedo vasculitis

*continuation*

lésions élémentaires: Macule purpurique; Gangrène

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule purpurique; Nodules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires: Papules dermiques; Nodules

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.16 Erythème noueux



*Phase d'état*

Nodules rouges, douloureux, siégeant essentiellement aux faces d'extension des membres inférieurs, accompagnés habituellement de fièvre et d'arthralgies. ►

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Erythème noueux

continuation

### Phase régressive

Les nouures évoluent en une dizaine de jours en prenant des aspects contusiformes bleus et jaunâtres.



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.17 Hypodermites nodulaires



Nodules fermes, peu inflammatoires, cyanotiques, situés aux tiers inférieurs des jambes. Ils surviennent chez des femmes présentant le plus souvent un profil de surcharge pondérale et d'insuffisance veineuse chronique.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 11.18 Pyoderma gangrenosum



Ulcération superficielle, à bords circulaires, limités par un bourrelet inflammatoire, ferme, creusé de clapiers purulents. L'affection peut être idiopathique ou associée à diverses pathologies internes, en particulier des affections digestives comme l'iléite de Crohn ou la colite ulcéreuse. Les illustrations correspondent à deux stades d'évolution d'une même lésion de la jambe. ►

lésions élémentaires:

Pustules; Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

image

lésions élémentaires

alphabétique



## Pyoderma gangrenosum

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Pustules; Ulcérations

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## 11.19 Erythème polymorphe



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermo-épidermiques

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

L'erythème polymorphe est un syndrome cutanéo-muqueux associé à des circonstances étiologiques variées parmi lesquelles les infections herpétiques occupent une place de choix.

*Forme en cocardes, non bulleuse*

Maculopapules rouge sombre, arrondies, symétriques, du dos des mains. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermo-épidermiques

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Erythème polymorphe

*continuation**Forme en cocardes, non bulleuse*

La configuration caractéristique  
est en "cible" ou en "cocarde". 



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermo-épidermiques;  
Bulles  
Non spécifiques

causes:



recherche



contenu



imprimer

## Erythème polymorphe

*continuation*

### *Forme bulleuse*

Les maculopapules en cocarde sont bulleuses en leur centre et peuvent évoluer de manière nécrotique. Les muqueuses sont parfois atteintes.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

image

lésions élémentaires

alphabétique

## 11.20 Syndrome de sweet (dermatose aiguë fébrile neutrophilique)



Plaques érythémateuses, infiltrées, bien délimitées, à centre déprimé, localisées sur le visage et les membres. Température élevée, arthralgies, douleurs abdominales et neutrophilie sanguine accompagnent la symptomatologie cutanée.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

## 11.21 Pemphigoïde bulleuse



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Bulles

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

*Stade d'évolution précoce*

Grands placards urticariens polycycliques, bordés de quelques bulles tendues, à liquide clair, de taille variée. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Pemphigoïde bulleuse

*continuation*

### *Stade ultérieur d'évolution*

Présence de très nombreuses bulles tendues de taille variée, dont certaines sont hémorragiques. Certaines bulles se rompent en laissant de vastes érosions cutanées.

lésions élémentaires:

Bulles



causes:

Non spécifiques



## 11.22 Pemphigus auto-immuns



lésions élémentaires:

Bulles; Ulcérasions

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

On distingue deux formes de pemphigus auto-immuns, selon le siège préférentiel du clivage intra-épidermique : d'une part, les pemphigus "profonds" (pemphigus vulgaire et pemphigus végétant) et d'autre part, les pemphigus "superficiels" (pemphigus érythémateux).

### Pemphigus vulgaire

Cutané

Présence de bulles superficielles et flasques, qui se rompent facilement, en laissant à nu de vastes érosions. ►




dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Pemphigus vulgaris

*continuation*

### Buccal

Erosions buccales, traînantes et douloureuses de la face interne des joues, du palais, des collets dentaires. Elles mettent à nu une surface rouge vif, sans enduit fibrineux. Des érosions similaires peuvent survenir dans d'autres maladies bulleuses, mais c'est dans le pemphigus qu'elles sont les plus constantes et les plus caractéristiques.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Bulles;  
Squames; Croûtes

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

## Pemphigus érythémateux

Plaques érythématosquamocroûteuses et parfois prurigineuses des zones séborrhéiques du visage et du tronc. Ces lésions représentent l'évolution de bulles superficielles.



lésions élémentaires

image

alphabétique



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Bulles;  
Squames; Croûtes

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## 11.23 Pemphigus chronique bénin familial (maladie de Hailey-Hailey)



lésions élémentaires: Vésicules; Bulles; Fissures

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## 11.24 Dermatite herpétiforme



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Vésicules;  
Bulles

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Vésicules;  
Bulles

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Dermatite herpétiforme

*continuation*

La symétrie des lésions, le prurit constant et l'association à une entéropathie sensible au gluten sont les autres particularités de cette dermatose rare.



dernière page vue



précédente suivante

## 11.25 Dermatose à IgA linéaires



lésions élémentaires:

Bulles; Ulcérations

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante

## 11.26 Epidermolyses bulleuses



lésions élémentaires:

Bulles



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques


dernière page vue

précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Bulles



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



lésions élémentaires: Bulles; Croûtes; Ulcérations

causes: Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer

## Epidermolyses bulleuses dystrophiques

Dans les épidermolyses bulleuses dystrophiques, dont il existe de nombreuses variantes, les bulles traumatiques guérissent en laissant des cicatrices atrophiques et des grains de milium. Certaines articulations peuvent être fixées en flexion. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Epidermolyses bulleuses dystrophiques

*continuation*

Des anomalies dentaires ou unguéales sont parfois associées. Le mode de transmission est variable selon les formes.

lésions élémentaires:

Bulles



causes:

Facteurs mécaniques



# 11.27 Bullose des diabétiques



lésions élémentaires:

Bulles



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

alphabétique

image

lésions élémentaires

causes



dernière page vue



précédente suivante

## 11.28 Porphyrie cutanée tardive



lésions élémentaires:

Bulles; Ulcérasions



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques; Soleil,  
Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante



## Porphyrie cutanée tardive

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Cicatrice



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques; Soleil,  
Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante



## Dermatose phototoxique bulleuse (dermite des prés)

Eruption érythémato-vésiculeuse ou bulleuse reproduisant le dessin d'une herbe ou d'une feuille. Soleil, humidité et le contact avec la plante sont les trois conditions requises pour l'apparition de cette dermatose.

lésions élémentaires:

Vésicules; Bulles

causes:

Soleil, Ultraviolets;  
Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante

# 11.29 Acné et rosacée



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Nodules;  
Kératoses; Pustules

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Papules dermiques; Pustules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Acné vulgaire

*continuation*

### Acné papulo-pustuleuse

L'acné papulo-pustuleuse comporte essentiellement des papules et des papulopustules très inflammatoires, isolées ou confluentes. Elle est souvent associée à de la séborrhée. Les comédons ne sont jamais absents.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Acné vulgaire

*continuation*

### Acné comédonienne

L'acné comédonienne se caractérise par la prédominance nette des comédons sur les autres lésions de l'acné juvénile. Les comédons sont soit ouverts (points noirs), soit fermés (points blancs). Les points noirs constituent les lésions marquantes sur cette illustration. Les acnés cosmétiques appartiennent souvent à cette variété. ►



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Nodules; Cicatrice



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Acné vulgaire

*continuation*

### Acné nodulo-kystique

En plus des lésions élémentaires précitées (comédons, papules, pustules), cette forme d'acné présente des kystes épidermiques d'origine folliculaire et des nodules inflammatoires résultant de la rupture de ces kystes. Les nodules peuvent évoluer vers des abcédations qui, en se tarissant, laissent des cicatrices indurées, déprimées ou rétractiles.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules; Pustules; Ulcérations;  
Cicatrice

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Nodules; Pustules; Ulcérations;  
Cicatrice

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Kératoses;  
Pustules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Acné infantile (Acne infantum)

Cette variété d'acné d'origine indéterminée apparaît chez les jeunes enfants entre 3 et 6 mois. Elle est habituellement sévère, mais s'estompe le plus souvent en 1 à 2 ans. Elle est caractérisée par la présence de comédons, de papules et de pustules principalement situées sur les joues. Il convient de la distinguer d'une variété beaucoup plus rare d'acné : l'acné des nouveau-nés (acné neonatorum).



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Chaleur





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques; Pustules

causes:

Chaleur



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques; Pustules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

# 11.30 Eruptions médicamenteuses



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Macules pigmentées; Bulles

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer

## Erythème pigmenté fixe

Tache érythémato-pigmentée, bien circonscrite, survenant 48 heures après la prise d'un médicament. Dans le cas présent, il s'agit de la phénacétine. L'évolution se fait vers une pigmentation résiduelle qui disparaît progressivement. La réintroduction du médicament entraîne la récidive strictement au même endroit. Dans certains cas, le centre de la lésion peut être bulleux (toxidermie bulleuse fixe).



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Agents chimiques





lésions élémentaires:

Bulles; Ulcération



causes:

Agents chimiques

## Syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique)

Grands décollements épidermiques laissant de vastes surfaces érodées. L'éruption s'étend habituellement à l'ensemble du tégument. Toutes les muqueuses participent au processus de nécrolyse. La situation est similaire à celle des grands brûlés.

Médicament responsable dans le cas précis: un sulfamidé.





lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Squames

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## Eruptions lichénoïdes

Eruption médicamenteuse lichénoïde à la méthyl-dopa. L'image clinique est assez proche de celle du lichen plan. Néanmoins, les lésions sont souvent plus rougeâtres et squameuses. La distribution des lésions est symétrique et plus diffuse que dans la majorité des lichens plans. ►



## Eruptions lichénoïdes

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Papules dermo-épidermiques;  
Squames

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Soleil, Ultraviolets;  
Agents chimiques

**lésions élémentaires:**

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques; Vésicules

**causes:**

Soleil, Ultraviolets;  
Agents chimiques





lésions élémentaires:

Papules dermiques; Pustules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Eruption acnéiforme du visage

Cette éruption médicamenteuse est liée dans le cas présent à des injections intramusculaires de vitamine B 12.

Elle est monomorphe sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par la présence de papules et de pustules et par l'absence de comédons.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames



causes:

Agents chimiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Agents chimiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Atrophie cortisonique

La prise prolongée de corticostéroïdes par voie systémique entraîne une réduction du tissu collagène aboutissant à un état atrophique du tégument notamment aux faces d'extension des avant-bras. L'atrophie s'accompagne de purpura, d'ecchymoses et aussi de ces très particulières pseudo-cicatrices stellaires résultant d'une déchirure interne (sans plaie) du tissu dermique.

lésions élémentaires:

Macule purpurique; Atrophie;  
Cicatrice

causes:

Agents chimiques






## Bromides et iodides (halogénides)

Réactions très particulières à la prise de médicaments bromés ou iodés; les bromides et les iodides se présentent comme des placards et des macarons infiltrés et végétants, parfois couverts de pustules et de croûtes. L'illustration est celle d'une bromide par bromazépam.

lésions élémentaires: Nodules; Pustules; Croûtes

causes: Agents chimiques





## Hyperplasie gingivale

Les hyperplasies gingivales sont souvent d'origine médicamenteuse. Les médicaments les plus fréquemment incriminés sont les anti-épileptiques (phénytoïne, valproate de sodium) et la ciclosporine, comme dans le cas présent.

lésions élémentaires:

Végétations



causes:

Agents chimiques





lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets;  
Agents chimiques

## Chloasma (mélasma)

Dermatose spécifiquement féminine, le chloasma est une hyperpigmentation siégeant sur la partie supérieure du visage, (tempes et front), mais respectant la bordure du cuir chevelu. Elle est généralement bilatérale, mais jamais parfaitement symétrique. Sa couleur varie du brun clair au brun foncé. Le chloasma survient lors de la grossesse ou de traitements contraceptifs hormonaux. Il s'accentue durant l'été, et l'influence aggravante d'une exposition aux rayons ultraviolets est manifeste.



dernière page vue



précédente suivante

# 11.31 Dermatoses dues a des agents physiques



## Lucite estivale bénigne

Petites papules érythémateuses acuminées de quelques millimètres de diamètre et papulo-vésicules groupées sur la face d'extension des membres supérieurs (comme dans le cas présent), des membres inférieurs et sur le décolleté. L'éruption respecte habituellement le visage. Elle survient quelques heures après un bain de soleil.

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Soleil, Ultraviolets



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue




précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Papules dermiques

causes:

Soleil, Ultraviolets



recherche



contenu



imprimer

## Lucite polymorphe

Papules érythémateuses de petite taille ou plaques oedématueuses situées sur les parties découvertes, en particulier le visage (front, nez, pommettes), les régions rétro-auriculaires, le décolleté et la face d'extension des membres.  
L'éruption apparaît au printemps dans plus de 70% des cas.

Le contexte d'une exposition inhabituelle au soleil n'est requis. L'affection apparaît dans le contexte de la vie quotidienne, que le temps soit clair ou nuageux.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse

[recherche](#)[contenu](#)[imprimer](#)

causes:

Chaleur; Froid

## Engelures

Infiltrations érythématocyanotiques des orteils, susceptibles de se couvrir de bulles claires ou hémorragiques, d'ulcérations, de croûtelles. Elles sont violettes et douloureuses au froid; au contraire, elles deviennent rouges et prurigineuses lorsque le sujet pénètre dans un local chauffé.


Les engelures sont plus fréquentes chez la femme jeune, mais elles s'observent à tout âge dans les deux sexes. Parmi les autres localisations, citons les talons, les chevilles, les genoux, les oreilles.

[dernière page vue](#)[précédente](#)[suivante](#)

Chapitre 12:

# Dermatologie topographique

## 12.1 Alopéciés



lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Non spécifiques



### Pelade

La pelade du cuir chevelu est caractérisée par l'apparition de plaques lisses et brillantes alopéciques, arrondies ou ovalaires, qui s'agrandissent plus ou moins rapidement. Les plaques sont habituellement glabres de manière homogène et parsemées en périphérie de cheveux cassés courts, dits "en point d'exclamation". ►





lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Pelade

*continuation*

La pelade de la région occipitale, dite pelade ophiasique, serait plus rebelle à la repousse. D'autres régions pileuses peuvent être affectées : sourcils, cils, barbe, régions axillaire ou pubienne. Dans certains cas, la pelade peut être généralisée : on parle de pelade décalvante et universelle totale.

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente



suivante



## Etats pseudopeladiques

L'état pseudopeladique consiste en une alopécie circonscrite de forme et de taille variée, aux limites plus ou moins nettes. La peau est atrophique et adhérente aux plans sous-jacents. Cet aspect clinique particulier d'allure cicatricielle peut être symptomatique de diverses affections : lupus érythémateux, lichen plan, folliculite décalvante. Certains cas sont idiopathiques : on parle de pseudopelade.

lésions élémentaires: Atrophie; Cicatrice

causes: Non spécifiques





## Trichotillomanie

Liée à un arrachage massif des cheveux, la trichotillomanie est une alopécie à bords irréguliers, "géographiques", nets ou flous. La plage alopécique peut être entièrement glabre ou parsemée de touffes de cheveux cassés, de longueur très différente. Elle est soit lisse, soit couverte ici et là de petites excoriations ou de croûtes dues au grattage du cuir chevelu. Des lésions similaires peuvent apparaître aux ongles (onychotillomanie).

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Facteurs mécaniques





lésions élémentaires:

Non spécifiques



causes:

Non spécifiques



## 12.2 Maladies des muqueuses



lésions élémentaires:

Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

### Aphtes, aphtose, maladie de Behçet

Petites ulcérations buccales, à l'emporte-pièce, caractérisées par un fond jaunâtre rappelant la couleur du "beurre frais" et par un halo inflammatoire, érythémateux.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Ulcération



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Aphtes, aphtose, maladie de Behçet

*continuation*

Souvent très douloureux, les aphtes s'accompagnent d'une adénopathie. Des aphtes peuvent survenir sur les muqueuses génitales (aphtose bipolaire).




dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Pustules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente




suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires: Végétations

causes: Non spécifiques





lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer




dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Langue géographique (glossite exfoliatrice marginée)

Placards dépapillés, nettement délimités entourés d'un discret rebord blanchâtre. L'extension de ces zones se fait de manière excentrique avec changement d'aspect d'un jour à l'autre.

Il pourrait s'agir d'une variété de psoriasis lingual. L'association avec la langue scrotale est fréquente.



dernière page vue



précédente



suivante

## 12.3 Cheilites



### Cheilite de contact allergique

Eczéma de contact allergique lié à l'application d'un stick à lèvres contenant du baume du Pérou. L'atteinte eczémateuse déborde largement les limites de la semi-muqueuse de la lèvre pour s'étaler sur la peau avoisinante.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Agents chimiques



recherche



contenu




imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Fissures

causes:

Agents chimiques



## 12.4 Divers



lésions élémentaires:

Papules épidermiques; Kératoses

causes:

Soleil, Ultraviolets



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



## Maladie de Darier

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Soleil, Ultraviolets





lésions élémentaires:

Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante



lésions élémentaires:

Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Ichtyose liée au sexe

Appelée également ichtyose nigricante, cette variété d'ichtyose ne se rencontre que chez le garçon, ne respecte pas les grands plis et se présente sous forme de larges squames noirâtres adhérentes. ►



dernière page vue



précédente



suivante



## Ichtyose liée au sexe continuation

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Squames

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante

## Kératodermie palmo-plantaire héréditaire (maladie de Thost-Unna)

Apparaissant très tôt dans la vie (entre la 4ème et la 8ème semaine), cette kératodermie palmo-plantaire représente le modèle de la maladie à transmission autosomique dominante. Il existe de vastes placards kératosiques jaunâtres accompagnés d'importantes crevasses aux plis palmaires. Cette kératodermie est nettement délimitée et ne s'étend pas vers le poignet. Les lésions kératosiques sont soulignées par une bordure inflammatoire. Il existe parfois une hyperhidrose associée.



lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Pityriasis rubra pilaire

Association d'une kératodermie palmoplantaire diffuse jaune orangée, parcourue de petites fissures et de papules cornées folliculaires réalisant un quadrillage cutané. A la palpation, il existe une sensation de râpe ("papier émeri"). ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Pityriasis rubra pilaris

*continuation*

Les papules rosâtres sont acuminées à leur sommet et surmontées par un petit cône corné folliculaire. L'évolution est le plus souvent chronique. Des poussées d'érythrodermie peuvent s'observer au fil du temps.



dernière page vue



précédente



suivante



## Kératose pilaire (kératose folliculaire rouge atrophiant)

Dermatose extrêmement fréquente, entourée d'un fin liseré érythémateux, caractérisée par une petite hyperkératose des ostiums folliculaires. Cette "affection" est transmise sur le mode autosomique dominant et s'observe habituellement sur les joues et les tempes. Chez l'adulte, les faces extérieures des bras et antérieures des cuisses sont le plus fréquemment atteintes. A la palpation, il existe une sensation de râpe. Les périodes ensoleillées atténuent l'affection. ►

lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Kératose pilaire (kératose folliculaire rouge atrophianante)

*continuation*

lésions élémentaires:

Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente suivante



## Erythème annulaire centrifuge (de Darier)

Vastes lésions annulaires des bras avec aspect de guérison centrale. Les bords érythémateux nettement infiltrés s'étendent lentement de façon centrifuge.

Apparue brutalement, cette affection est devenue chronique, chaque anneau évoluant en plusieurs semaines à la "vitesse" de 2 à 3 mm par semaine. Il faut remarquer que lorsque deux anneaux se rejoignent, ils ne "chevauchent" jamais.

Le prurit est absent. ►

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Erythème annulaire centrifuge (de Darier)

*continuation*

Il importe toujours de rechercher une éventuelle cause sous-jacente bien que dans un certain nombre de cas, l'érythème annulaire centrifuge reste idiopathique. Parmi les étiologies potentielles, il faut relever: foyers infectieux à distance, viroses, maladie de Hodgkin, cancer viscéral, thyroïdite auto-immune, lupus érythémateux, hépatopathie. Dans le cas présent, il s'agissait d'une hépatite virale à HBV qui après un épisode aigu s'est transformée ultérieurement en hépatite chronique agressive.



dernière page vue



précédente



suivante

## 12.5 Ulcères de jambe



### Ulcère de jambe d 'origine veineuse

Vaste ulcération à bords souples et à contours variables d'un cas à l'autre. Le fond de l'ulcère est bourgeonnant en certains endroits et est sanieux et nécrotique en d'autres. Des troubles trophiques de voisinage sont évidents : dermite ocre, atrophie blanche. Ce type d'ulcère peut être la conséquence d'une maladie variqueuse ou d'un syndrome postphlébitique. ►

lésions élémentaires:

Ulcérations; Atrophie



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



lésions élémentaires:

Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Croûtes; Ulcérasions



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



précédente suivante

## Ulcère de jambe d'origine artérielle

Ulcération à l'emporte-pièce le plus souvent unilatérale située près de la malléole. Il n'existe pas de trouble trophique associé. Le pouls pédieux est difficilement perceptible. Les ulcères d'origine artérielle sont rapides d'évolution et provoquent d'intenses douleurs souvent accentuées par le décubitus. Ils sont beaucoup moins fréquents que les ulcères d'origine veineuse et peuvent se rencontrer au cours du diabète, de l'artériosclérose ou de la maladie de Buerger.



## Ulcère d'origine capillaritaire

Ulcération torpide peu profonde, à bords déchiquetés et anfractueux. Il existe une angiodermite pigmentaire et purpurique de voisinage parfois associée à de petits placards d'atrophie blanche. Les douleurs sont souvent intenses et permanentes. Elles ne sont pas influencées par le décubitus. Le diabète et l'artériosclérose sont des facteurs favorisants.

lésions élémentaires:

Macule purpurique; Croûtes;  
Ulcérations; Atrophie

causes:

Non spécifiques





## Mal perforant plantaire (ulcère neurotrophique)

Ulcère profond et circulaire, découpé à l'emporte pièce, situé au point d'appui métatarsien. Le fond est nécrotique. Il n'existe aucune tendance à la cicatrisation spontanée. Les douleurs sont quasi absentes. Un diabète à composante neuropathique majeure est associé dans le cas présent. D'autres affections neurologiques peuvent en être la cause (syringomyélie par exemple). ►

lésions élémentaires:

Ulcérations



causes:

Non spécifiques





## Mal perforant plantaire (ulcère neurotrophique)

*continuation*

lésions élémentaires:

Ulcérations

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 12.6 Pathomimies



### Automutilation cutanée à type de simulation

Vaste ulcération escharotique du dos de la main provoquée intentionnellement par de la soude caustique. Les limites sont nettes, les bords anguleux et la configuration "surprenante". L'apparition de la lésion a été très rapide et les récidives au même endroit sont classiques. L'évolution est le plus souvent capricieuse, la guérison spontanée retardée, la persistance indéfinie. ►

lésions élémentaires: Croûtes; Ulcérations; Cicatrice

causes: Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires: Croûtes; Ulcérations; Cicatrice

causes: Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Automutilation cutanée à type de simulation

*continuation*

Dans le cas présent, la patiente agissait volontairement dans un but frauduleux afin d'obtenir un avantage (obtention d'une prolongation d'incapacité de travail).



lésions élémentaires:

Croûtes; Ulcérations



causes:

Facteurs mécaniques





lésions élémentaires:

Croûtes; Ulcérations



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

Chapitre 13:

# Tumeurs cutanées bénignes

## 13.1 Tumeurs épidermiques



lésions élémentaires:

Verrucosités; Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



## Verrues séborrhéiques (kératoses séborrhéiques)

*continuation*

lésions élémentaires:

Verrucosités; Kératoses

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Verrucosités; Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Naevus épidermique verruqueux (hamartome épidermique)

*continuation*

lésions élémentaires: Verrucosités; Kératoses

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

causes:

Macule érythémateuse;  
Verrucosités; Pustules; Squames;  
Gangrène  
Non spécifiques

### Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.)

Le N.E.V.I.L. apparaît sous forme de placards érythématosquameux, psoriasiformes, parfois lichénoïdes ou verruqueux, disposés en bandes linéaires suivant les lignes de Blaschko (comme les lésions du naevus épidermique verruqueux). Des poussées inflammatoires peuvent survenir, entraînant une exacerbation du prurit, des excoriations plus ou moins importantes, une eczématisation secondaire et même des plages de nécrose. ►



dernière page vue



précédente suivante



## Naevus épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (N.E.V.I.L.)

*continuation*

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Verrucosités; Pustules; Squames;  
Gangrène  
Non spécifiques

causes:





lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Naevus de Becker (naevus épidermique pigmenté et pileux; mélanose de Becker)

Placard hyperpigmenté unilatéral situé préférentiellement sur la poitrine ou l'épaule et parfois recouvert de poils. Il apparaît le plus souvent chez l'adulte jeune après une exposition solaire.

Il correspond à un naevus épithéial (épidermique et pilaire) tardif avec hypermélanose épidermique secondaire.



dernière page vue



précédente



suivante



## Acanthome à cellules claires

Petite tumeur généralement isolée, arrondie, en dôme, ferme, de couleur rosée avec une surface le plus souvent humide. Le diagnostic de cette lésion est essentiellement histopathologique.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Kérato-acanthome

Nodule très bien limité, surmonté d'un bouchon corné central. Sa croissance est rapide. La taille maximale de la lésion est atteinte en quelques semaines. L'évolution se fait habituellement vers la régression spontanée en quelques mois.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante



### Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma)

Papulonodule rétro-auriculaire de un à deux centimètres de diamètre, bien circonscrit, légèrement rosé entouré d'un halo inflammatoire. La lésion est séparée en deux parties par un sillon (pliure). ►

lésions élémentaires:

Nodules; Fissures



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques




dernière page vue



précédente



suivante



### Acanthome fissuré (spectacle frame acanthoma)

*continuation*

L'acanthome survient dans les semaines ou les mois qui suivent le port de nouvelles montures de lunettes.

lésions élémentaires:

Nodules; Fissures

causes:

Facteurs mécaniques



## 13.2 Tumeurs pilaires et sébacées



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

### Kyste épidermoïde

Nodule sous-cutané, inflammatoire, souvent centré par un orifice punctiforme par lequel on peut exprimer un matériel blanchâtre ou jaunâtre, malodorant. Simple ou multiple, il survient surtout sur les régions séborrhéiques, dans le cadre d'une acné vulgaire ou nodulokystique. Le kyste épidermoïde est parfois appelé à tort "kyste sébacé".



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Tricho-épithéliomes

Formations papuleuses translucides, aplatis ou globuleuses, de 2 à 5 mm, roses ou blanches, parfois surmontées de fines télangiectasies, siégeant électivement à la face (nez, sillons nasogéniens, joues, front, menton). Il s'agit généralement de lésions multiples et héréditaires, apparaissant dès l'enfance ou à l'adolescence.



dernière page vue



précédente suivante



## Adénomes sébacés séniles (hyperplasies sébacées)

Petites formations jaunâtres, ombiliquées, de 3 à 6 mm de diamètre, survenant sur les régions séborrhéiques de la face (front, tempes, joues) après la cinquantaine, dans les deux sexes.



lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Adénomes sébacés séniles (hyperplasies sébacées)

*continuation*

Ces adénomes correspondent à des hyperplasies adénomateuses séniles des glandes sébacées.

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Soleil, Ultraviolets





lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Naevus sébacé de Jadassohn (hamartome sébacé)

Il s'agit d'une tumeur souvent congénitale, siégeant au cuir chevelu ou à la face. L'aspect se modifie avec l'âge. Pendant l'enfance, c'est une plaque alopécique ovalaire ou rosée, légèrement surélevée. A partir de la puberté, la surface devient souvent mamelonnée, verrueuse, de couleur jaune orangé caractéristique. A l'âge adulte, il peut exceptionnellement donner naissance à un carcinome basocellulaire.

lésions élémentaires

causes

alphabétique



dernière page vue




précédente



suivante

## 13.3 Tumeurs sudorales



### Syringomes

Petites lésions, toujours multiples mesurant de 1 à 3 mm de diamètre. Elles forment des papules lisses, de couleur chair, survenant généralement sur le visage (notamment les paupières), la poitrine, le cou et les aisselles.

lésions élémentaires:

Papules dermiques

causes:

Non spécifiques





## Porome eccrine

Tumeur solitaire et bénigne, saignotante, congestive, dont la base large est cerclée par un collier de kératine. Elle se localise préférentiellement aux régions plantaires péritalonières. Le diagnostic différentiel se pose avec un botriomycome ou un mélanome malin achromique. ▶

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



## Porome eccrine

*continuation*

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Cylindromes

Tumeurs multiples et bénignes, souvent familiales, apparaissant sur le cuir chevelu, qui devient mamelonné et bosselé (tumeurs en turban). La surface des tumeurs est lisse, glabre, de couleur normale ou rose avec des télangiectasies. Il n'y a pas d'adhérence aux plans profonds.



dernière page vue



précédente suivante

## 13.4 Tumeurs du tissu conjonctif



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

### Histiocytofibrome (fibrome cutané)

Formation nodulaire intradermique, de 5 à 6 mm de diamètre, ferme à la palpation, généralement localisée aux membres inférieurs. Sa surface est plus ou moins pigmentée et souvent légèrement kératosique. L'histiocytofibrome pourrait être dans certains cas consécutif à des piqûres d'insectes. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques

## Histiocytofibrome (fibrome cutané)

*continuation*

Une variété particulière est le fibrome en pastille, nodule rose à surface lisse, brillante entouré par une collerette squameuse très fine, séparée de la tumeur par un sillon.



dernière page vue



précédente



suivante



## Fibrokératome digital acquis

Petite tuméfaction située sur les doigts ou les orteils, plus rarement les paumes et les plantes. Comme le fibrome en pastille, c'est une lésion solitaire en dôme, parfois allongée et pédiculée, entourée d'un fin liseré de démarcation. La surface est légèrement verrueuse. Elle est peut-être consécutive à un traumatisme.

lésions élémentaires:

Verrucosités



recherche



contenu



imprimer

causes:


Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Cicatrice



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques

## Chéloïde


Tumeur fibreuse, à surface lisse, rouge et tendue, un peu bosselée, ayant parfois en périphérie des expansions pseudopodiques, dites en pattes de crabe. Elles sont très souvent prurigineuses, ou douloureuses spontanément ou au toucher. On distingue des chéloïdes post-lésionnelles, secondaires à des plaies, des brûlures, des vaccinations, ou des lésions inflammatoires de la peau (comme l'acné juvénile), et des chéloïdes spontanées, plus fréquentes chez les sujets à peau noire.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Molluscum pendulum

Petite masse charnue, très molle, ayant en moyenne 3 à 5 mm de diamètre, implantée par un pédicule étroit sur la peau. Ces lésions souvent multiples se localisent préférentiellement aux plis axillaires et inguinaux, dans les régions cervicales et orbitopalpébrales.




dernière page vue



précédente



suivante



## Xanthogranulome juvénile

Lésion papulonodulaire, unique ou multiple, de couleur jaune, orange ou brune, de consistance molle, siégeant habituellement sur la face, le cuir chevelu, le tronc et la racine des membres. Elle survient le plus souvent chez le nouveau-né ou le nourrisson, mais peut aussi se voir chez l'enfant ou même à l'âge adulte.

lésions élémentaires:

Nodules



causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Papules dermiques; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Xanthomes tubéreux

Petites papules hémisphériques de quelques millimètres à 1 cm de diamètre, de couleur rose ou orangée, parfois très jaune à la vitropression. Les localisations préférentielles sont les coudes, les genoux et les fesses. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Papules dermiques; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Xanthélasma

Plaques jaunâtres ou orangées, aplatises et bien limitées, situées autour de l'oeil. Il s'agit d'une des variétés de xanthomes plans.

lésions élémentaires:

Papules dermiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Lipomes

Tumeurs bénignes de la couleur de la peau normale, uniques ou multiples, développées à partir de tissu adipeux sous-cutané. Leur consistance est molle. Elles peuvent atteindre une taille importante.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Leiomyomes

Tumeurs bénignes qui dérivent des muscles lisses rattachés aux follicules pileux, aux organes génitaux, aux mamelons, aux vaisseaux sanguins.

Les leiomyomes sont des formations nodulaires uniques ou multiples, contractiles, de coloration rouge, rosée ou brunâtre.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse;  
Macules pigmentées; Papules  
dermiques  
Non spécifiques

causes:



recherche



contenu



imprimer

## Mastocytoses cutanées

Sous le terme de mastocytoses, on regroupe toutes les lésions consécutives à la prolifération de mastocytes dans la peau.

### *Urticaire pigmentaire*

C'est la forme la plus fréquente, observée à tout âge. Elle réalise une éruption assez monomorphe de macules ou maculopapules prurigineuses, lisses, de coloration rouge violacé ou brune. La réactivité des lésions par certains stimulus comme le frottement est très caractéristique (signe de Darier). ►



dernière page vue



précédente suivante



## Mastocytoses cutanées

*continuation*

### *Mastocytome*

Lésion tumorale unique, de consistance ferme, de couleur orangée, n'existant que chez l'enfant.

lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

causes:

Macule érythémateuse;  
Macules pigmentées; Papules  
dermiques  
Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Neurocristopathies

### *Neurofibromes*

Nodules de couleur d'une peau normale ou rosée, qui peuvent être plus ou moins fermes.  
Leur caractéristique essentielle est d'être facilement dépressible.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Neurocristopathies

continuation

*Neurofibromatose de Von Recklinghausen*

Il s'agit de la forme la plus fréquente des neurocristopathies systématisées. Elle est caractérisée essentiellement par l'association de taches café au lait, de taches lenticulaires et de neurofibromes cutanés, de taille variée.



dernière page vue

précédente

suivante





lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Neurocristopathies

continuation

*Neurofibromatose de Von Recklinghausen*

La "tumeur royale" est un neurofibrome de très grande taille, par rapport à tous ceux qui l'entourent. Cette affection héréditaire se transmet sur le mode autosomique dominant avec une forte pénétrance et une expressivité variable. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



causes:

Non spécifiques

## Neurocristopathies

*continuation*

*Sclérose tubéreuse de Bourneville (épiloia)*

L'épiloia est une affection à transmission autosomique dominante, caractérisée par diverses manifestations cliniques isolées ou associées.

### a. Angiofibromes

Petits nodules saillants, roses ou rouges, de consistance ferme, recouverts de fines télangiectasies. Ils sont symétriquement distribués au visage : sillons nasogéniens, joues, région péri-orale.





## Neurocristopathies

### b. Tumeurs de Koënen

continuation

Angiofibromes cornés très particuliers des orteils.



lésions élémentaires:

Verrucosités

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires causes

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Neurocristopathies

*continuation*

### c. Plaque peau de chagrin

Plaque de contours et de surface irréguliers, en relief, recouverte d'une "peau d'orange" assez pâle. Son siège électif est lombo-sacré.

### d. Taches achromiques

Macules de 1 à 10 centimètres de diamètre, plus ou moins régulières, ovalaires, arrondies ou de manière plus caractéristique en forme de feuille de sorbier. Elles sont blanches, sans halo hyperémique ou pigmenté.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macule vasculaire



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente




suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule vasculaire



causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule vasculaire



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Angiomes

continuation

### *Angiome plan*

Macule érythémateuse, congénitale, d'intensité, d'étendue et de forme variables. La couleur varie du rose pâle au rouge foncé (tache saumonée). Il siège avec préférence à la face et aux membres. Il peut déborder sur les muqueuses. A partir de la 4ème décennie, l'angiome s'épaissit et des nodules violacés superficiels peuvent apparaître. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule vasculaire; Nodules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

## Angiomes

*continuation*

### *Angiome tubéreux*

Angiome rouge vif du nourrisson, à bords nets, en relief, saillant sur le tégument normal avoisinant. Sa croissance est rapide. Il peu saigner ou s'ulcérer. La plupart de ces angiomes disparaissent spontanément dans l'enfance, sans laisser de traces. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macule vasculaire; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Angiomes

*continuation*

### *Angiome sous-cutané*

Tuméfaction saillante sous une peau soit normale, soit bleutée ou télangiectasique. Cette lésion ne subit pas d'involution spontanée.



dernière page vue

précédente

suivante





lésions élémentaires:

Papules dermiques; Kératoses

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique

## Angiomes

continuation

### Angiokératome

Télangiectasie papuleuse dont la surface est hyperkératosique. Les angiokératomes du scrotum et de la vulve sont les plus fréquents. Ils sont le plus souvent bénins. Néanmoins, s'ils sont disséminés sur la région du siège, ils doivent faire rechercher une maladie de Fabry. ►

alphabétique



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Angiomes

continuation

### Tumeur glomique

Petite tumeur bleutée intradermique, remarquable par son caractère douloureux. Elle siège surtout en périphérie, aux mains et aux pieds, plus rarement aux avant-bras ou aux fesses. Une localisation fréquente et caractéristique est la région sous-unguiale. ►



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

## Angiomes

*Tumeur glomique*



continuation



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques

## Angiomes

*continuation*

*Botriomycome (granulome pyogénique)*


Bourgeon charnu, vasculaire, secondaire à un traumatisme minime ou passé inaperçu. Sa surface érodée saigne facilement. Le botriomycome peut être étranglé à sa base par un sillon caractéristique qui le sépare de la peau avoisinante. ►



dernière page vue



précédente suivante



B

A

## Angiomes

*continuation*

### Tache rubis (angiomes séniles)

Petites taches rouge vif, planes ou discrètement saillantes.

Extrêmement banales chez le sujet âgé, elles sont habituellement multiples et siègent sur le tronc (A). Elles coexistent dans de nombreux cas avec des verrues séborrhéiques (B).

lésions élémentaires:

Macule vasculaire; Verrucosités;  
Kératoses

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Vésicules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Nodule douloureux de l'oreille

Nodule inflammatoire de l'hélix, douloureux spontanément ou à la pression, dont le centre est kératosique ou cratéiforme. On le considère aujourd'hui comme une chondrodermatite dont l'étiopathogénie n'est pas élucidée.

lésions élémentaires:

Nodules; Kératoses



recherche



contenu



imprimer

causes:

Facteurs mécaniques



dernière page vue



précédente




suivante

causes

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

## Pseudo-kyste mucoïde

Petit nodule translucide, ferme, de couleur chair siégeant sur le dos des doigts, près des articulations interphalangiennes distales.

Il est souvent responsable d'une déformation caractéristique de l'ongle qui présente des cannelures longitudinales. Il résulte de l'accumulation d'une substance mucoïde dans le derme.

alphabétique

## 13.5 Naevus mélanocytaires



lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

### Lentigos simples (lentigines)

Macules hyperpigmentées, de petite taille (1 à 3 mm), de teinte brune ou noire, pouvant se répartir sur toute la surface du tégument et/ou sur les muqueuses.

Les lentigines sont souvent isolées. Parfois, elles sont généralisées (lentiginose) et s'intègrent dans des syndromes complexes, à expression multiviscérale. Elles correspondent à une hypermélanocytose épidermique.



dernière page vue



précédente suivante



lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Taches mongoliennes

Macules gris bleuté, dont la taille varie de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Elles surviennent le plus souvent sur les lombes et les fesses. Elles sont particulièrement fréquentes chez les sujets à peau jaune.

Ces taches correspondent à une hypermélanocytose dermique.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:



recherche

contenu

imprimer

Macules pigmentées;  
Papules dermo-épidermiques

causes:

Non spécifiques

## Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires)

Les naevus mélanocytaires sont des lésions bien circonscrites, manifestant une grande variété de couleur, de forme, d'épaisseur, de consistance et de taille qui va de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre. ▶



dernière page vue

précédente suivante

image

lésions élémentaires

causes

alphabétique



## Naevus mélanocytaires (naevus naevocellulaires)

*continuation*

Ils peuvent être plans ou en relief, lenticulaires ou discoïdes, d'une teinte variant du jaune clair au brun noir. Les formes en dôme peuvent ne pas être pigmentées.



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires:

causes:

Macules pigmentées;  
Papules dermo-épidermiques;  
Nodules  
Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



## Naevus mélanocytaires pileux

Certains naevus mélanocytaires se couvrent de poils lors de la puberté.

lésions élémentaires:



recherche

contenu

imprimer

causes:

Macules pigmentées;  
Papules dermo-épidermiques;  
Nodules  
Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

Macules pigmentées;  
Papules dermo-épidermiques;

Nodules

causes: Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## Naevus pigmentaire congénital

Les naevus pigmentaires congénitaux sont de taille variée. Certains, en raison de leur large extension, sont appelés "géants". De surface non homogène (plane, papuleuse, nodulaire, verruqueuse), ils sont le plus souvent de coloration variée allant du brun clair au noir. Ils sont fréquemment couverts de poils épais.



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Naevus juvénile de Spitz

Tumeur papulonodulaire, isolée, localisée fréquemment au visage et aux membres, de teinte rosâtre.

Il s'agit d'un naevus mélanocyttaire dont l'aspect histopathologique est très caractéristique.

Assez exceptionnellement, les naevus de Spitz peuvent être multiples.



dernière page vue



précédente



suivante



## Naevus bleu

Petit nodule dont le diamètre est souvent inférieur au centimètre, de teinte gris bleu à bleu noir, localisé surtout à la face dorsale des mains et des pieds, parfois au visage. Sa couleur est liée à la localisation dermique, profonde des amas mélanocytaires.

lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules

causes:

Non spécifiques





## Naevus de Sutton (halo-naevus)

Le naevus de Sutton est un naevus mélanocytaire entouré d'une couronne dépigmentée. Au cours de son évolution naturelle, la composante naevique disparaît progressivement et le halo blanc se repigmente peu à peu. Ce phénomène évolutif est vraisemblablement auto-immun.



lésions élémentaires:

Macules pigmentées;  
Macules achromiques

causes:

Non spécifiques





## Naevus de Sutton (halo-naevus)

*continuation*

lésions élémentaires:

Macules pigmentées;  
Macules achromiques

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante



suivante

Chapitre 14:

# Tumeurs cutanées précancéreuses



lésions élémentaires:



recherche



contenu



imprimer

Kératoses; Squames

causes:

Soleil, Ultraviolets

## Kératoses actiniques

Plaques en relief, rouges et bien limitées, dont la surface rugueuse est recouverte de squames plus ou moins épaisses. Les lésions sont isolées ou multiples; elles se localisent électivement sur les régions exposées comme le dos des mains, ou le visage. ►

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires




dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Kératoses; Squames



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Kératoses actiniques continuation

A remarquer ici quelques caractères de photo-vieillissement cutané (ou héliodermie: peau citréine, rides accentuées). Non traitées, un certain nombre de kératoses actiniques évoluent en carcinome spinocellulaire.




dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:



recherche

contenu

imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

Macule érythémateuse; Squames;  
Croûtes

dernière page vue

précédente

suivante



lésions élémentaires:

Macules achromiques; Verrucosités



causes:

Agents chimiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Croûtes

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

image

causes

lésions élémentaires

alphabétique



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Croûtes

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macule érythémateuse



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques

## Érythroplasie de Queyrat (carcinome intra-épithélial du gland)

Localisation muqueuse de la maladie de Bowen. Plaque rouge, bien limitée, discrètement saillante, à surface vernissée du gland. Des lésions similaires s'observent sur la muqueuse vulvaire.



dernière page vue



précédente



suivante



## Papulose Bowenoïde

Papules érythémateuses ou brunâtres, atteignant le gland, le fourreau, la vulve et parfois la région péri-anale. Leur image histopathologique est voisine de celle de la maladie de Bowen. Des virus HPV(16,18,33) sont la cause initiatrice de cette papulose.

lésions élémentaires:

Papules épidermiques

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Ulcérations; Atrophie; Cicatrice

causes:

Rayons X



recherche



contenu



imprimer

## Radiodermite

Atrophie cicatricielle, télangiectasies, anomalies de la pigmentation constituent l'image classique de la radiodermite. A un stade ultérieur peuvent apparaître des ulcérations. Après plusieurs années, des carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires sont susceptibles de se développer.



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules;  
Kératoses; Atrophie

causes:

Soleil, Ultraviolets





lésions élémentaires:

Macules pigmentées



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante

Chapitre 15:

# Tumeurs cutanées malignes

# 15.1 Carcinomes basocellulaires



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires

## Carcinome basocellulaire nodulaire

Tumeur globuleuse, de teinte cireuse ou rougeâtre, plus ou moins translucide (carcinome "perlé") dont la surface lisse est parcourue par de fines télangiectasies. La localisation la plus fréquente est le visage, mais d'autres régions peuvent être concernées : dos, membres, région génitale. Le carcinome basocellulaire nodulaire augmente de taille progressivement et peut s'ulcérer.



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Nodules; Ulcération



causes:

Soleil, Ultraviolets





### Carcinome basocellulaire plan cicatriciel ("sclérodermiforme")

Cette variété de carcinome revêt davantage l'aspect d'une plaque que d'un nodule. Toute la partie centrale de la lésion est blanche, atrophique, scléreuse, morphéiforme, mais à la différence de la morphée, parcourue de télangiectasies. En bordure de la lésion, on retrouve habituellement un bourrelet perlé, induré, télangiectasique et parfois recouvert de croûtelles.

lésions élémentaires: Nodules; Atrophie; Sclérose

causes: Soleil, Ultraviolets



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante



## Carcinome basocellulaire pagétoïde (carcinome basocellulaire superficiel)

Il se présente habituellement sous l'aspect d'une plaque rosée, nettement circonscrite par des contours arrondis. Ses bords sont marqués le plus souvent par un fin ourlet filiforme, perlé, qui le distingue de la maladie de Bowen. Son accroissement est très lent. Cette variété siège préférentiellement sur le tronc.

lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames

causes:

Non spécifiques



## 15.2 Carcinomes spinocellulaires



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

alphabétique

image

causes

lésions élémentaires



dernière page vue



précédente suivante



suivante



## Carcinome spinocellulaire du visage

Grand nodule ulcétré, saignant et croûteux. Le bourrelet périphérique est très induré. La base de toute la lésion est nettement infiltrée.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente suivante



suivante



lésions élémentaires:

Nodules; Squames; Croûtes;  
Ulcérations

recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets

lésions élémentaires

image

alphabétique

## Carcinome spinocellulaire de la lèvre inférieure

Cette ulcération sanieuse présente un bourrelet périphérique induré. Elle se développe dans le cas présent sur un fond de cheilite actinique.



dernière page vue



précédente



suivante



## Carcinome spinocellulaire de la verge

Tumeur végétante, dure et ulcérée du gland.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante

lésions élémentaires

image

alphabétique

## 15.3 Maladie de Paget



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Squames;  
Croûtes

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante

## 15.4 Métastases cutanées



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Nodules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## 15.5 Mélanome malin



lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires:

Macules pigmentées



causes:

Non spécifiques





## Mélanome nodulaire

Nodule infiltré de couleur brune ou noire, parfois rouge violacé, plus rarement achromique. La lésion, souvent en dôme, finit par s'ulcérer et saigner.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Soleil, Ultraviolets



dernière page vue



précédente



suivante



## Mélanome des extrémités (acral lentiginous melanoma)

Situé aux extrémités (paume des mains, plante des pieds, extrémités digitales), il s'apparente au mélanome à extension superficielle ou au mélanome nodulaire dont il ne représente qu'une localisation particulière. L'illustration est particulièrement évocatrice de cette double appartenance.

lésions élémentaires:

Macules pigmentées; Nodules

causes:

Non spécifiques





## Métastases de mélanome

Nombreux nodules noirs ou bleutés, indurés, développés à proximité d'un mélanome malin excisé antérieurement.

lésions élémentaires: Macules pigmentées; Nodules

causes: Non spécifiques



## 15.6 Fibrosarcome de Darier-Ferrand (dermatofibrosarcome protuberans)



Tumeur multinodulaire, bosselée, de grande taille, adhérant à la surface cutanée sans l'ulcérer, infiltrant le derme et l'hypoderme souvent au-delà des limites palpables. Cette tumeur se développe progressivement sans phénomènes douloureux. Elle touche les adultes des deux sexes avec une localisation préférentielle sur le tronc et les racines des membres. Ce fibrosarcome de Darier-Ferrand a une malignité locale, mais peut métastaser de manière exceptionnelle.

lésions élémentaires:

Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente suivante

lésions élémentaires

causes

image

alphabétique



## Angiosarcome de Kaposi

Nodules violacés des chevilles et des pieds chez un sujet âgé. Dans le cas présent, il ne survient pas dans le contexte d'un syndrome d'immunodéficience acquise.

lésions élémentaires:

Macule vasculaire; Nodules

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente suivante



suivante

## 15.7 Lymphomes malins - mycosis fongoïde



lésions élémentaires:

Macule érythémateuse; Nodules



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques



dernière page vue



précédente



suivante



## Lymphomes malins - mycosis fongoïde

*continuation*

Ultérieurement peuvent se développer des formations tumorales qui peuvent s'ulcérer.

lésions élémentaires:

Ulcérations

causes:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

## 15.8 Syndromes paranéoplasiques



lésions élémentaires:

Non spécifiques

causes:

Non spécifiques





lésions élémentaires: Verrucosités; Kératoses

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

lésions élémentaires

causes

alphabétique

## Acrokératose paranéoplasique de Bazex

Parmi les dermatoses paranéoplasiques, citons l'acanthosis nigricans malin, l'érythema gyratum repens de Gammel, l'acrokératose paranéoplasique de Bazex, l'hypertrichose lanugineuse. Ces deux dernières ont été choisies comme exemples illustratifs parmi bien d'autres.




dernière page vue



précédente



suivante



## Hypertrichose lanugineuse

On constate la survenue soudaine (en quelques semaines) d'un duvet de poils lanugineux, longs, blancs, soyeux, fins et extrêmement nombreux s'étendant sur toute la peau glabre (particulièrement sur la face). La vitesse de croissance est accélérée et la chevelure devient plus abondante. ►

lésions élémentaires:

Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer

causes:

Non spécifiques




dernière page vue



précédente



suivante



lésions élémentaires:

Non spécifiques



causes:

Non spécifiques

