



PACIENTE : ARRIOLA RIVERA ALEJANDRINA
EDAD : 81 años
ESTUDIO : MAMOGRAFÍA BILATERAL
FECHA : 22/08/2022

INFORME

Mamografía bilateral en proyecciones craneocaudal (CC) y oblicuo medio lateral (OML).
Sin mamografía previa para estudio comparativo.

Mama Derecha:

Patrón mamario fibroglandular heterogéneo, con moderado reemplazo graso.

A nivel de la cola de la mama y proyectada sobre la raíz de la región axilar, a aprox. 7 cm del pezón, se aprecia parcialmente en la proyección MLO, asimetría focal por imagen de aspecto nodular, de forma ovalada, de la cual se aprecia su aspecto anterior y un 60-70% de su circunferencia, por ello, de contorno parcialmente definido, con borde regular, no se aprecia signo del halo; de mediana/alta densidad de partes blandas, aparentemente homogénea, ligeramente hiperdensa con relación al tejido mamario apreciable en esta mama, de aprox. 15x12 mm hasta donde puede apreciarse y medirse. No impresiona alteración de la arquitectura del parénquima adyacente.

No se observa acúmulos de microcalcificaciones, imágenes espiculadas, ni retracciones del parénquima mamario.

Mama Izquierda:

Patrón mamario fibroglandular heterogéneo, con moderado reemplazo graso.

En cuadrantes internos, a nivel de su tercio medio, se aprecia asimetría focal, por imagen de aspecto nodular, de forma ovalada, de contorno parcialmente definido, de bordes no muy definidos y ausencia del "signo del halo"; de baja densidad de partes blandas, pero sin contenido adiposo e isodensa con el tejido mamario, de aprox. 20x15 mm. No impresiona alteración de la arquitectura del parénquima adyacente.

No se aprecia acúmulos de microcalcificaciones, imágenes espiculadas, ni retracciones del parénquima mamario.

Prolongaciones axilares: no se aprecia adenopatías.

Piel y pezones: revestimiento cutáneo de ambas mamas, fino y regular. Pezones centrales, sin apreciarse signos de retracción en el tejido mamario circundante.


CONCLUSIÓN:

IMAGEN DE ASPECTO NODULAR EN MAMA IZQUIERDA, SEGÚN DESCRIPCIÓN.

IMAGEN DE ASPECTO NODULAR PARCIALMENTE DEFINIDA, VISUALIZADA EN LA PROYECCIÓN MLO DE LA MAMA DERECHA, SEGÚN DESCRIPCIÓN.

HALLAZGOS SUGESTIVOS DE CORRESPONER A PROCESO NEOFORMATIVO. NO SE DESCARTA SECUNDARISMO. SE REQUIERE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

SE SUGIERE COMPLEMENTAR ESTUDIO CON ECOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMAS. CAT. BIRADS 4.



Dr. Antonio E. Vivanco Paredes
Medico Radiólogo
CMP 46611 RE 25158