

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : INFANZON ALVARADO CESAR
DNI : 06660421
FECHA : 15/07/2022

ESTUDIO: ECOGRAFIA DE PROSTATA

INDICACIÓN:

No aporta.

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz).

HALLAZGOS:

Vejiga adecuadamente replecionada, de paredes lisas, sin contenido ecogénico en su interior.

Volumen premiccional: 368cc

Volumen postmiccional: 27cc

% residual: 7%

Próstata de 38x40x40mm (AP x T x L). Volumen aproximado: 40cc

Aumentada de volumen, morfología conservada, de contornos lisos y parénquima heterogéneo. No se visualizan lesiones focales identificables por este método de imagen.

CONCLUSIONES:

1. HIPERTROFIA PROSTÁTICA GRADO II

MARIANA SALAZAR SALAZAR
Médico Radiólogo
CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES	: INFANZON ALVARADO CESAR
DNI	: 06660421
FECHA	: 15/07/2022

ESTUDIO: ECOGRAFIA RENAL

INDICACIÓN:

No aporta

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz). Se compara con URO TEM DEL 27/08/21 Y RMN de abdomen y pelvis de 13/11/21.

HALLAZGOS:

Riñón Derecho: de tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo. Adecuada diferenciación córtico medular. No se observan imágenes sugestivas de litiasis ni signos de uropatía obstructiva.

Medidas RD (L x AP): 100x53 mm

Parénquima:19 mm

Riñón Izquierdo: de mayor tamaño en comparación a contralateral y morfología normal, de contornos lisos y parénquima discretamente heterogéneo. Adecuada diferenciación córtico medular. No se observan imágenes sugestivas de litiasis. Adyacente a margen lateral se visualiza una colección hipoeoica, heterogénea, de márgenes lobulados bien definidos, de 153 x 97 mm. Se identifica discreta alteración de la ecoestructura del tejido adyacente en relación con cambios inflamatorios de la grasa perirrenal y en el estudio Doppler color no se identifica vascularización interna. Asimismo, se visualiza una moderada dilatación de la pelvis renal y uréter proximal.

Medidas RI (L x AP): 121x58mm

Parénquima:20 mm.

CONCLUSIONES:

1. COLECCIÓN HETEROGENEA PARARRENAL IZQUIERDA DE EAD, DE MAYOR TAMAÑO EN COMPRACIÓN A ESTUDIOS PREVIOS
2. MODERADA URETERO HIDRONEFROSIS IZQUIERDA.
3. SE RECOMIENDA COMPLETAR ESTUDIO CON URO TEM CON CIV Y DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO.

MARIANA SALAZAR SALAZAR
Médico Radiólogo
CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.