

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Институт математики и фундаментальной информатики
Кафедра высшей и прикладной математики

Блиб-блаб, дубадубадаб

Умнов У.У

Направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Научный руководитель

Хакатон Х. Х.

Красноярск

2026

«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.»

Преобразованием Фурье функции f называют оператор F :

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \text{ размер : 10pt}$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \text{ размер : 20pt}$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \text{ размер : 30pt}$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \text{ размер : 40pt}$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \text{ размер : 50pt}$$

Слайд с проверкой списков и перечислений

Что должно быть доступно в РФ?

- Хлеб,
- Молоко,
- Соль,
- Мясо...

Топ лучших исполнителей 2027

- 1) Erian
- 2) dj Arbutz
- 3) Ampersand

Теорема

Функция

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

счётна и почти всюду дифференцируема.

Тест shadow gradient

constant



Спасибо за внимание!