

ZELAN AUKERATU INTEGRALA EBAZTEKO METODORIK EGOKIENA

EZ hasi kalkulua egiten pentsatu barik. Aztertu integratu behar dan funtzioa. Hauek dira jarraitu daitezuzan pausuak.

1. Deskonposatu integrala, integral sinpleagoetan.

$$\left| \begin{aligned} \int [f(x) + g(x)] dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx \\ \int c \cdot f(x) dx &= c \int f(x) dx \end{aligned} \right|$$

2. Ahal bada **BERREKETA BAKARRA BIHURTU**, berreketa integratuz.

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x}} dx = \int x^{3-\frac{1}{2}} dx = \int x^{\frac{5}{2}} dx$$

3. **JATORRIA EZAGUTZEN BADA**, oinarritzko integrala da. Kasu hauetan berehala ikusten da integratu behar dan funtzioaren **jatorria** zein dan. Hauek dira [integralen taulan lehenengo zutabea](#)n agertzen direnak.

Berreketa: $\int x^n dx$

Exponentziala: $\int e^x dx$, $\int a^x dx$

Trigonometrikak: $\int \sin x dx$, $\int \cos x dx$...

Logaritmika: $\int 1/x dx$

4. Aztertu ea **BEREHALAKO INTEGRAL KONPOSATUA** izan daiteken. Horrela izateko, integratuko dana katearen erregelaren bitartez lortutako deribatua da. Beraz, funtzioaren bat bestearen deribatua izan behar da:

$\int f'(x) \cdot g(f(x)) dx$. Funtzioen biderketak agertzen dira. Hauek dira [integralen taulan bigarren zutabea](#)n agertzen direnak.

$\int k dx = kx + c$
$\int f(x)^n \cdot f'(x) dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1} + c$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c$
$\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + c$
$\int a^{f(x)} \cdot f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c$
$\int \sin(f(x)) \cdot f'(x) dx = -\cos f(x) + c$
$\int f'(x) \cdot \cos(f(x)) dx = \sin f(x) + c$
$\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} dx = \tan f(x) + c$
$\int \frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)} dx = -\cot f(x) + c$
$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}} dx = \arcsin f(x) + c = -\arccos f(x) + c$
$\int \frac{f'(x)}{1+f(x)^2} dx = \arctan f(x) + c$

5. **ORDEZKAPEN METODOA:** Integratzea erreza ez bada, ordezkapen metodoa erabili. **Aldagai aldaketa** erabili integrala errezteko. Egiten dan ordezkapenaren arabera integralaren kalkulua erreztu edo konplikatu daiteke. Orokorrean forma hauek izango dira:

INTEGRALEAN	ALDAGAI ALDAKETA ERAGINKORRENA
ERRO KARRATUA	$t=\sqrt{\text{Polinomioa}} \text{ edo } t=\text{Polinomioa}$
BESTE ERROAK	$t=\sqrt[m]{\text{Polinomioa}};$ $m=\text{errotzaileen mkt}$
FUNTZIO EXPONENTZIALA	$t=e^{nx}$ $n=\text{balio txikiena duena}$
FUNTZIO LOGARITMIKOAK	$t=\ln(x)$

6. **ZATIKAKO METODOA.** Metodo hau, **bi funtzioen arteko biderketaren integrala** kalkulatzeko erabiliko da, ez denean erabiltzen berehalako integralak. Metodo honetan funtzioak “desberdinak” dira. Formua bat erabiltzen: $\int u \, dv$ Integralarenen barruan, funtzio bat deribatzea erreza izango da eta bestea integratzea. **ALPES** hitzaren bitartzen funtzioen aukeraketa egingo da. Batzutan metodoa behin baino gehiagotan erabili beharko da.

Formula gogoratzeko esaldi hau erabil daiteke:

“Un Dia Vi, Una Vaca sin(-) rabo \int Vestida De Uniforme”

$$\int u \, dv = u \, v - \int v \, du$$

A: Arku funtzioak

L: Logaritmoak

P: Polinomioak

E: Esponentzialak

S: Sinua, kosinua, tangentea



7. **INTEGRAL ARRAZIONALAK** $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

$Deg P(x) \geq Deg Q(x)$ bada **ZATIKETA DESKONPOSATU ZATIKETA EGINEZ**

$$\frac{P(x)}{H(x)} \bigg| \frac{Q(x)}{Z(x)} \Rightarrow P(x) = Q(x) \cdot Z(x) + H(x) \Rightarrow \frac{P(x)}{Q(x)} = Z(x) + \frac{H(x)}{Q(x)} \Rightarrow$$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int Z(x) dx + \int \frac{H(x)}{Q(x)} dx$$

Deg P(x) < Deg Q(x)

LOGARITMO NEPERTARRA izateko zenbakitzailea, izendatzailearen deribatua da

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + k$$

$$\int \frac{x}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + k$$

ARKUTANGENTEA izateko, izendatzailea $1 + f(x)^2$ formakoa izan behar da

$$\int \frac{f'(x)}{1+f(x)^2} dx = \arctg f(x) + k$$

$$\int \frac{1}{5x^2+1} dx = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\sqrt{5}x}{(\sqrt{5}x)^2+1} dx = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctg(\sqrt{5}x) + k$$

BESTE KASUAK EBAZTEKO

Orokorrean, izendatzailea faktORIZATU egiten da : $Q(x) = 0$ eta izendatzailearen erroen arabera, zatiki aljebraiko sinpleagoetan deskonposatzen da, konstanteak kalkulatzeko dira eta integral sinpleak kalkulatzeko dira.

Erroen arabera deskonposaketa horrela izango da:

Erro **SINPLEA** $(x - a)$ zatikia $\frac{A}{x-a}$

Erro **BIKOITZA** $(x - a)^2$ zatikia $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$

Erro **HIRUKOITZA** $(x - a)^3$ zatikia $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} + \frac{C}{(x-a)^3}$

.....

Erro **KONPLEXUAK/IMAGINARIOA** $ax^2 + bx + c$ zatikia $\frac{Px+Q}{ax^2+bx+c}$

- Arkutangenteak
- Beste kasu batzuk ([ez dira aurten ikusiko](#))

ADIBIDE BAT: ERRO KONPOSATUAK (erro hirukoitza)

$$\int \frac{3x^2 - 5x + 1}{(x-2)^3} dx = \int \left[\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} \right] dx$$

$$\frac{3x^2 - 5x + 1}{(x-2)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} = \frac{A(x-2)^2 + B(x-2) + C}{(x-2)^3}$$

$$\text{Si } x = 2 \rightarrow \boxed{3 = C}$$

$$\text{Si } x = 0 \rightarrow 1 = 4A - 2B$$

$$\text{Si } x = 1 \rightarrow -1 = A - 3B$$

$$\text{Si resolvemos el sistema: } \boxed{A = \frac{1}{2}; B = \frac{1}{2}}$$

$$\int \left[\frac{1}{2(x-2)} + \frac{1}{2(x-2)^2} + \frac{3}{(x-2)^3} \right] dx = \frac{1}{2} \ln(x-2) - \frac{1}{2(x-2)} - \frac{3}{2(x-2)^2} + C$$