

### 1.3 CÁLCULO DE LÍMITES CUANDO $x \rightarrow +\infty$

#### COMPARACIÓN DE INFINITOS

Dadas dos potencias de  $x$ , la de mayor exponente es un infinito de orden superior:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^5}{2x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^5}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^{5/2}} = 0$$

Dadas dos funciones exponenciales de bases mayores que 1, la de mayor base es un infinito de orden superior:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{2^{x+1}} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^{x+9}}{8^{x+3}} = 0$$

Cualquier función exponencial de base mayor que 1 es un infinito de orden superior a cualquier potencia:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1,3^x}{300x^{50}} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{25}}{2^x} = 0$$

Tanto las funciones exponenciales de base mayor que 1 como las potencias de  $x$  son infinitos de orden superior a cualquier función logarítmica:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$$

Si en una suma hay varios sumandos infinitos, el orden de la suma es el del sumando de mayor orden:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (6x^3 + 2x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (6x^3) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^5 + 3^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^x = +\infty$$

**1** Teniendo en cuenta los resultados anteriores, calcula:

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt{x}}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{x^5}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\log x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x^4}{x^2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+1}}{\log x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 2x^2 - 3^x)$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 3x} - \sqrt{x + 2})$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x - \log_2 x)$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x + 1) - 2x^3)$

#### COCIENTE DE POLINOMIOS

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{ax^m + \dots}{bx^n + \dots}$$

• Si grado de  $P >$  grado de  $Q$  ( $m > n$ ), entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$  (el signo es el de  $\frac{a}{b}$ ).

• Si grado de  $P <$  grado de  $Q$  ( $m < n$ ), entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

• Si grado de  $P =$  grado de  $Q$  ( $m = n$ ), entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{a}{b}$ .

2 Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + 8x^2 + 2x}{3x^4 + 2x - 1}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-3)^3}{x^2 + 3x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)(2x-3)}{x^2 + 4x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-2x}{3x+4}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{5x-1}{6} \right)^2$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3}{(x-2)^2}$

### COCIENTE DE OTRAS EXPRESIONES INFINITAS

La regla utilizada para el cociente de polinomios es también válida cuando hay expresiones con radicales. Por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^5 + 2x}}{\sqrt[4]{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^5}}{\sqrt[4]{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{5/3}}{x^{1/4}} = +\infty \left( \text{pues } \frac{5}{3} > \frac{1}{4} \right)$$

3 Calcula estos límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5-3\sqrt{x}}{\sqrt{4x-1}}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3+2x}}{x+2}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x^2-2x}}{\sqrt{9x+2}}$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x^3+2x}}{\sqrt[5]{x^2-1}}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2}{\sqrt[3]{x^4-3x}}$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\frac{8x^2+3}{2x^2-x}}$

### DIFERENCIA DE EXPRESIONES INFINITAS

I. Si apreciamos que las expresiones cuya diferencia se nos propone son **infinitos de orden distinto**, podemos atribuir, directamente, límite  $+\infty$  o  $-\infty$  (ver página anterior).

II. Si podemos efectuar la operación, la hacemos y después calculamos el límite; por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x^2-1}{x+1} - \frac{6x-1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x-1}{2x+2} = \frac{-5}{2}$$

III. Si hay raíces cuadradas en el minuendo, en el sustraendo, o en ambos, multiplicamos y dividimos por el conjugado; por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2+1} - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{4x^2+1} - 2x)(\sqrt{4x^2+1} + 2x)}{\sqrt{4x^2+1} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{4x^2+1} + 2x} = 0$$

4 Halla el valor de estos límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^x - 3x^2)$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2}{x+1} - \frac{3x}{x-1} \right)$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+3}{2} - \frac{x^2-1}{x} \right)$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{x^2 - x})$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1})$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x} - \log_3 x)$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^{18})$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2 - 2x}{x-1} - \frac{2x}{3} \right)$

### LÍMITE DE UNA POTENCIA. NÚMERO $e$

- En muchos casos se puede calcular el límite de una potencia sin más que conocer los límites de la base y del exponente. Por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x}{2x-1} \right)^{x+1} = \left( \frac{3}{2} \right)^{(+\infty)} = +\infty$$

#### Indeterminación del tipo $(1)^{+\infty}$ :

Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 1] \cdot g(x)}$$

Por ejemplo:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x^2 - 2x}{3x^2 - 1} \right)^{2x-1} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{3x^2 - 2x}{3x^2 - 1} - 1 \right] \cdot (2x-1)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^2 + 4x - 1}{3x^2 - 1}} = e^{-4/3}$

5 Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{5x-2}{6x+1} \right)^{4x+3}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x}{x+1} \right)^{3x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{4x-2}{3x^2} \right)^x$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+2}{x-3} \right)^{\frac{2x+1}{3}}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x^2+1}{x+1} \right)^{-x^2}$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{2-x}$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+4}{3+2x} \right)^{\frac{x+1}{2}}$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-5}{3+x} \right)^{\frac{x+1}{2x+3}}$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-5}{3+x} \right)^{\frac{x+1}{2}}$

## 1.4 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN CUANDO $x \rightarrow -\infty$

### DEFINICIONES

Cuando  $x \rightarrow -\infty$ , podemos encontrarnos uno de estos casos:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \Leftrightarrow$  Podemos conseguir que  $f(x)$  esté tan próximo a  $l$  como queramos, sin más que darle a  $x$  valores suficientemente "grandes y negativos".



- $\Leftrightarrow$  Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $h$  (suficientemente grande) tal que: si  $x < -h$ , entonces  $|f(x) - l| < \varepsilon$ .


- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  no existe.



Las definiciones de  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  y de  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  son como las de  $x \rightarrow +\infty$ , pero poniendo  $x < -h$  donde allí se ponía  $x > h$  (ver página 4).

### CÁLCULO

Para calcular límites cuando  $x \rightarrow -\infty$ , tendremos en cuenta que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$$

### EJERCICIO RESUELTO

Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{5x^2 + 2x - 3}$     b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^5 - 3}}{x^2 + 1}$     c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^4 - 2} + x)$     d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$

### RESOLUCIÓN

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{5x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{5} = -\infty$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^5 - 3}}{x^2 + 1}$  no existe, pues el radicando,  $2x^5 - 3$ , toma valores negativos cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^4 - 2} + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 2} - x) = +\infty$ , pues  $\sqrt{x^4 - 2}$  es un infinito de orden superior que  $x$ .

d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right]^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$

1 Aplica la definición para cada una de las siguientes expresiones y representa cada resultado:

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 1) = +\infty$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2} = 2$

c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x - 2) = -\infty$

2 Halla el valor de cada uno de los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1 \right)$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 2x + \frac{1}{4} \right)^5$

c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 6x + 2}{3x^3 - 2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-2)^3}{x^2 + 4x - 2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+1)(x-3)}{x^2 + 4}$

f)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-x}{2x+3}$

g)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{3x^2 + 2}{1 - x^2} \right)^2$

h)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{(x+1)^2}$

i)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2}}{2x + 1}$

j)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x+4}}{x+2}$

k)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{3x+4}{x+2}}$

l)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{3x+4}}{x+2}$

m)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{x^6 + 1} - 2x}{1 - \sqrt[3]{x^2}}$

n)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1}$

ñ)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3^x - x^2)$

o)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\log(-x)}{3^{-x}}$

p)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(x^2) + x^3)$

q)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^6 + 3} + x^2)$

r)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{1-x} - \sqrt{2-x})$

s)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{x} + \frac{x^2 - 3}{2x + 1} \right)$

t)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2x+1}{2} - \frac{x^2-1}{x} \right)$

u)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{x^2 - x})$

v)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x^2 - 2x}{x+1} - \frac{2x}{3} \right)$

w)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{4+2x}{3x+1} \right)^{x^2+1}$

x)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x-1}{2+x} \right)^{\frac{x+1}{2}}$


y)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x^2-1}{2+x^2} \right)^{\frac{x+1}{2x}}$

z)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{2x+3}{1+x} \right)^{x+1}$




## 1.5 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. DEFINICIONES


- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow$  Dado un número  $k$ , podemos encontrar otro número  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c - \delta < x < c$ , entonces  $f(x) > k$




- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow$  Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c < x < c + \delta$ , entonces  $f(x) > k$




- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty \Leftrightarrow$  Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c - \delta < x < c$ , entonces  $f(x) < -k$




- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty \Leftrightarrow$  Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c < x < c + \delta$ , entonces  $f(x) < -k$




- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l \Leftrightarrow$  Dado  $\varepsilon > 0$ , podemos encontrar un  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c - \delta < x < c$ , entonces  $|f(x) - l| < \varepsilon$



- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l \Leftrightarrow$  Dado  $\varepsilon > 0$ , encontramos  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $c < x < c + \delta$ , entonces  $|f(x) - l| < \varepsilon$



- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \Leftrightarrow$  Dado  $\varepsilon > 0$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que:  
Si  $x \neq c$  y  $c - \delta < x < c + \delta$ , entonces  $|f(x) - l| < \varepsilon$



$\Leftrightarrow$  Existen los límites laterales y coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

1 Aplica la definición para cada expresión y representa cada resultado:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{x-1} = -\infty$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{x-1} = +\infty$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{1-x} = +\infty$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{1-x} = -\infty$

e)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (3x-1) = 2$

f)  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 1) = 10$

## 1.6 CÁLCULO DE LÍMITES CUANDO $x \rightarrow c$

### EJERCICIO RESUELTO

Dada la función  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} & \text{si } x \leq 3 \\ x^2 - 8 & \text{si } 3 < x \leq 4 \\ 2^x & \text{si } x > 4 \end{cases}$ , halla los límites de  $f(x)$  en 0, 3, 4 y 5.

#### RESOLUCIÓN

**En  $x = 0$ :** El dominio de  $f(x)$  es  $[2, +\infty)$ . Por tanto, no existe  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

**En  $x = 3$ :** Hallamos los límites laterales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} (\sqrt{x-2}) = \sqrt{3-2} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 8) = 9 - 8 = 1 \end{aligned} \right\} \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$$

**En  $x = 4$ :** Hallamos los límites laterales:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} (x^2 - 8) = 8 \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} 2^x = 16 \end{aligned} \right\} \text{No existe } \lim_{x \rightarrow 4} f(x)$$

**En  $x = 5$ :**  $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} 2^x = 32$

**1** Halla los siguientes límites en los casos en los que sea posible:

a)  $\lim_{x \rightarrow -2} \left( x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4} \right)$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{3x + 1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1/2} \sqrt{4x + 2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{1-x}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x)$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{e^x}$

**2** Halla los límites de  $f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \leq -1 \\ x + 3 & \text{si } -1 < x < 0 \\ \frac{3}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$  en  $x = -1$ ,  $x = 0$  y  $x = 1$ .

**3** Halla el valor de  $a$  para que exista  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ , siendo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{x} & \text{si } x > -3 \\ x^2 + a & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

## EJERCICIO RESUELTO

Halla los siguientes límites:

$$a) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3}{x - 1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x^2 - x - 2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x^3 - 2x + 1}}{\sqrt{x - 1}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2}{x - 1} - \frac{x - 3}{x^2 - 3x + 2} \right)$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x + 2}{3} \right)^{\frac{1}{x - 1}}$$

### RESOLUCIÓN

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3}{x - 1} = \left( \frac{-2}{0} \right) = (\pm\infty)$ . Hallamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3}{x - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3}{x - 1} = -\infty$$

b)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x^2 - x - 2} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x + 2)(x - 2)}{(x - 2)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x + 2)}{x + 1} = \frac{8}{3}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x^3 - 2x + 1}}{\sqrt{x - 1}} = \left( \frac{0}{0} \right) \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[4]{\frac{x(x - 1)^2}{(x - 1)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[4]{x} = 1$

(\*) Hemos reducido a índice común las raíces.

d) Como es indeterminado,  $(\pm\infty) - (\pm\infty)$ , efectuamos la operación:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2}{x - 1} - \frac{x - 3}{(x - 1)(x - 2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 2} = -1$$

e) Es una indeterminación del tipo  $(1)^{(\pm\infty)}$ . Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x + 2}{3} \right)^{\frac{1}{x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x + 2}{3} - 1 \right) \cdot \frac{1}{x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{3} \cdot \frac{1}{x - 1}} = e^{1/3}$$

4

Calcula los siguientes límites:

$$a) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + x - 12}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + x - 12}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + x - 12}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x}}{\sqrt[3]{x^2 + x - 2}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x^2 - 2}{x^2} - \frac{1}{x} \right)$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^2 - 2}{x^2} - \frac{1}{x} \right)$$

$$g) = \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x + 4}{3x - 2} \right)^{x - 2}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x + 2}{4} \right)^{\frac{1}{x - 2}}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^2 + 1}{3x - 1} \right)^{\frac{x + 1}{x - 1}}$$

$$j) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5 - x} - 2}{x - 1}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x^2}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{\sqrt{x - 1} - 1}$$

En j), k) y l) utiliza el conjugado.




## 1.7 CONTINUIDAD

- Una función  $f(x)$  es continua en  $x = a$  cuando  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .


### Tipos de discontinuidad en un punto

#### ① Discontinuidad evitable



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$


Existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , pero no existe  $f(a)$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , existe  $f(a)$ , pero  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ .


#### ② Discontinuidad de salto finito




Existen los límites laterales, pero no coinciden:

$$l_1 = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l_2$$

#### ③ Discontinuidad infinita (asíntota vertical en $x = a$ )



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$





Algunos de los límites laterales (o los dos) son infinitos:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \text{ y/o } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

#### ④ No existe ninguno de los límites laterales



- 1 Estudia la continuidad de estas funciones. En los puntos en los que no sean continuas, indica el tipo de discontinuidad:



## EJERCICIO RESUELTO

Estudia la continuidad de cada una de estas funciones:

$$a) f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 + x - 2} = \frac{x(x-1)}{(x+2)(x-1)}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 2^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ |x| & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

### RESOLUCIÓN

a) Dominio =  $\mathbb{R} - \{-2, 1\}$ ;  $f(x)$  es continua en su dominio.

Veamos los tipos de discontinuidades:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \pm\infty$$

Discontinuidad infinita en  $x = -2$  (asíntota vertical en  $x = -2$ ).

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+2} = \frac{1}{3}$$

Discontinuidad evitable en  $x = 1$ .

b) • Si  $x \neq 0$ ,  $f(x)$  es continua, pues está formada por funciones continuas.

• En  $x = 0$ :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2^x - 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 0 \\ f(0) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \\ f(x) \text{ es continua en } x = 0 \end{array}$$

Por tanto,  $f(x)$  es una función continua.

2

Estudia la continuidad de estas funciones. En los puntos en los que no sean continuas, estudia el tipo de discontinuidad

$$a) f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 1}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ |x| & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 8x}{x + 4} & \text{si } x \neq -4 \\ 5 & \text{si } x = -4 \end{cases}$$

### EJERCICIO RESUELTO

Estudia la continuidad de esta función según los valores de  $a$ :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x < 2 \\ 2x + a & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

#### RESOLUCIÓN

- Si  $x \neq 0$  y  $x \neq 2 \rightarrow f(x)$  es continua, pues está formada por funciones continuas.
- En  $x = 0$ :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - 3x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \\ f(0) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \\ f(x) \text{ es continua en } x = 0 \end{array}$$

- En  $x = 2$ :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + a) = 4 + a \\ f(2) = 4 + a \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Para que } f(x) \text{ sea continua en } x = 2, \text{ ha de ser:} \\ 2 = 4 + a \rightarrow a = -2 \end{array}$$

- Por tanto, si  $a = -2$ ,  $f(x)$  es continua; y si  $a \neq -2$ ,  $f(x)$  tiene una discontinuidad de salto finito en  $x = 2$ .

- 3 Halla el valor de  $a$  y/o  $b$  para que las siguientes funciones sean continuas:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x^2 - b & \text{si } x \leq -1 \\ x + a & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ e^{ax} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x^2 - ax & \text{si } x \leq 1 \\ 2\sqrt{x} + a & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

## 1.8 TEOREMA DE BOLZANO

### TEOREMA DE BOLZANO

Si  $f(x)$  es continua en  $[a, b]$  y "signo de  $f(a) \neq$  signo de  $f(b)$ ", entonces existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .

### EJERCICIO RESUELTO

**Encuentra un intervalo de amplitud menor que 2 en el que la ecuación  $x^3 - 3x + 5 = 0$  tenga una raíz. Aproxima el valor de dicha raíz hasta las décimas.**

#### RESOLUCIÓN

Tomamos la función  $f(x) = x^3 - 3x + 5$ , que es continua por ser polinómica.

Tanteando, encontramos que  $f(-3) = -13$ ,  $f(-2) = 3$ .

Así,  $f(x)$  es continua en  $[-3, -2]$  y signo de  $f(-3) \neq$  signo de  $f(-2)$ .

Por tanto, aplicando el teorema de Bolzano, sabemos que existe  $c \in (-3, -2)$  tal que  $f(c) = 0$ . La raíz de la ecuación es  $c$ .

Probando con valores decimales, obtenemos  $f(-2,3) = -0,267$ ;  $f(-2,2) = 0,952$ .

Por tanto, podemos asegurar que  $-2,3$  se aproxima en menos de una décima a la raíz que buscamos.


- 1 a) Demuestra que la función  $f(x) = -x^5 - 3x^2 + 5$  corta al eje  $OX$  en el intervalo  $(0, 2)$ .  
b) Aproxima hasta las décimas una raíz de la ecuación  $-x^5 - 3x^2 + 5 = 0$ .

- 2 Encuentra un intervalo en el que la ecuación  $\cos x + x - 2 = 0$  tenga una raíz.

- 3 La función  $f(x) = \frac{1}{x}$  toma valores de distinto signo en los extremos del intervalo  $[-1, 1]$  y, sin embargo, no se anula en él. ¿Contradice esto el teorema de Bolzano?

## 1.9 EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN (LÍMITES Y CONTINUIDAD)

1 La siguiente gráfica corresponde a la función  $f(x)$ :



a) Estudia su continuidad. En los puntos en los que no sea continua, indica el tipo de discontinuidad.

b) Halla los siguientes límites:

$\lim_{x \rightarrow -} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2 Sabemos que:  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 1$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3} u(x) = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3} v(x) = \frac{1}{2}$

Di en cuáles de los siguientes casos hay indeterminaciones; y, si no, di cuál es el límite:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) + g(x)]$	b) $\lim_{x \rightarrow 3} [u(x)]^{h(x)}$	c) $\lim_{x \rightarrow 3} [v(x)]^{f(x)}$
d) $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x)]^{u(x)}$	e) $\lim_{x \rightarrow 3} [h(x)]^{g(x)}$	f) $\lim_{x \rightarrow 3} [g(x) \cdot u(x)]$

3 a) Dada la función  $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$ , halla los siguientes límites y representa los resultados:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x);$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x);$	$\lim_{x \rightarrow -3} f(x);$	$\lim_{x \rightarrow 3} f(x);$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

4 Halla los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3 + 2x}{5x + 1} \right)^{x^2 - 1}$	b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x^2 + 1}{x - 1} - \frac{4x + 1}{2} \right)$	c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{3x - 6}}{x + 1}$
d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+2}}{x^6 + 2x^2}$	e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^4 + x} - x^2)$	f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 + 4x - 5}$
g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - \log x)$	h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x + 2})$	i) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$



5 Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x+2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} \right)$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[5]{x^2+3x}}{1+2\sqrt{x}}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 3} \left( \frac{3x+1}{x-1} \right)^{x-3}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+7}-3}{2x-2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+2x} - \sqrt{x^2+x})$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3+2x}{x^4+3}$

g)  $\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{3x-1}{5} \right)^{\frac{1}{x-2}}$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x+1}{3+2x} \right)^{x+2}$

i)  $\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x^2-4}{x^2-4x+4} \right)^2$

6 Estudia la continuidad de estas funciones:

a)  $f(x) = \begin{cases} \frac{5x}{4-x} & \text{si } x \leq -1 \\ 2^{-x}-3 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ 3x^2+2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x^2+x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

7 a) Halla el valor de  $m$  y  $n$  para que la siguiente función sea continua en  $\mathbb{R}$ :

$$f(x) = \begin{cases} -2x-m & \text{si } x \leq 0 \\ x^2-1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ nx-5 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

b) Representa gráficamente la función anterior para los valores de  $m$  y  $n$  que hayas obtenido en el apartado a).

8 La función  $f(x) = \begin{cases} |x-5| & \text{si } x \leq 2 \\ 1-2^x & \text{si } x > 2 \end{cases}$  está definida en el intervalo  $[1, 3]$  y cumple que "signo de  $f(1) \neq$  signo de  $f(3)$ ", pero no existe ningún  $c \in (1, 3)$  tal que  $f(c) = 0$ . ¿Contradice esto el teorema de Bolzano? Justifica la respuesta.




# SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

## Página 3

- 1 a) Indeterminado b)  $+\infty$   
 c)  $+\infty$  d)  $-\infty$   
 e) Indeterminado f)  $\pm\infty$   
 g) 0 h)  $+\infty$   
 i) 0 j) Indeterminado  
 k) Indeterminado l) Indeterminado

- 2 a)  $+\infty$  b) 2 c)  $+\infty$  d)  $+\infty$   
 e) 3 f)  $+\infty$  g)  $\sqrt{2}$  h)  $+\infty$   
 i)  $-\infty$  j) no existe k) 1 l)  $e$

## Página 4

- 1 a)  b)  c) 

- 2 a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$  b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty$

## Página 5

- 3 a) Indeterminado b)  $+\infty$   
 c)  $+\infty$  d)  $+\infty$   
 e) Indeterminado f)  $-\infty$   
 g) 0 h) 0  
 i)  $\pm\infty$  j) Indeterminado  
 k) 0 l)  $-\infty$   
 m)  $+\infty$  n)  $+\infty$   
 ñ) 0 o) 1  
 p) Indeterminado q) Indeterminado

## Página 6

- 1 a)  $+\infty$  b)  $+\infty$  c)  $+\infty$  d) 0 e)  $+\infty$   
 f)  $-\infty$  g)  $+\infty$  h)  $+\infty$  i)  $-\infty$

## Página 7

- 2 a) 0 b)  $+\infty$  c) 2 d)  $\frac{-2}{3}$  e)  $+\infty$  f)  $-\infty$   
 3 a)  $\frac{-3}{2}$  b) 2 c)  $\frac{1}{3}$  d)  $+\infty$  e) 0 f)  $\sqrt[3]{4}$

## Página 8

- 4 a)  $+\infty$  b)  $+\infty$  c)  $\frac{5}{2}$  d)  $+\infty$  e) 0  
 f)  $+\infty$  g)  $\frac{1}{2}$  h)  $+\infty$  i)  $+\infty$   
 5 a) 0 b)  $+\infty$  c)  $e^{4/3}$  d)  $e^{10/3}$  e) 0  
 f) 0 g)  $e^{1/4}$  h) 1 i)  $e^{-4}$

## Página 10

- 1 a) Dado un  $n^\circ k$ , podemos encontrar otro  $n^\circ h$  tal que si  $x < -h$ , entonces  $x^2 - 1 > k$ .  
 b) Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $h$  tal que, si  $x < -h$ , entonces  $\left| \frac{2x^2 + 1}{x^2} - 2 \right| < \varepsilon$ .  
 c) Dado un  $n^\circ k$ , podemos encontrar otro  $n^\circ h$  tal que si  $x < -h$ , entonces  $3x - 2 < -k$ .

- 2 a)  $-\infty$  b)  $-\infty$  c) 0 d)  $-\infty$   
 e) 1 f)  $\frac{-1}{2}$  g) 9 h) -1  
 i)  $\frac{-1}{2}$  j) 0 k)  $\sqrt{3}$  l) 0  
 m)  $+\infty$  n) 0 ñ)  $-\infty$  o) 0  
 p)  $-\infty$  q)  $+\infty$  r) 0 s)  $-\infty$   
 t)  $\frac{1}{2}$  u)  $-\infty$  v)  $-\infty$  w) 0  
 x)  $e^{-3/2}$  y) 1 z) 0

## Página 11

- 1 a) Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que, si  $1 - \delta < x < 1$ , entonces  $\frac{3}{x-1} < -k$ .

b) Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que, si  $1 < x < 1 + \delta$ , entonces  $\frac{3}{x-1} > k$ .

c) Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que, si  $1 - \delta < x < 1$ , entonces  $\frac{3}{1-x} > k$ .

d) Dado  $k$ , podemos encontrar  $\delta > 0$  tal que, si  $1 < x < 1 + \delta$ , entonces  $\frac{3}{1-x} < -k$ .

e) Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que, si  $1 - \delta < x < 1$  entonces  $|(3x-1)-2| < \varepsilon$ .

f) Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que, si  $x \neq 3$  y  $3 - \delta < x < 3 + \delta$ , entonces  $|(x^2+1)-10| < \varepsilon$ .

## Página 12

1 a)  $\frac{29}{4}$  b) 0 c) 2 d) No existe e) 2 f) 0

2 
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2 \end{array} \right\} \text{No existe } \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3 \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{x+1} = \frac{3}{2}$$

3 a)  $a = -10$

## Página 13

4 a)  $\frac{5}{3}$  b)  $\frac{18}{7}$

c)  $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = +\infty$

d) 0 e)  $-\infty$  f)  $-2$  g) 1

h)  $e^{1/4}$  i)  $e^{-1}$  j)  $\frac{-1}{4}$

k)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  l)  $\frac{1}{2}$

## Página 14

1 a) Continua si  $x \neq -1$  y  $x \neq 1$ .

Discontinuidad evitable en  $x = -1$ ; discontinuidad infinita (asíntota vertical) en  $x = 1$ .

b) Continua si  $x \neq -1$ ,  $x \neq 1$  y  $x \neq 2$ .

Discontinuidades infinitas (asíntotas verticales) en  $x = -1$  y en  $x = 1$ ; discontinuidad evitable en  $x = 2$ .

c) Continua si  $x \neq 1$ . Discontinuidad evitable en  $x = 1$ .

d) Continua si  $x \neq 2$ . Discontinuidad de salto finito en  $x = 2$ .

## Página 15

2 a) Continua si  $x \neq 2$ . Discontinuidad infinita (asíntota vertical) en  $x = 2$ .

b) Continua si  $x \neq -1$ . Discontinuidad infinita (asíntota vertical) en  $x = -1$ .

c) Continua si  $x \neq 0$ . Discontinuidad infinita en  $x = 0$ .

d) Continua si  $x \neq -4$ . Discontinuidad evitable en  $x = -4$ .

## Página 16

1 a)  $a = 1$ ,  $b = 1$

b)  $a = -1/2$

## Página 17

1 a)  $f(x)$  es continua en  $(0, 2)$ ;  $f(0) = 5 > 0$ ;  $f(2) = -39 < 0$ . Por el teorema de Bolzano, existe  $c \in (0, 2)$  tal que  $f(c) = 0$ ; es decir,  $f(x)$  corta al eje  $OX$  en  $x = c$ .

b)  $f(1) = 1 > 0$ ;  $f(1,1) = -0,24 < 0$ . Por tanto;  $x = 1,1$  se aproxima en menos de una décima a la raíz que buscamos.

2 a) Tomamos  $f(x) = \cos x + x - 2$ ;  $f(0) = -1 < 0$   $f(\pi) = \pi - 3 > 0$ . Por el teorema de Bolzano, sabemos que en el intervalo  $(0, \pi)$  existe una raíz de la ecuación dada.


3  $f(x)$  no es continua en el intervalo  $[-1, 1]$ .

## Página 18

1 a) Es continua si  $x \neq -2$ ,  $x \neq -1$  y  $x \neq 2$ .


Discontinuidad infinita (asíntota vertical) en  $x = -2$ ; discontinuidad evitable en  $x = -1$ ; discontinuidad de salto finito en  $x = 2$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$ ;  
 $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -2$ ;  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ ;  
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$   
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  no existe;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ;



- 2 a) Indeterminado      b) 0  
 c) 0      d) Indeterminado  
 e) Indeterminado      f) Indeterminado

3  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ;  $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{1}{2}$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$



- 4 a) 0      b)  $\frac{3}{2}$       c)  $\frac{1}{3}$   
 d)  $+\infty$       e) 0      f)  $\frac{1}{6}$   
 g)  $+\infty$       h)  $+\infty$       i)  $\frac{1}{4}$

## Página 19

- 5 a)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ ; b) 0    c) 1  
 d)  $\frac{1}{6}$     e)  $\frac{1}{2}$     f) 0    g)  $e^{3/5}$     h)  $e^{-1}$     i)  $+\infty$   
 6 a) Continua si  $x \neq 0$ . Discontinuidad de salto finito en  $x = 0$ .  
 b) Continua si  $x \neq -1$ . Discontinuidad infinita (asintota vertical) en  $x = -1$ .  
 7 a)  $m = 1$ ,  $n = 4$

- 8  $f(x)$  no es continua en  $x = 2$ .

## Página 20

- 1  $f'(2) = 1$   
 2  $f'(4) = \frac{1}{4}$   
 3  $f'(-1) = -2$   
 4  $f'(-1) = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}$ ;  $f'(3) = \frac{1}{4}$

## Página 21

- 5 a) No es derivable en  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 2$ .  
 En  $x = -1$  y  $x = 1$  hay puntos angulosos (derivadas laterales distintas); en  $x = 2$  no está definida.  
 b) No es derivable en  $x = 2$ , pues no es continua en ese punto.  
 c) No es derivable en  $x = -1$ , ni en  $x = 1$ ; hay punto angulosos (derivadas laterales distintas).  
 d) Es derivable.

6  $f'(-2) = 0$ ;  $f'(0) = \frac{1}{2}$ ;  $f'(3) = -1$

7 a)  $f'(1^-) = -1$ ;  $f'(1^+) = 1$   
 $f(x)$  no es derivable en  $x = 1$ .

b)  $f'(1^-) = 2$ ;  $f'(1^+) = 2$

Como coinciden, y  $f(x)$  es continua en  $x = 1$ ,  $f(x)$  es derivable en  $x = 1$  y su derivada es  $f'(1) = 2$ .

- 8 La función no es continua en  $x = 2$ .

9 a)  $f'(x) = 6x$       b)  $f'(x) = \frac{6}{(x+2)^2}$