

- 26  Autobus batek 60 bidaiari daramatza, baina hiru tarifa motarekin. Bidaiari batzuek billete osoa ordaindu dute, hau da, 1,2 euro. Bidaiarien beste multzo batek billetearen balioaren %80 ordaindu dute, eta hirugarren multzo batek, %50. Atzo autobusak 46,56 euro bildu zituen billeteak salduta. Kalkulatu zenbat bidaiari joan diren tarifa mota bakoitzarekin, jakinda deskontu handiena duten bidaiariak bi aldiz gehiago direla gainerako bidaiariak baino.
- 27 Denda batean, bi jaka eta blusa bat erosi eta 200 € ordaindu dugu. Dendara itzuli eta jaka bat eta praka-pare bat erosten baditugu, eta blusa itzuli, 100 € ordainduko dugu. Zenbat ordainduko dugu host jaka, praka-pare bat eta blusa bat erosita?
- 28 Kutxazain automatiko batek 95 billete ditu guztira, 10, 20 eta m eurokoak. Badakigu kutxazainean 2000 € daudela, eta 10 euroko billeteen kopurua bi aldiz handiagoa dela 20 euroko billeteen kopurua baino.
- Plantatu problemaren baldintzak adierazten dituen ekuazio-sistema bat. Frogatu $m \in [5, 50, 100]$ bada, sistema bateragarri determinatua dela.
 - Egon liteke 5 edo 100 euroko billeteak kutxazainean?
 - Ebatzi sistema $m = 50$ kasurako.
- 29  Irenek A enpresako 200 akzio erosi ditu, B enpresako 150, eta C-ko 100. Guztira 3300 € ordaindu du. Jesusek 3750 € gastatu ditu A enpresako 50 akzio, B-ko 120 eta C-ko 240 erosteko. Datu horiekin, jakin dezakegu akzio bakoitzaren prezioa zein den? Eta akzio bakoitzaren prezioa kopuru oso bat bada, 1 € eta 12 € bitartekoa, biak barne?
- 30 Pertsona batek 6000 €-ko irabaziak lortu ditu 60000 € inbertituta hiru enpresatan: A, B eta C. A eta B enpresetan guztira inbertitutakoa m aldiz izan da C-n inbertitutakoa, eta irabaziak %5ekoak izan dira A-n, %10ekoak B-n eta %20koak C-n.
- Plantatu ekuazio-sistema bat enpresa bakoitzean zenbat diru inbertitu den jakiteko.
 - Frogatu $m > 0$ bada sistema bateragarri determinatua dela.
 - Aurkitu soluzioa $m = 5$ kasurako.
- 31 Biltegi batek A, B eta C hiru markak egiten duten produktu jakin bat banatzen du. A markak 250 gramoko kaxatan ontziratzen du, eta 10 €-an saldu; B markak 500 gramoko kaxatan ontziratzen du, eta 18 €-an saldu; eta C markak 1 kiloko kaxatan ontziratzen du, eta 33 €-an saldu. Biltegiaren bezero bati produktu horren 2,5 kilo saldu dizkiote, 100 €-an. Jakinda guztira 5 kaxa saldu dizkiotela, kalkulatu mota bakoitzeko zenbat kaxa erosi dituen. Soluziorik al du problemak?
- 32 Kafetegi batean, A mahaikoek 6 kafe eta 3 tostada eskatu dituzte eta 12 € ordaindu dute, eta B mahaikoek, 6 kafe eta m tostada eskatuta, 13,60 € ordaindu dute.
- Plantatu ekuazio-sistema bat, x eta y ezezagunak kafetaren prezioa eta tostadaren prezioa izanik, hurrenez hurren.
 - m -ren zer baliotarako dauka soluzioa aurreko sistemak? Soluziorik egonez gero, bakarra izango da beti? Eskatu ahal izan dituzte B mahaikoek 4 tostada? Erantzuna baietz bada, zenbat balio du kafe batek?
- 33 Lagun batzuek, atzo, 4 freskagarri, 3 ogitarteko eta 5 izozki eskatu zituen taberna batean, eta 30,60 € ordaindu zuten guztira. Aurreko egun batean, 2 freskagarri, ogitarteko bat eta 2 izozki erosi, 12,30 € ordaindu zuten.
- Gaur ere taberna horretan izan dira, eta 6 freskagarri, 5 ogitarteko eta 8 izozki eskatu dituzte. Zenbat ordainduko dute? Arrazoitu zure erantzuna.
 - Freskagarri batek, ogitarteko batek eta izozki batek 8,20 € balio badute, zein da bakoitzaren prezioa banaka?
- 34 Lantegi batean, goizeko txandan kontsumitu dituzten erregai-tonak m aldiz dira arratsaldeko txandan kontsumitutako tonak.
- Gainera, badakigu arratsaldeko txandan m tona gutxiago kontsumitzen dituztela goizeko txandan baino.
- Plantatu eta eztabaidatu problema hori m -ren funtzioan.
 - Izan liteke goizeko txandan bi aldiz erregai gehiago kontsumitzea arratsaldeko txandan baino?
 - $m = 2$ dela pentsatuz gero, zenbat kontsumitzen da arratsaldeko txandan?
- 35 Herrialde batek A, B eta C hiru markatako 21 000 ibilgailu inportatu ditu, 10 000, 15 000 eta 20 000 euroan, hurrenez hurren. Ibilgailuak 322 milioi euro kostatu dira guztira. Badakigu 21 000 ibilgailu daudela, B markakoak eta k aldiz A markakoak zenbatuta.
- Plantatu sistema bat problemaren baldintzekin, marka bakoitzeko ibilgailu-kopuruaren funtzioan.
 - Ebatzi sistema $k = 3$ kasurako.
 - Egiaztatu sistemak ez duela soluziorik $k = 2$ kasuan.

