

HEMOGLOBINA HUMANA EN DEPOSICIÓN (1, 2 o 3 MUESTRAS)

MÉTODO INMUNOLÓGICO

En cualquier unidad de toma de muestras le entregarán instrucciones y material para la realización de este procedimiento.

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen de deposición, que busca detectar sangre de origen gastrointestinal.

Ud. deberá seguir las instrucciones que se indican a continuación para la obtención de resultados correctos. En la unidad de toma de muestras se le entregarán (según número de muestras solicitadas por el médico) uno (1), dos (2) o tres (3) frascos de polipropileno de tapa rosca con espátula.

Instrucciones:

1. Las ventajas de este test es que no existen restricciones dietarias para el paciente, antes o durante la recolección de las muestras.
2. Desde una (1) semana antes de obtener la primera muestra de deposición, y **mientras dure la recolección**, suspender el uso de medicamentos analgésicos / antiinflamatorios no esteroideos como: aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, meloxicam, dipirona, paracetamol, tramadol, etc.
3. No realizar el test en caso de diarrea; esperar a que la actividad intestinal se normalice.
4. En mujeres, es preferible aplazar el test para después del período menstrual. (esperar tres (3) o más días).
5. En caso de solicitar el análisis de tres (3) muestras, **se deben examinar tres (3) deposiciones consecutivas**.
6. Anotar inmediatamente el nombre completo del paciente y la fecha de recolección de la muestra en cada frasco.
7. Defeque en una bacinica limpia y seca, sin mezclar la deposición con orina.
8. Recolectar con la espátula una pequeña muestra de heces del tamaño de una aceituna en el primer frasco. Proceder de la misma forma con la(s) siguiente(s) deposición(es), en caso de ser requerida(s).
9. Una vez recolectadas todas las muestras, correctamente rotuladas (nombres y ambos apellidos), entregarlas sin demora en la unidad de toma de muestras.