

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ACAROTEST

Estimado paciente:

Su médico le ha solicitado el examen para detectar la presencia de *sarcoptes scabiei* que produce la escabiosis o sarna. Este examen requiere una muestra de piel y, para obtenerla, se debe raspar con una lámina de vidrio suavemente sobre la piel hasta obtener escamas de la zona donde existen lesiones con sospecha de ácaros en la piel, que luego se adhiere a un portaobjetos con un trozo de scotch-tape.

La muestra solicitada debe ser tomada en la unidad de toma de muestras, por el personal clínico capacitado y para garantizar una muestra de calidad, es importante que lea detenidamente las **siguientes instrucciones** antes de proceder con la unidad de toma de muestras.

1. No aplicar ungüentos (cremas, maquillaje, bloqueador, etc.) en la zona afectada el día de la toma de muestra.
2. Se debe realizar el examen antes de iniciar algún tratamiento tópico indicado por el médico o el uso de antiparasitario oral.
3. Si ya comenzó tratamiento antiparasitario, debe suspenderlo al menos 3 días antes por indicación médica.

La toma de muestras para este examen se realiza en todas nuestras unidades de toma de muestras por orden de llegada de acuerdo al horario de funcionamiento, de lunes a sábado.

Al momento de acudir a la unidad de toma de muestras, debe presentar su Cédula de identidad o DNI en conjunto a la orden médica.

Para conocer el horario de funcionamiento de cada unidad de toma de muestras, ingrese a <https://aclin.cl/sucursales/>