

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ESTREPTOCOCO TIPO B

Streptococcus del grupo B o streptococcus agalactiae.

Estimado paciente:

Su médico le ha solicitado el examen para detectar la bacteria Streptococcus del grupo B (o streptococcus agalactiae). Este examen requiere una muestra de secreción vaginal que se obtiene con un hisopo (tórula de algodón). Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas adecuadas a su condición.

En mujeres embarazadas, este examen es solicitado cerca del final del embarazo, entre las semanas 35 y 37 o según indicación médica, y se debe tomar una muestra de secreción vaginal y otra desde la zona perianal.

Para garantizar una muestra de calidad, es importante que lea detenidamente las **siguientes instrucciones** antes de proceder con la unidad de toma de muestras.

1. El día del examen, **no realizar aseo genital externo** para asegurar la obtención de una muestra que facilite la correcta detección de la bacteria.
2. Evitar el uso de óvulos vaginales, talcos, cremas o colonias en la zona genital durante las 48 horas previas al examen.
3. No realizar ecografía transvaginal en las 48 horas anteriores a la toma de la muestra.
4. Se recomienda evacuar la vejiga antes de la toma del examen para mayor comodidad durante el procedimiento.

La toma de muestras para este examen se realiza en todas nuestras unidades de toma de muestras por orden de llegada de acuerdo al horario de funcionamiento, de lunes a sábado.

Al momento de acudir a la unidad de toma de muestras, debe presentar su Cédula de identidad o DNI en conjunto a la orden médica.

Para conocer el horario de funcionamiento de cada unidad de toma de muestras, ingrese a <https://aclin.cl/sucursales/>