

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SALIVA PARA MEDICIÓN DE CORTISOL CON SISTEMA SALIVETTE

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen de cortisol salival. La medición de cortisol salival nocturno es una prueba útil para el **screening y diagnóstico del síndrome de Cushing**. Lo recomendable es hacer esta prueba durante dos noches consecutivas. En cualquier unidad de toma de muestras le entregarán instrucciones y tubo(s) salivette para la recolección de saliva.

Importante: No usar el tubo salivette en niños menores de cinco (5) años o en pacientes con riesgo de asfixia.

Para garantizar una muestra de calidad, es importante que lea detenidamente las siguientes instrucciones.

1. Tomar la muestra de saliva a las 23:00 horas (once de la noche).
2. Evite fumar y hacer ejercicios vigorosos la tarde anterior a la toma de muestra.
3. Tome la muestra, transcurridos treinta (30) minutos o más, desde la última ingesta de alimentos sólidos o líquidos, y de lavarse los dientes.
4. El dispositivo salivette que le será entregado está conformado por cuatro estructuras, a saber:
 - a. Tubo externo.
 - b. Contenedor interno.
 - c. Tapón del contenedor interno.
 - d. Tórula de algodón.
5. Lave sus manos con abundante agua y jabón. Séquelas cuidadosamente con toallas de papel o de género limpias.
6. Extraiga el contenedor interno del tubo externo y quite el tapón. La apertura se facilita si se mueve el tapón ligeramente de lado a lado.
7. Extraiga del contenedor interno, la tórula de algodón (cilindro blanco de algodón) y colóquela en su boca.
8. Mueva el algodón dentro de la boca -masticándolo suavemente- durante algunos minutos o hasta que note que no puede evitar tragar la saliva producida.
9. Devuelva el algodón empapado en saliva al contenedor interno, tápelo y colóquelo dentro del tubo externo (con un tenue chasquido). Asegúrese de que el salivette esté correctamente cerrado.
10. Conserve el salivette en bolsa plástica limpia -cerrada herméticamente- y dentro del refrigerador **(NO congelador)**, hasta el momento de transportar la muestra a la unidad de toma de muestras.
11. Temprano, al día siguiente, coloque la bolsa con la muestra dentro de otra bolsa con hielo y traslade a la brevedad a la unidad de toma de muestras.

La toma de muestras para este examen se realiza en todas nuestras unidades de toma de muestras por orden de llegada de acuerdo al horario de funcionamiento, de lunes a sábado.

Al momento de acudir a la unidad de toma de muestras, debe presentar su Cédula de identidad o DNI en conjunto a la orden médica.

Para conocer el horario de funcionamiento de cada unidad de toma de muestras, ingrese a <https://aclin.cl/sucursales/>