

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE TEST DE NUGENT

Dexametasona nocturna a dosis baja (1 mg)

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un análisis de sangre que requiere tomar muestras de sangre pre y post medicación con dexametasona. Le rogamos seguir las instrucciones que se indican a continuación para la obtención de resultados correctos.

1. El día previo al examen, preferir comidas livianas, evitando las ricas en grasas y exceso de alcohol.
2. Es recomendable mantener el día anterior actividad física reducida.
3. Presentarse en la unidad de toma de muestras a las 7:45 horas en ayuno de 8 horas. Luego de realizar un reposo de 20 a 30 minutos le extraerán la muestra de sangre basal **(Día 1)** y se entregará el medicamento a administrar.
4. El mismo día **(Día 1)** a las 23:00 horas exactamente, tomar medicación indicada (1 mg de dexametasona).
5. Presentarse en la unidad de toma de muestras a las 07:45 horas del día siguiente **(Día 2)** en ayuno de 8 horas para extracción de muestra de sangre post estímulo de dexametasona.
6. Considerar que la falta de cumplimiento de la toma del medicamento invalida el test.

La toma de muestras para este examen se realiza en todas nuestras unidades de toma de muestras por orden de llegada de acuerdo al horario de funcionamiento.

Al momento de acudir a la unidad de toma de muestras, debe presentar su Cédula de identidad o DNI en conjunto a la orden médica.

Algunos exámenes no pueden realizarse los días sábados (por ejemplo, exámenes de biología molecular, glicemia post prandial, crioaglutininas, crio globulina, renina, quantiferon, resistencia globular osmótica, etc.). Es por esto que **se sugiere confirmar previamente la factibilidad de la toma de exámenes el día sábado con su respectiva orden médica.**

Para conocer el horario de funcionamiento de cada unidad de toma de muestras, ingrese a <https://aclin.cl/sucursales/>