Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen de sangre denominado **Gastropanel**, que permite analizar los niveles de **pepsinógeno I, pepsinógeno II, gastrina-17 y anticuerpos IgG contra *Helicobacter pylori***. Este examen entrega información útil para la **evaluación del estado de la mucosa gástrica**, especialmente en la detección y evaluación de alteraciones asociadas a **gastritis atrófica**, y puede contribuir a la identificación de pacientes que requieren una evaluación médica más específica.

Le rogamos seguir exhaustivamente el siguiente instructivo. De su cumplimiento dependerá la calidad de la muestra y el correcto resultado del análisis.

Instrucciones:

1. 10 días antes del examen, suspenda:
   - Ranitidina, lanzoprazol, omeprazol, esomeprazol, pantoplazol, rabeprazol o pariprazol.

2. 2 días antes del examen, suspenda:
   - Antiácidos: gaviscón, leche de magnesia, antiax, maalox, sal de fruta, tabletas Phillips, bicarbonato, etc.
   - Agendes protectores de la mucosa: mucipep – c, trimebutino maleato.

3. 4 horas antes de examen, suspenda:
   - Comidas, bebidas, masticar chicle y cigarrillos.

Si tiene dudas respecto de este informativo consulte al personal de la unidad de toma de muestras. Eventualmente consulte a nuestro **Call center 323323600**, al correo **consultas@aclin.cl** o en la sección contacto en nuestra web: **www.aclin.cl**

Revisado por Q.F. Marcelo Tapia C.

Marcelo Tapia Carrère
QF / Director Técnico

Este documento no puede ser reproducido ni entregado a terceros, sin la expresa autorización del Director Técnico de Aclin.