MITOS CON DATOS

¿Saltarte el desayuno baja tu glucosa?

Dos días de la misma persona. Spoiler: depende (y mucho).

Desliza →

Hacemos visible lo invisible

Ayuno vs. 3 comidas

Ayuno y 2 comidas

Sin desayuno

2

26/05/2023



01:26–12:22 · 74 lecturas

Máximo	**120 mg/dl**
Mínimo	**86 mg/dl**
Amplitud total	**34 mg/dl**

3 comidas con desayuno

Incluye desayuno

3

20/04/2023



01:04–10:50 · 94 lecturas

Máximo	**118 mg/dl**
Mínimo	**92 mg/dl**
Amplitud total	**26 mg/dl**

Misma persona, misma franja horaria (madrugada a mediodía). La respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

Los números

	Sin desayuno	Con desayuno
Máximo	120 mg/dl	118 mg/dl
Mínimo	86 mg/dl	92 mg/dl
Amplitud	**34 mg/dl**	**26 mg/dl**

Menos amplitud = curva más estable.

Lo que nos enseñan las curvas

El ayuno apenas cambia nada

Noche y mañana en valores muy parecidos, desayune o no.

La primera comida pega más

Al comer a las 12:00, la glucosa sube de golpe hasta 120 mg/dl.

Con 3 comidas, más estable

Amplitud de 26 mg/dl frente a 34 mg/dl.

Hacemos visible lo invisible

Si quieres ayunar...

🌙

Adelanta la cena

Y retrasa un poco el desayuno. Mismas comidas, más descanso digestivo.

🍽️

Prueba a no cenar

En muchas personas que usan Glucovibes da más estabilidad que saltarse el desayuno.

⚡

Ojo al cortisol

En algunas personas se dispara con el ayuno matinal y provoca picos.

glucovibes

Entiende antes de restringir.

Mira qué pasa dentro

glucovibes.com

Hacemos visible lo invisible