CÓMO AFECTA

Misma cena.
Distinta hora.

Un Viber cenó lo mismo a las 20:30 y a las 23:00. Su glucosa no respondió igual.

Desliza →

Hacemos **visible** lo invisible

El experimento

🕗 Cena 1: a las 20:30

Exactamente los mismos alimentos.

🕗 Cena 2: a las 23:00


El mismo plato, dos horas y media más tarde.

⚖️ Todo lo demás, igual

Misma composición, actividad física y nivel de estrés.

Hacemos visible lo invisible


La hora también cuenta



Cena a las 23:00

≈138 mg/dl

pico aprox. (gráfica)



Cena a las 20:30

≈107 mg/dl

pico aprox. (gráfica)

Curvas reales de un Viber, misma cena en dos horarios. Picos aproximados leídos en la gráfica. La respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

¿Por qué pasa esto?

🌙

Menos sensibilidad a la insulina

Por la noche baja y al cuerpo le cuesta más gestionar la glucosa.

😴

Ritmos circadianos

Cenar tarde puede alterarlos y empeorar la calidad del descanso.

Hacemos visible lo invisible

#GLUCOTIP

Adelanta la cena cuando puedas.

Tu glucosa y tu descanso lo notarán.

Desliza →

Hacemos visible lo invisible

glucovibes

Deja de adivinar.
Mídelo.

Descubre tu respuesta

glucovibes.com

Hacemos **visible** lo invisible