

Absence frequencies at selected structural-variation loci
Representative gene
Rv1994c
Rv1995
Rv2073c
Rv2074
Rv2645
Rv2650c
Rv2654c
Rv2658c
0.0% (0/247)
0.8% (2/257)
0.3% (1/372)
17.6% (350/1987)
100.0% (94/94)
0.0% (0/270)
0.0% (0/247)
0.8% (2/257)
0.5% (2/372)
17.8% (354/1987)
100.0% (94/94)
0.0% (0/270)
0.0% (0/247)
0.0% (0/257)
0.0% (0/372)
0.0% (0/1987)
100.0% (94/94)
100.0% (270/270)
0.0% (0/247)
0.0% (0/257)
0.0% (0/372)
0.0% (0/1987)
100.0% (94/94)
100.0% (270/270)
91.5% (226/247)
0.4% (1/257)
1.1% (4/372)
3.2% (63/1987)
10.6% (10/94)
100.0% (270/270)
91.5% (226/247)
0.0% (0/257)
0.8% (3/372)
2.9% (57/1987)
10.6% (10/94)
100.0% (270/270)
91.5% (226/247)
6.2% (16/257)
4.0% (15/372)
5.6% (112/1987)
11.7% (11/94)
100.0% (270/270)
91.5% (226/247)
0.0% (0/257)
0.8% (3/372)
3.0% (60/1987)
10.6% (10/94)
100.0% (270/270)
L1
L2
L3
L4
L5
L6
MTBC lineage
Gene absence frequency (%)
0
20
40
60
80
100