

Sepsis Protocol Checklist Lersin Hospital

วันที่	เวลา	ติดสติ๊กเกอร์
ผู้ป่วยถึง ร.พ.		
ผู้ป่วยถึง ER, OPD		Type of infection () CI () NI
เวลาประเมิน		Co-morbidity () ไม่มี () มี ระบุ
แพทย์ตรวจ		() DM () HT () CKD () cirrhosis
วินิจฉัย sepsis/septic shock		() CAD () CVA () Cancer () HIV
เวลา H/C		Source work up () H/C () Sputum C/S
เวลา ATB		() UC () Pus C/S () อื่นๆ ระบุ.....
เวลา Admit/transfer		Admit to () ward () ICU
1. การวินิจฉัยและแนวปฏิบัติ		
ตำแหน่งที่สงสัยการติดเชื้อ () Bacteremia () GI () Respiratory () UTI () soft tissue () CNS () Tropical infection () Unknown		Final diagnosis..... เชื้อที่เป็นสาเหตุ ATB ที่ได้รับ 1.....รวม.....วัน 2.....รวม.....วัน
<input type="checkbox"/> Sepsis: ตามนิยาม 1 หรือ 2 1. <u>suspected infection + อาการอย่างใดอย่างหนึ่งของ hypoperfusion โดยไม่มีสาเหตุอื่น</u> () ชี้นี้ กระวนกระวาย () Oliguria () hypotension () Hypoxia () Plt < 100,000 () Bilirubin > 2 () Cr > 1.5 or > 20% from baseline () INR > 1.5 () lactate > 2 2. <u>suspected infection + quick SOFA score</u> <input type="checkbox"/> 2 ใน 3 ข้อ () Altered mental status (GCS < 15) () RR <input type="checkbox"/> 22/min () SBP <input type="checkbox"/> 100 mmHg		<input type="checkbox"/> Activate sepsis bundle <input type="checkbox"/> 30 min MEWS <input type="checkbox"/> Admit ward/ICU ***แนะนำ Admit ICU if MEWS <input type="checkbox"/> 7 คะแนน
<input type="checkbox"/> Septic shock: Sepsis + ความดันโลหิตต่ำไม่ตอบสนองต่อการให้ Crystalloid 30 ml/kg (need vasopressor) + lactate > 2 mmol/L		<input type="checkbox"/> Activate sepsis bundle <input type="checkbox"/> 15 min MEWS <input type="checkbox"/> Urinary catheterization <input type="checkbox"/> Admit ICU urgency



แนวทางการรักษาผู้ป่วย Sepsis/septic shock

วินิจฉัยเวลา.....น. แพทย์.....

