

## ร่างแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Thyrotropin alfa ข้อบ่งใช้ well differentiated thyroid cancer

		ส่วนที่	1 ข้อมูลสถานพยาบาลและแพทย์		
janness.	<ol> <li>ชื่อสถานพยาบาล</li></ol>	นกำกับดูแล บยการให้เ <i>ร</i>	การสั่งใช้ยาบัญชี จ(2))		
4			ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วย		
	1. ชื่อ-สกุล	*******	2. HN		
	4. สิทธิการเบิก 🛘 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 🔻 🗘 ประเ	กันสังคม	3. AN		
	🛘 สวัสติการรักษาพยาบาลราชการ 🗘 อื่นๆ	ระบุ			
ยามาล	รี โมทศ □ ชาย □ หญิง 6. วันเดือนปีเกิด/				
หมาที่รวงพ					
₹ <u>.</u>	10. ได้รับ pre-authorization แล้ว 🛭 ใช่ 🗀 ไม่ใช่	11. Autho	rization number		
	12. น้ำหนักตัว กิโลกรับ	l3. ส่วนสูง	เชนติเมตร		
	14. พื้นที่ผิวร่างกาย	**********	(เฉพาะผู้ป่วยเด็ก)		

## ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบอนุมัดิและข้อมูลการใช้ยา

1 2		สามารถให้ยาซ้ำได้ไม่ ามเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้ เ ยา thyrotropin alfa เพื่อเพิ่ม remnant ablation) ด้วย I-1: คฉัยแน่นอนว่าเป็น well differ เทางพยาธิวิทยา กัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่าง างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห เการวัดระดับ TSH ในเลือดเมื่	ะใช้ยานี้ในผู้ป่วย terminally เาครั้งที่	thyroid remna รรักษาโดยการทำ ced thyroid cand pidectomy สูงกว่า 25 มิลลิยุ	ใช่ O ant เหลืออยู่ O naายเนื้อต่อม cer โดยมีเกถ O	<b>ไม่ใช่</b>		
1	<ol> <li>การให้ยา Thyro หมายเหย หมายเหย อนุมัติการใช้ หลังผ่าตัด (thyroid 3.1 ได้รับการวินิ โดยการดรวร 3.2 ได้รับการผ่าย 3.3 มีลักษณะอย่ 3.3.1 มีภาว โดยห 3 สัป</li> </ol>	tropin alfa ครั้งนี้เป็นการใช้เ  สามารถให้ยาช้ำได้ไม่  ามเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้ ผ ยา thyrotropin alfa เพื่อเพิ่ม remnant ablation) ด้วย I-1: คฉัยแน่นอนว่าเป็น well differ เทางพยาธิวิทยา ลัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่าง างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิพูอิทารี่ไม่สามารถห เกกรวัดระดับ TSH ในเลือดเมื่	าาครั้งที่	thyroid remna รรักษาโดยการทำ ced thyroid cand pidectomy สูงกว่า 25 มิลลิยุ	O ant เหลืออยู่ O าลายเนื้อต่อม cer โดยมีเกถ O O	<ul><li>O</li><li>ไทรอยด</li><li>แท่ดังนี้</li><li>O</li><li>O</li></ul>		
٩	หมายเห 3. ผู้ป่วยมีลักษณะด อนุมัติการใช้ หลังผ่าตัด (thyroid 3.1 ได้รับการวินิ โดยการดรวจ 3.2 ได้รับการผ่า 3.3 มีลักษณะอย่ 3.3.1 มีภาว โดยห 3 สัป	q ทำการประเมินภายใน สามารถให้ยาซ้ำได้ไม่ ามเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้ เ ยา thyrotropin alfa เพื่อเพิ่ม remnant ablation) ด้วย I-1: คฉัยแน่นอนว่าเป็น well differ เทางพยาธิวิทยา กัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่าง างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห เ่าการวัดระดับ TSH ในเลือดเมื	6 - 12 เดือนแล้วพบว่ายังมี กิน 1 ครั้ง ระดับ TSH ในเลือดก่อนการ 1 ในโรค well differentiat entiated thyroid cancer เน้อยแบบ near total thyro	รรักษาโดยการทำ ced thyroid cand pidectomy สูงกว่า 25 มิลลิยุ	O าลายเนื้อต่อม cer โดยมีเกถ O O	แช่ดังนี้ O		
1	อนุมัติการใช้ หลังผ่าตัด (thyroid  3.1 ได้รับการวินิ โดยการตรวจ  3.2 ได้รับการผ่าย  3.3 มีลักษณะอย่  3.3.1 มีภาว โดยท  3 สัป	en thyrotropin alfa เพื่อเพิ่ม remnant ablation) ด้วย I-1: จฉัยแน่นอนว่าเป็น well differ เทางพยาธิวิทยา อัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่าง างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห เกกรวัดระดับ TSH ในเลือดเมื	ระดับ TSH ในเลือดก่อนการ 31 ในโรค well differentiat entiated thyroid cancer หน้อยแบบ near total thyro จั่ง TSH ให้มี ระดับในเลือด	ed thyroid can oidectomy สูงกว่า 25 มิลลิยุ	cer តែមរីកេត O O	แช่ดังนี้ O		
	โดยการดรวจ 3.2 ได้รับการผ่าเ 3.3 มีลักษณะอย่ 3.3.1 มีภาว โดย <i>v</i> 3 สัปเ	ทางพยาธิวิทยา ดัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่าง างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห การวัดระดับ TSH ในเลือดเว๋ ลาห์	น้อยแบบ near total thyro จั่ง TSH ให้มี ระดับในเลือด	สูงกว่า 25 มิลลิยุ	0	0		
	3.2 ได้รับการผ่า 3.3 มีลักษณะอย่ 3.3.1 มีภาว โดย <i>v</i> 3 สัป	ลัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วอย่า างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห เาการวัดระดับ TSH ในเลือดเว๋ ลาห์	รั่ง TSH ให้มี ระดับในเลือด	สูงกว่า 25 มิลลิยุ	0	0		
	3.3 มีลักษณะอย่ 3.3.1 มีภาว โดย <i>ข</i> 3 สัป	างน้อย 1 ข้อในข้อต่อไปนี้ ะที่ต่อมพิทูอิทารี่ไม่สามารถห การวัดระดับ TSH ในเลือดเว๋ ภาฺห์	รั่ง TSH ให้มี ระดับในเลือด	สูงกว่า 25 มิลลิยุ	_			
	3.3.1 มีภาว โดยท่ 3 สัป	ะที่ต่อมพิทูอิทารีไม่สามารถห กาการวัดระดับ TSH ในเลือดเม๋ ดาห์			ูนิดต่อลิตรได้	9		
	โดย <b>v</b> 3 สัป	ำการวัดระดิ๊บ TSH ในเลือดเมื่ ดาฺห์				E.		
				ายรเมนเมนเวลา				
		drive of willing			O	0		
	3.3.2 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยจิดเวชตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยจิตแพทย์และได้รับ การรักษาด้วยยาทางจิตเวช เช่น โรคชืมเศร้า โรคจิตเภท ซึ่งอาการอาจจะกำเริบหากอยู่ในภาวะ							
		thyroidism ในประวัติอดีตขอ			0	0		
	จนดั และ	เที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่มีปร องเข้ารับการรักษาในโรงพยา ejection fraction< 50% ห่ เปกติ (เช่น Systolic blood p	ına ได้แก่ 1. มีอาการและอ รื่อ ejection fraction ลดลง	วาการแสดงของภ เ 10% หรือ 2. ค	าาวะหัวใจล้มเ เวามดันโลหิต	เหลว		
	ของเ ผิดป <sub>ี</sub> เ	าชกิด (เซน Systolic blood p ลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพื กิดิ (เช่น Hyponatremia คือ nmol/L)	ยงพอ เช่นหน้ามืด เวียนศีรร	ษะ เป็นดัน หรือ :	3. ระดับอิเลค			
	3.3.4 ผู้ป่ว	แก่งๆ ะ) ยที่มีอาการหรืออาการแสดงจ กว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน) ร				core		
	ในเลื 3.3.5 ผู้ป่วย	อดน้อยกว่า 25 มิลลิยูนิตต่อลิ บที่อายุน้อยกว่า 18 ปีที่มีโรคม	คร ะเร็งลุกลามหรือ กระจายออ	เกนอกต่อมไพรอ	O 186 O	C		
	alfa ด้วยน้ำกลั่น 1.	otropin alfa ทั้งหมด ที่ใช้ 2 มิลลิลิตร จะได้ thyrotrop ว.9 มิลลิกรัม) เข้ากล้ามเนื้อบ	n alfa 0.9 มิลลิกรับ/1 มิล	เลิลิตร ฉีดสารละ	จากละลาย th ะลายที่ผสม 1	yrotrop . มิลลิลิ		
	สำหรับผู้อนุมัติ	<ol> <li>1.⊗ ใช่</li> <li>การขออนุมัดิเมื่อทำการปร</li> </ol>		ล้วพบว่ายังมี thy	yroid			
		remnant เหลืออยู่ สามารถ 3.⊗ ใช่ 4. ระบุขนาดยาเป็นไปดามเก						

		ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบอนุมัดิและข้อมูลการใช้ยา (ต่อ)
5.1 ma*878035 m	ข. เกณฑ์การหยุดใช้ยา	วันเดือนปีที่ให้ยา/// การใช้ยาครั้งนี้เป็นครั้งที่
เพทย์		ใช่ ไม่ใช่ สงศ์ร้ายแรงที่แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดผลเสีย จเต้นผิดจังหวะ อาเจียนอย่างรุนแรง ภาวะ hypersensitivity O O
	<b>สำหรับผู้อนุมัติ</b> <i>เกณฑ์การหยุดใช้ยาะ</i> 1. ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียง เห็นว่าเกิดผลเสียมาก	หรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้ว
	CALLS INIVINUEDA III	กวาบระเยชนทุจะเดรบ 🤡 เช
21€	วรับรองว่าข้อมูลข้างดันเป็นความจริงทุกประการ ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา	กวาบระเยชนทจะเดรบ ⊗ เช  ผลการอนุมัติ □ อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ