

### Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital

วันที่	เวลา	ติดสติ๊กเกอร์
ผู้ป่วยถึง ร.พ.		
ผู้ป่วยถึง ER, OPD		Type of infection ( ) CI ( ) NI
เวลาประเมิน		Co-morbidity ( ) ไม่มี ( ) มี ระบุ
แพทย์ตรวจ		( ) DM ( ) HT ( ) CKD ( ) cirrhosis
วินิจฉัย severe sepsis /septic shock		( ) CAD ( ) CVA ( ) Cancer ( ) HIV
เวลา H/C		Source work up ( ) H/C ( ) Sputum C/S
เวลา ATB		( ) UC ( ) Pus C/S ( ) อื่นๆ ระบุ.....
เวลา Admit/transfer		Admit to ( ) ward ( ) ICU
1. การวินิจฉัยและแนวปฏิบัติ		
<input type="checkbox"/> Sepsis (suspected infection + 2 SIRS) <b>ตำแหน่งที่สงสัยการติดเชื้อ</b> ( ) Bacteremia ( ) GU ( ) Respiratory ( ) GI ( ) soft tissue ( ) CNS ( ) Tropical infection ( ) Unknown <b>+ 2 SIRS</b> ( ) HR > 90 ( ) T > 38 or < 36 ( ) RR > 20 ( ) WBC > 12,000 or < 4,000		<input checked="" type="checkbox"/> 60 min MEWS <input checked="" type="checkbox"/> If score > 3 or change ≥ 2 แจ้งแพทย์
<input type="checkbox"/> Severe sepsis: Sepsis + อาการอย่างใดอย่างหนึ่งของ hypoperfusion โดยไม่มีสาเหตุอื่น ( ) ชี้น กระวนกระวาย ( ) Oliguria ( ) hypotension ( ) Hypoxia ( ) Plt < 100,000 ( ) Bilirubin > 2 ( ) Cr > 1.5 or > 20% from baseline ( ) INR > 1.5		<input checked="" type="checkbox"/> Activate sepsis bundle <input checked="" type="checkbox"/> 30 min MEWS <input checked="" type="checkbox"/> Admit ward/ICU
<input type="checkbox"/> Septic shock: อาการดังข้างต้น <u>ร่วมกับ</u> ความดันโลหิตต่ำไม่ตอบสนองต่อการให้ Crystalloid 30 ml/kg (fluid challenges)		<input checked="" type="checkbox"/> Activate sepsis bundle <input checked="" type="checkbox"/> 15 min MEWS <input checked="" type="checkbox"/> Urinary catheterization <input checked="" type="checkbox"/> Admit ICU urgency

# แนวทางการรักษาผู้ป่วย Severe sepsis/septic shock

วินิจฉัยเวลา.....น. แพทย์.....



