

§3.2 周期信号的连续时间傅里叶级数

- 傅里叶级数的三角形式
- 傅里叶级数的指数形式
- 奇、偶函数的傅里叶系数

一、傅里叶级数的三角形式

1. 三角函数集

$$\{1, \cos(n\Omega t), \sin(n\Omega t), n=1,2,\dots\}$$

在一个周期内是一个完备的正交函数集。

由积分可知 $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(n\Omega t) \cdot \sin(m\Omega t) dt = 0$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(n\Omega t) \cdot \cos(m\Omega t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin(n\Omega t) \cdot \sin(m\Omega t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

2. 级数形式

设周期信号 $f(t)$ ，其周期为 T ，角频率 $\Omega=2\pi/T$ ，当满足狄里赫利(Dirichlet)条件时，它可分解为如下三角级数——称为 $f(t)$ 的**傅里叶级数**

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\Omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\Omega t)$$

系数 a_n, b_n 称为**傅里叶系数**

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\Omega t) dt$$

$$b_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \varphi_i(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} \varphi_i^2(t) dt} \sin(n\Omega t) dt$$

可见， a_n 是 n 的偶函数， b_n 是 n 的奇函数。

其他形式

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\Omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\Omega t)$$

将上式同频率项合并，可写为

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

式中， $A_0 = a_0$ $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ $\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$

可见： A_n 是 n 的偶函数， φ_n 是 n 的奇函数。



$$a_n = A_n \cos \varphi_n \quad b_n = -A_n \sin \varphi_n \quad n = 1, 2, \dots$$

上式表明，周期信号可分解为直流和许多余弦分量。

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

- $A_0/2$ 为直流分量
 - $A_1 \cos(\Omega t + \varphi_1)$ 称为基波或一次谐波，其角频率与原周期信号相同
 - $A_2 \cos(2\Omega t + \varphi_2)$ 称为二次谐波，其频率是基波的2倍
- 一般而言， $A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$ 称为 n 次谐波。

视频解释



二、傅里叶级数的指数形式

三角形式的傅里叶级数，含义比较明确，但运算常感不便，因而经常采用指数形式的傅里叶级数。

虚指数函数集 $\{e^{jn\Omega t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$

系数 F_n 称为复傅里叶系数

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

推导

利用 $\cos x = (e^{jx} + e^{-jx})/2$ 可从三角形式推出：

傅里叶系数之间关系

$$F_n = |F_n| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2} (a_n - j b_n)$$

$$|F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} A_n \quad a_n = A_n \cos \varphi_n$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right) \quad b_n = -A_n \sin \varphi_n$$

n 的偶函数: a_n , A_n , $|F_n|$

n 的奇函数: b_n , φ_n

三、奇、偶函数的傅里叶系数

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\Omega t) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\Omega t) dt$$

1. $f(t)$ 为偶函数——对称纵坐标

$$f(t) = f(-t)$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\Omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\Omega t)$$

$b_n=0$ ，展开为余弦级数。

2. $f(t)$ 为奇函数——对称于原点


$$f(t) = -f(-t)$$

$a_n=0$ ，展开为正弦级数。

3. $f(t)$ 为奇谐函数—— $f(t) = -f(t \pm T/2)$

此时 其傅里叶级数中
只含奇次谐波分量，而
不含偶次谐波分量即

$$a_0 = a_2 = \dots = b_2 = b_4 = \dots = 0$$



例

4. $f(t)$ 为偶谐函数—— $f(t) = f(t \pm T/2)$

此时 其傅里叶级数中
只含偶次谐波分量，而
不含奇次谐波分量即

$$a_1 = a_3 = \dots = b_1 = b_3 = \dots = 0$$

