

## Семинар 1. Основные идеи

Этот семинар посвящен описанию основных идей статистической физики: эргодической гипотезе, термодинамическому пределу, ансамблям и понятию энтропии. Изложение дополняется примерами в виде задач, решение которых приводится в тексте.

### 1.1 Эргодичность в классических системах

Рассмотрим классическую систему, состоящую из  $N$  частиц с гамильтонианом  $H$ . Пусть  $q = (q_1^n, \dots, q_N^n)^T$  и  $p = (p_1^n, \dots, p_N^n)$  вектора координат и импульсов системы из  $N$  частиц, каждая из которых имеет  $n$  степеней свободы. Тогда мы можем написать уравнения движения на  $q$  &  $p$ ,

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}. \quad (1.1)$$

*Фазовым пространством*  $\Gamma$  называется пространство размерности  $\dim \Gamma = 2nN$ , состоящие из всех возможных комбинаций координат и импульсов.

Предположим, что нас интересует некоторая величина  $M$ , которая описывает свойство нашей системы, т.н. *термодинамическая наблюдаемая*. Очевидно, что величина  $M$  зависит от координат и импульсов частиц системы. Эта величина может быть описана функцией  $M : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ . Выберем точку  $\zeta_0 = (q(t_0), p(t_0)) \in \Gamma$  в качестве начального условия, т.е. *микросостояния* при  $t = t_0$ . Множество точек  $O_{\zeta_0} = \{\zeta(t) : t \in \mathbb{R}^+, \zeta(t_0) = \zeta_0\}$  называется *орбитой*  $\zeta_0$  в фазовом пространстве  $\Gamma$ . Мы полагаем, что множества  $O_{\zeta_0}$  являются компактными.

Уравнения движения, т.е. гамильтонов поток  $T^t$  генерирует *единственное* решение,

$$\zeta(t) = T^t \zeta_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^+. \quad (1.2)$$

В произвольный момент времени  $t$  мы имеем значение наблюдаемой  $M(\zeta(t))$ . В большинстве физических систем нас интересует не мгновенное значение, а усредненное по времени значение,

$$\frac{1}{t} \int_{t_0}^{t_0+t} ds M(T^s \zeta_0), \quad (1.3)$$

где  $t$  есть длительность наблюдения, а  $t_0$  начальное время. Обычно подразумевается, что время наблюдения очень большое, поэтому мы определим величину  $\overline{M}$  как следующий предел,

$$\overline{M} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_0}^{t_0+t} ds M(T^s \zeta_0). \quad (1.4)$$

Предел  $\overline{M}$  не зависит от  $t_0$ . Действительно, можно показать что если  $M$  является интегрируемой функцией, то вместо  $t_0$  можно взять другое значение  $t_1$  и написать

$$\int_{t_1}^{t_1+t} ds M(T^s \zeta) = \int_{t_1}^{t_0} ds M(T^s \zeta) + \int_{t_0}^{t_0+t} ds M(T^s \zeta) + \int_{t_0+t}^{t_1+t} ds M(T^s \zeta). \quad (1.5)$$

Первый и третий интегралы в правой части полученного равенства ограничены. Деля обе части равенства на  $t$  и переходя к пределу  $t \rightarrow \infty$ , получаем

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_1}^{t_1+t} ds M(T^s \zeta) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_1}^{t_0} ds M(T^s \zeta) + \\ &+ \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_0}^{t_0+t} ds M(T^s \zeta) + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_0+t}^{t_1+t} ds M(T^s \zeta), \end{aligned} \quad (1.6)$$

где первый и третий члены дают нулевой вклад и в итоге вновь получаем  $\overline{M}$ .

Введем также другую среднюю величину  $\langle M \rangle$ ,

$$\langle M \rangle = \int_{\Gamma} d\zeta M(\zeta), \quad (1.7)$$

т.е. это есть среднее по фазовому пространству  $\Gamma$ . Ничто не ограничивает нас в выборе  $M$ , потому мы можем взять  $M \equiv 1$ , что приводит к соотношению

$$\int_{\Gamma} d\zeta = 1, \quad (1.8)$$

а это значит что меру  $d\zeta$  можно представить в виде  $\mathcal{N} dp dq$ , где  $\mathcal{N}$  есть константа нормировки. *Эргодическая гипотеза* состоит в том, что мы ожидаем равенства двух средних, т.е.  $\overline{M} = \langle M \rangle$ .

#### Гипотеза 1.1: Эргодическая гипотеза

Для многочастичной ( $N \gg 1$ ) классической системы с гамильтонианом  $H = H(q, p)$  в фазовом пространстве  $\Gamma$  существует вероятностная мера  $\rho = \rho(p, q)$ , для которой выполняется равенство

$$\overline{M} = \langle M \rangle,$$

где

$$\overline{M} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_{t_0}^{t_0+t} ds M(T^s \zeta_0), \quad \langle M \rangle = \int dp dq M(p, q) \rho(p, q).$$

Закономерным образом возникают следующие вопросы:

1. При каких условиях существует предел  $\overline{M}$ , см. (1.4)?
2. Можно ли доказать равенство  $\overline{M} = \langle M \rangle$ ?

Эти вопросы имеют непосредственное отношение к тому как можно описать *макроскопическое* равновесие *микроскопически*. Всеми этими вопросами занимается *эргодическая теория*. Эргодическая теория изучает отображения динамических систем вида  $\tau^t : \Omega \rightarrow \Omega$ , где  $\tau^t$  есть некоторая динамическая система и  $t \in \mathbb{R}$ . Это отображение описывает эволюцию элементов  $\omega \in \Omega$  со временем. При этом, при  $t = 0$  считается известным  $\tau^0(\omega) = \omega$  и имеет место правило  $\tau^{s+t} = \tau^s \tau^t$ . *Инвариантной мерой* в эргодической теории называется такая мера, что  $\mu(\tau^t(A)) = \mu(A)$ ,  $\forall t$ , где  $A \in \mathcal{A}$  и  $\mathcal{A}$  есть  $\sigma$ -алгебра подмножеств  $\Omega$ . Если  $\mu$  является инвариантной мерой  $\tau^t$ , то для любой интегрируемой функции  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  имеет место

$$\int_{\Omega} d\mu(\omega) f(\tau^t \omega) = \int_{\Omega} d\mu(\tau^{-t} \omega) f(\omega) = \int_{\Omega} d\mu(\omega) f(\omega), \quad \forall t. \quad (1.9)$$

Это означает, что “пространственное” среднее не зависит от времени, что соответствует макроскопическому равновесию. Такое рассуждение позволяет нам дать ответ: макроскопическое равновесие описывается инвариантными мерами отображения  $\tau^t$  некоторой системы. Дальнейшие приключения с эргодической теорией приводят к следующей теореме,

#### Теорема 1.1: (Биркгофа-Хинчина) об инвариантной мере

Пусть  $\mu$  есть инвариантная мера для потока  $\tau^t$ . Если функция  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  является интегрируемой, то

1. Почти всюду существует предел

$$\overline{f}(\omega) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t ds f(\tau^s \omega)$$

и функция  $\overline{f}(\omega)$  является интегрируемой

2.  $\overline{f}(\tau^t \omega) = \overline{f}(\omega)$  почти всюду, при этом  $\overline{f}$  постоянна вдоль орбит
- 3.

$$\int_{\Omega} d\mu(\omega) \overline{f}(\omega) = \int_{\Omega} d\mu(\omega) f(\omega).$$

Следствием теоремы Биркгофа-Хинчина является факт, что для Гамильтонова потока  $T^t$  *микрoканонический ансамбль* (т.е. описание в терминах микросостояний) есть инвариантная мера.

## 1.2 Свойства функции распределения

Поскольку число частиц в системе не меняется, то вероятность должна сохраняться. Тогда имеет место уравнение непрерывности на  $\rho = \rho(p, q)$  в фазовом пространстве, которое является следствием следующего факта,

**Теорема 1.2: (Лиувилля) о сохранении фазового объема**

Функция распределения  $\rho = \rho(p, q)$  постоянна вдоль любой траектории в фазовом пространстве, то есть  $d\rho/dt = 0$  или в ином виде

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0.$$

▷ Выделим в фазовом пространстве область  $\omega \subset \Gamma$ .

$$-\int_{\omega} d\Gamma \rho = \int_{\partial\omega} d\mathbf{S} \cdot (\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}})^T \rho(p, q). \quad (1.10)$$

Интеграл по границе можно представить в виде интеграла по объему с помощью теоремы Гаусса,

$$\int_{\partial\omega} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{p}, \mathbf{q})^T \rho(p, q) = \int_{\omega} d\Gamma (\nabla_p, \nabla_q)^T \cdot (\dot{\mathbf{p}}\rho, \dot{\mathbf{q}}\rho) \quad (1.11)$$

Поскольку мы вправе выбрать любую область  $\omega$ , значит равенство верно если

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \left( \frac{\partial}{\partial p} (\dot{p}\rho) + \frac{\partial}{\partial q} (\dot{q}\rho) \right), \quad (1.12)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \left( \frac{\partial \rho}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial \rho}{\partial q} \dot{q} \right) = - \left( \frac{\partial \rho}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} - \frac{\partial \rho}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} \right) = - \{\rho, H\}, \quad (1.13)$$

где после второго знака равенства мы воспользовались уравнениями Гамильтона,  $\dot{q} = \partial H / \partial p$ ,  $\dot{p} = -\partial H / \partial q$ .  $\square$

Важное следствие из этой теоремы: для систем в состоянии равновесия выполняется  $\{\rho, H\} = 0$ , то есть функция распределения является интегралом движения. Убедимся в этом, показав что логарифм функции распределения является аддитивным интегралом движения. Для этого рассмотрим две независимые подсистемы, мы можем написать (т.к. функция распределения является плотностью вероятности) что

$$\rho^{12} dq^1 dp^1 dq^2 dp^2 = (\rho^1 dq^1 dp^1)(\rho^2 dq^2 dp^2), \quad (1.14)$$

откуда следует  $\ln \rho^{12} = \ln \rho^1 + \ln \rho^2$ . Значит  $\ln \rho$  является аддитивным интегралом движения и  $\ln \rho$  можно представить в виде

$$\ln \rho(p, q) = \alpha + \beta E(p, q) + \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{P}(p, q) + \boldsymbol{\delta} \cdot \mathbf{M}(p, q), \quad (1.15)$$

где  $E$ ,  $\mathbf{P}$ ,  $\mathbf{M}$  есть энергия, импульс и угловой момент системы как целого, а  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  есть некоторые константы, которые частично можно определить из условия нормировки.

### 1.3 Энтропия как функционал вероятностной меры

Поскольку  $\rho = \rho(p, q)$  является PDF, то мы можем ввести энтропию этой вероятностной меры,

$$S[\rho] = - \int dq dp \rho(p, q) \ln \rho(p, q). \quad (1.16)$$

Мы знаем (или принимаем на веру), что энтропия в состоянии равновесия максимальна, поэтому вариация функционала должна обращаться в ноль,  $\delta S = 0$  и  $\delta^2 S < 0$ ,

$$\delta S = \int dq dp \delta \rho(p, q) \{-\ln \rho(p, q) + 1\} = 0, \quad (1.17)$$

откуда  $\rho(p, q) = e^{-1}$ . Результат очевидно не верен и это связано с тем, что нужно искать условный экстремум функционала. Мы должны наложить связи-ограничения, среди которых самое важное что должно быть

$$\int dp dq \rho(p, q) = 1. \quad (1.18)$$

В силу консервативности гамильтоновых систем, мы также должны наложить сохранение энергии,

$$\int dp dq \rho(p, q) H(p, q) = E, \quad (1.19)$$

и уместно потребовать сохранение числа частиц. Записав вариацию с учетом связей, мы приходим к выражению для энтропии *микроканонического ансамбля*.

### 1.4 Микроканонический ансамбль

Рассмотрим систему, у которой число частиц  $N$ , объем  $V$  и энергия системы  $E$  фиксирована. Такая система описывается *микроканоническим* ансамблем. А priori постулируется, что

$$\rho_{\text{micro}}(p, q) = \frac{1}{N!(2\pi\hbar)^3} \begin{cases} 1, & E < H(p, q) < E + \Delta E, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \quad (1.20)$$

где  $\Delta E$  есть толщина слоя в фазовом пространстве. Можно (безопасно) выбрать  $E/N \ll \Delta E \ll E$ , что гарантирует нам наличие большого числа состояний в этом тонком слое, но при этом слой все еще остается очень тонким. Для квантовой

системы можно считать, что  $\Delta E$  порядка расстояния между уровнями энергиями. Множитель  $N!$  разрешает *парадокс Гиббса*, который мы обсудим позже. По существу, выражение (1.20) говорит нам лишь то, что все микросостояния (которые характеризуются конкретным выбором импульсов и координат с учетом ограничения энергии) системы эквивалентны. Формулу (1.20) можно записать в ином виде,

$$\rho_{\text{micro}} = \omega(E) \delta(E - H(p, q)), \quad (1.21)$$

где введена величина  $\omega(E) = \partial \Sigma(E) / \partial E$ , которая называется *плотностью состояний* (density of states, DoS).

Однако данная формула не похожа на ту, что мы вывели из экстремальности энтропии. В этой формуле мы считаем число состояний в тонком слое, а до этого мы считали полное число состояний в фазовом пространстве. Это связано с тем, что при  $N \gg 1$  нет разницы между тонким слоем и полным числом состояний. Мы убедимся в этом позже. Предел  $N \rightarrow \infty$  играет решающую роль в статистической физике. Обычно предел

$$N \rightarrow \infty, \quad V \rightarrow \infty, \quad \frac{N}{V} = \text{const} \quad (1.22)$$

называют *термодинамическим пределом*.

Отметим, что в термодинамике энтропия определяется как  $S = \ln \Sigma(E)$ , т.е. число всех возможных состояний, лежащих в интервале энергий  $[0, E]$ , в то время как для микроканонического ансамбля мы получаем  $S = \ln \Delta \Gamma(E)$ .

## 1.5 Примеры вычислений

Рассмотрим несколько примеров вычислений термодинамических величин в микроканоническом ансамбле.

### Задача 1: Формула Стирлинга

Вывести формулу Стирлинга методом перевала.

▷ Заметим, что  $(n-1)! = \Gamma(n)$ , значит  $\Gamma(n+1) = n!$ . Интегральное представление  $\Gamma$ -функции есть

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty dt \exp\{-t + n \ln t\}. \quad (1.23)$$

Напомним как устроен метод перевала. Пусть имеется интеграл

$$I = \int_a^b dx \exp\{f(x)\}, \quad (1.24)$$

причем функция  $f(x)$  достигает своего максимума в точке  $c \in [a, b]$ . Тогда, если функция  $f(x)$  очень большая, то окажется что интеграл набирается в

окрестности точки  $c$ . Действительно, для  $f(x)$  имеем следующее разложение в ряд Тейлора вблизи точки  $c$ ,

$$f(x) \approx f(c) + \frac{f''(c)}{2}(x-c)^2, \quad f''(c) < 0. \quad (1.25)$$

Мы можем расширить область интегрирования,  $[a, b] \rightarrow [-\infty, +\infty]$ . Тогда для интеграла  $I$  будем иметь следующий приближенный ответ,

$$I \approx e^{f(c)} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp \left\{ -\frac{f''(c)}{2}(x-c)^2 \right\} = \sqrt{\frac{2\pi}{-f''(c)}} e^{f(c)}. \quad (1.26)$$

Воспользуемся этим для  $\Gamma$ -функции. В нашем случае

$$f'(t) = -1 + \frac{n}{t}, \quad f''(t) = -\frac{n}{t^2} \rightarrow t_0 = n, \quad f(t_0) = -n + n \ln n, \quad f''(t_0) = -\frac{1}{n}. \quad (1.27)$$

Значит для интеграла получаем

$$\Gamma(n+1) \approx \sqrt{2\pi n} e^{-n+\ln n} = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}. \quad (1.28)$$

Полезно записать также формулу Стирлинга в ином виде,

$$\ln n! = \ln \Gamma(n+1) \approx n \ln n - n + \mathcal{O}(n), \quad (1.29)$$

т.к.  $\ln(\sqrt{2\pi n}) \sim \ln n \sim \mathcal{O}(n)$  и в сравнении с первыми двумя вкладками в пределе  $n \rightarrow \infty$  этим слагаемым можно пренебречь.  $\square$

### Задача 2: Энтропия идеального газа

В 3D пространстве  $N \gg 1$  атомов идеального газа находятся в фиксированном объеме  $V$  и обладают суммарной фиксированной энергией  $E$ . Вычислить число состояний  $\Sigma(E)$  под энергетической поверхностью  $H(p, q) = E$ , сравнить с числом состояний  $\Delta\Gamma(E)$  в тонком слое толщины  $\Delta E$  в термодинамическом пределе. Найти температуру и теплоемкость системы.

▷ Число состояний в фазовом пространстве под поверхностью  $H(p, q) = E$  дается выражением

$$\Sigma(E) = \frac{1}{N!} \prod_{i=1}^N \int \frac{d^3 q_i d^3 p_i}{(2\pi\hbar)^3} \theta \left[ E - \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \right]. \quad (1.30)$$

Интегрирование по координате тривиально и дает просто  $V^N$ . Интегрирование по импульсу сложнее: нам надо вычислить объем  $3N$ -мерной сферы. Действительно, вводя переменную  $P = \sqrt{2mE}$ , мы сводим задачу к вычислению объема  $3N$ -мерной сферы радиуса  $P$ .

Отвлечемся от задачи и сделаем вспомогательное вычисление: найдем объем  $d$ -мерного шара радиуса  $R_0$ . Вместо того, чтобы проводить вычисление в сферических координатах, мы рассмотрим Гауссов интеграл следующего вида

$$\prod_{i=1}^d \int dx_i e^{-\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \left( \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} \right)^d = (\pi)^{d/2}. \quad (1.31)$$

С другой стороны, мы можем переписать этот интеграл как

$$\prod_{i=1}^d \int dx_i e^{-\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \int dS_d \int_0^\infty dR R^{d-1} e^{-R^2}, \quad (1.32)$$

где  $dS_d$  элемент телесного угла в  $d$ -мерном пространстве. Интеграл по радиальной координате выражается через  $\Gamma$ -функцию,

$$\int_0^\infty dR R^{d-1} e^{-R^2} = \frac{1}{2} \int_0^\infty d(R^2) (R^2)^{(d-1)/2} e^{-R^2} = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{d}{2}\right). \quad (1.33)$$

С учетом (1.31), мы можем выразить интеграл по телесному углу как

$$S_d = \int dS_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}, \quad (1.34)$$

что представляет собой площадь поверхности  $d$ -мерной сферы. Теперь мы можем легко вычислить объем  $d$ -мерного шара радиуса  $R_0$ ,

$$V_d(R_0) = S_d \int_0^{R_0} dR R^{d-1} = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \cdot \frac{R_0^d}{d} = \frac{\pi^{d/2} R_0^d}{\Gamma(d/2 + 1)}. \quad (1.35)$$

Применяя полученный результат для нашей задачи, мы находим

$$\Sigma(E) = \frac{V^N}{(2\pi\hbar)^{3N} N!} \frac{(2\pi m E)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)}. \quad (1.36)$$

Вычислим  $\ln \Sigma(E)$ , пользуясь формулой Стирлинга. Представим логарифм как

$$\ln \Sigma(E) = N \ln \left\{ \frac{V(2\pi m E)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \right\} - \ln(N!) - \ln((3N/2)!), \quad (1.37)$$

и применим формулу Стирлинга,

$$\ln(N!) \approx N \ln\left(\frac{N}{e}\right) + \frac{1}{2} \ln N + \frac{1}{2} \ln 2\pi. \quad (1.38)$$

Для третьего слагаемого аналогично. Сгруппировав слагаемые, получим

$$\ln \Sigma(E) \approx N \ln \left\{ \frac{V e (2\pi m E)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3 N} \left(\frac{2e}{3N}\right)^{3/2} \right\} + C \ln N, \quad (1.39)$$



где  $C = \mathcal{O}(1)$ . Последнее слагаемое можно выкинуть в пределе  $N \rightarrow \infty$ . В аргументе логарифма выделим  $e^{5/2}$ , тогда окончательно,

$$\ln \Sigma(E) \approx N \ln \left\{ \frac{V}{(2\pi\hbar)^3 N} \left( \frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right\} + \frac{5N}{2}. \quad (1.40)$$

Эта формула называется *уравнением Сакура-Тетрода*. Сравним теперь число состояний в интервале энергий  $[0, E]$ , т.е.  $\Sigma(E)$  с числом состояний в тонком слое вблизи  $E$ , которое мы обозначим  $\Delta\Gamma(E)$ . Пусть  $S = \ln \Sigma(E)$  и  $S^* = \ln \Delta\Gamma(E)$ . Найдем связь между  $\Delta\Gamma(E)$  и  $\Sigma(E)$ :

$$\ln \Delta\Gamma(E) = \ln \left\{ \frac{d\Sigma}{dE} \Delta E \right\} = \ln \left\{ e^S \frac{dS}{dE} \Delta E \right\} = S + \ln \left\{ \frac{dS}{dE} \Delta E \right\}. \quad (1.41)$$

В этом выражении первый член  $\sim N$ , а второй  $\sim \ln N$ . Значит, мы имеем

$$S^* = S + \mathcal{O}(\ln N). \quad (1.42)$$

#### Замечание 1.1

В термодинамическом пределе  $N \rightarrow \infty$  энтропии  $S = \ln \Sigma(E)$  и  $S^* = \ln \Delta\Gamma(E)$  совпадают с точностью  $\mathcal{O}(\ln N)$ . Это связано с тем, что в пространстве очень большой размерности почти весь объем многомерного шара набирается в очень узкой области. Поскольку  $\Delta\Gamma(E)$  считать существенно проще, будем пользоваться этим фактом.

Найдем теперь температуру и теплоемкость системы, зная их связь с энтропией. Для температуры получаем

$$T = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1} = \frac{2E}{3N}, \quad (1.43)$$

откуда следует  $E = 3NT/2$ . Для теплоемкости находим

$$C(T) = T \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{3N}{2}. \quad \square \quad (1.44)$$

1. Эргодическая гипотеза играет важную роль в статистической механике, связывая микроскопическую динамику с макроскопическими величинами. Имеются математические строгие доказательства некоторых версий эргодической гипотезы, среди которых выделяется теорема Биркгофа-Хинчина.
2. Эргодическая гипотеза утверждает о существовании в фазовом пространстве функции распределения  $\rho = \rho(p, q)$ , которая является вероятностной мерой. Помимо существования, эргодическая гипотеза утверждает что средние по этой функции распределения будут совпадать с временными средними.
3. Для функции распределения  $\rho = \rho(p, q)$  справедлива теорема Лиувилля о сохранении фазового объема, в стационарном случае  $\rho$  является интегралом движения, т.е.  $\{\rho, H\} = 0$ . Более того,  $\ln \rho$  является аддитивным интегралом движения.
4. Для микроканонического ансамбля, т.е. ситуации когда  $(E, V, N) = \text{fix}$ , постулируется, что все микросостояния  $(p, q)$ , лежащие на поверхности  $H(p, q) = E$  равновероятны, что позволяет определить функцию  $\rho_{\text{mic}}(p, q)$
5. В термодинамическом пределе выражения  $S(E) = \ln \Sigma(E)$  (энтропия как логарифм числа состояний, ограниченных поверхностью  $H(p, q) = E$  в фазовом пространстве) и  $S(E) = \ln \Delta(\Gamma)$  (логарифм числа состояний, лежащих в тонком слое толщины  $\Delta E$ ,  $E/N \ll \Delta E \ll E$ , вблизи поверхности  $H(p, q) = E$ ) отличаются на  $\mathcal{O}(\ln N)$ .
6. Для систем, энергетический спектр которых ограничен сверху, возможна отрицательная температура. Это называется инверсной заселенностью, т.е. ситуации когда более высокие по энергии уровни заселены больше, чем нижние.