

UE7B :

Santé Société Humanité
Module Santé Publique

Annales Classées Corrigées

Santé publique : les cancers

SUJET

2019

QCM 16. La prévalence des cancers en France

- A. La prévalence totale des cancers en 2017 est représentée par le nombre de nouveaux cas de cancer en 2017.
- B. La prévalence totale des cancers en 2017 est représentée par le nombre de total de cas de cancer en 2017.
- C. La prévalence est en hausse consécutivement à l'augmentation du nombre de nouveaux cas et à l'amélioration de la survie.
- D. Le risque de second cancer dans cette population n'est pas connu.
- E. Le risque de second cancer est augmenté dans cette population, en moyenne, de 80% par rapport au risque de cancer de la population générale.

QCM 17. Les tendances des cancers en France depuis ces dernières années

- A. Pour l'ensemble des cancers, les évolutions au cours du temps de l'incidence et de la mortalité sont différentes.
- B. Il existe une augmentation du taux d'incidence et une baisse du taux de mortalité.
- C. Les cancers les plus agressifs ont une incidence qui chute ces dernières années.
- D. Les cancers de pronostic plus favorable sont en augmentation d'incidence.
- E. Un exemple de cancers de bon pronostic dont le taux d'incidence a augmenté ces dernières années sont les cancers de l'estomac.

QCM 18. Selon un rapport récent pour la France, pour les facteurs de risque et les cancers

- A. Parmi les nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en 2015, 142.000 seraient attribuables aux facteurs de risque étudiés dans ce rapport.
- B. Cela représente 20% de tous les nouveaux cas de cancer.
- C. Ces nombres sont estimés à partir du calcul de la fraction attribuable qui est la proportion des cancers attribuables à l'exposition à un facteur de risque.
- D. Le tabac était responsable du plus grand nombre de cas de cancers.
- E. Parmi les facteurs responsables d'un très grand nombre de cas de cancers, on peut citer la pollution de l'air.

2018**QCM 19. Incidence des cancers en France**

- A. L'incidence peut être définie par le nombre de nouveaux cas de cancers
- B. L'incidence mesure le risque de cancer
- C. L'incidence des cancers augmente en France pour tous les cancers
- D. L'incidence du cancer de l'estomac a augmenté de façon importante ces dernières années
- E. L'incidence se définit aussi par un taux qui peut être standardisé pour comparer les taux dans le temps

QCM 20. Mortalité des cancers

- A. La mortalité peut être définie par le nombre de cas de cancers
- B. Il s'agit des décès imputables aux cancers
- C. La mortalité des cancers diminue en France pour tous les cancers
- D. La mortalité des cancers de l'enfant a diminué en France de façon importante ces dernières années
- E. La mortalité se définit aussi par un taux qui peut être standardisé pour comparer les taux dans des pays différents

QCM 21. Déterminants des Cancers

- A. Consommer de l'alcool augmente faiblement le risque de cancer
- B. La consommation d'alcool est en nette diminution en France depuis les années 60
- C. La France est parmi les pays ayant la consommation d'alcool la plus faible en Europe
- D. Quelle que soit la dose d'alcool, le risque de certains cancers est augmenté
- E. Plus on consomme de l'alcool et plus le risque de certains cancers est augmenté

2017**QCM 22. En France, le(s) cancer(s) suivant(s)**

- A. Sont fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) : le cancer du sein (femme), le cancer de la sphère ORL (chez l'homme) et le cancer de l'estomac
- B. Sont fréquents et découverts à un âge élevé (relativement à la moyenne) : le cancer de la prostate (homme) et le cancer colorectal
- C. Est fréquent et découvert à un âge jeune (relativement à la moyenne) : le cancer de la thyroïde
- D. Est fréquent et découvert à un âge élevé (relativement à la moyenne) : le cancer du pancréas
- E. Sans tenir compte de l'âge et quel que soit le sexe, le cancer le plus fréquent est le cancer du poumon

QCM 23. Les variations des taux de cancers en France métropolitaine

- A. L'incidence et la mortalité par cancer présentent une variabilité marquée entre les régions
- B. Globalement, la situation est plus favorable dans le Sud par rapport aux régions du Nord.
- C. Globalement, la situation est plus favorable dans le Nord par rapport aux régions du Sud.
- D. Les variations géographiques de l'incidence sont plus marquées chez les hommes que chez les femmes
- E. Les variations géographiques de l'incidence sont plus marquées chez les femmes que chez les hommes

QCM 24. La nutrition et les cancers

- A. La nutrition est source de facteurs de risque et de facteurs protecteurs pour l'apparition de cancers
- B. La nutrition fait partie des facteurs comportementaux sur lesquels il est possible d'agir en prévention
- C. L'activité physique est un facteur protecteur de l'apparition de cancers
- D. La consommation de viande est un facteur protecteur de l'apparition de cancers
- E. La consommation de produits laitiers réduit le risque de cancer

2016

QCM 20. Les sources de données sur les cancers en France :

- A- Le nombre de nouveaux cas de cancer est connu car le cancer est une maladie à déclaration obligatoire
- B- Pour les enfants atteints de cancers, il existe un registre national c'est-à-dire un enregistrement des cas de cancers à visée exhaustive au niveau national
- C- Pour les adultes, il existe des registres par départements (c'est-à-dire un enregistrement des cas de cancers, à visée exhaustive, à l'échelle du département)
- D- Pour les adultes, ces registres départementaux existent pour l'enregistrement des cas de cancers dans plus de 50% des départements en France
- E- Pour connaître les décès et les décès par cancer, les données utilisent celles des certificats de décès qui sont centralisés au Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès

QCM 21. Tabac et cancers :

- A- Le tabagisme est la principale cause mondiale de décès évitables
- B- 50 % des cancers du poulmon sont imputables au tabac
- C- Le tabac n'est pas à l'origine d'un risque accru de cancer pour d'autres cancers que le cancer du poulmon
- D- Les données les plus récentes montrent une augmentation de la prévalence du tabagisme quotidien en France
- E- De nombreux dispositifs nationaux légaux (lois, réglementations...) ont été mis en place mais depuis 2012, il n'existe aucune nouvelle loi ou réglementation pour inciter la population à réduire sa consommation de tabac

2015

QCM 22. Les cancers dans le monde en 2018

- A- Le fardeau mondial du cancer a augmenté mais ce fardeau devrait diminuer au cours des vingt prochaines années.
- B- Dans les vingt prochaines années, le nombre de décès par cancer devrait augmenter.
- C- Globalement, les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont ceux du poumon, du sein et du côlon-rectum.
- D- Le cancer colorectal est la cause la plus fréquente de décès par cancer.
- E- Parmi les causes les plus fréquentes de décès par cancer, on peut citer les cancers du poumon du foie et de l'estomac.

QCM 23. En France, la fréquence des cancers

- A- Les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les cancers du sein pour la femme et le cancer du testicule pour l'homme.
- B- Les cancers fréquents et découverts à un âge élevé (relativement à la moyenne) sont les cancers de la prostate chez l'homme et le cancer du côlon mais uniquement pour l'homme.
- C- Parmi les cancers d'incidence moins élevée et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne), on peut citer les cancers de la thyroïde et les mélanomes.
- D- Parmi les cancers d'incidence moins élevée et découverts à un âge plus élevé (relativement à la moyenne), on peut citer les cancers de la vessie et de l'estomac.
- E- Parmi les cancers découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne), on peut citer les cancers de la sphère ORL et le cancer du col de l'utérus.

QCM 24. Le dépistage des cancers

- A- Le principe d'un dépistage est de détecter en l'absence de symptômes, des lésions susceptibles d'être cancéreuses ou d'évoluer vers un cancer.
- B- Le dépistage permet d'éviter l'apparition d'un cancer.
- C- Il s'agit avec les dépistages de pouvoir détecter plus précocement un cancer, de mieux soigner le patient et de limiter la lourdeur des traitements et des séquelles éventuelles.
- D- Les dépistages permettent uniquement de mieux soigner le patient.
- E- Dans certains cas, le dépistage peut également permettre d'éviter l'apparition d'un cancer : les cancers du pancréas ou les cancers du colon en sont des exemples.

2014**QCM 10. En France, globalement aujourd'hui :**

- A- Le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme sont les cancers les plus fréquents.
- B- Globalement, les personnes âgées sont moins touchées par les cancers.
- C- Les cancers à l'origine du plus grand nombre de décès sont chez les hommes le cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer de la vessie.
- D- Les cancers à l'origine du plus grand nombre de décès chez les femmes sont le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus.
- E- La médiane d'âge de survenue d'un cancer est l'âge pour lequel la moitié des cas de cancer est plus jeune et l'autre moitié plus âgée

QCM 11. Au niveau de la France métropolitaine, aujourd'hui :

- A- L'incidence par cancer présente une variabilité marquée entre les régions.
- B- La mortalité par cancer présente une variabilité marquée entre les régions.
- C- L'incidence des cancers est plus grande dans le Nord de la France par rapport aux régions du Sud.
- D- Les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes.
- E- L'incidence des cancers les plus agressifs diminue, comme par exemple le cancer de l'œsophage.

QCM 12. Alcool et cancers en France

- A- La consommation d'alcool en France est en diminution depuis les années 1960.
- B- La consommation d'alcool en France est en diminution depuis les années 2000.
- C- La consommation d'alcool est l'une des plus élevées d'Europe.
- D- Il n'y a pas de relation dose-effet établie pour le lien alcool et cancers : quelle que soit la dose, le risque de cancer est constant, il n'augmente pas.
- E- L'alcool représente la 1^{ère} cause de mortalité par cancer évitable devant le tabac.

2013**QCM 4. Mortalité et incidence des cancers en France**

- A- La mortalité par cancer est le taux de décès dans la population des patients atteints de cancer
- B- La description de la situation de la mortalité par cancer et de l'évolution de la mortalité par cancer est faite à partir des taux standardisés sur l'âge
- C- Le taux standardisé sur l'âge est le taux que l'on observerait dans la population (région ou pays) étudiée si celle-ci avait la même structure d'âge qu'une population de référence (par exemple : population France, Europe, ou Monde)
- D- Les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les suivants : cancers du sein, du poumon, de la prostate
- E- Les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les suivants : cancers du sein, colorectal et de la sphère ORL

QCM 5. Cancer en France métropolitaine et ailleurs

- A- Au niveau de la France métropolitaine, l'incidence et la mortalité par cancer présentent une variabilité marquée entre les régions
- B- Globalement, en France métropolitaine, la situation est plus favorable dans le Sud par rapport aux régions du Nord
- C- Les variations géographiques de l'incidence sont plus marquées chez les hommes que chez les femmes mais uniquement dans les pays émergents
- D- Schématiquement, la situation (évolution de l'incidence et de la mortalité) en France et dans les pays émergents est la même
- E- Schématiquement, la situation (évolution de l'incidence et de la mortalité) en France est très différente de celle des pays émergents : l'incidence augmente en France alors qu'elle est stable dans les pays émergents

QCM 6. Prévention, dépistage des cancers

- A- Le tabac, l'alcool et la nutrition font partie des facteurs comportementaux évitables sur lesquels il est possible d'agir pour accroître la prévention des cancers
- B- Environ 40% des nouveaux cas de cancers seraient évitables, le principal facteur étant l'alcool
- C- D'autres facteurs sont à l'origine des cancers ou contribuent à leur développement : agents infectieux, expositions liées aux milieux de vie et de travail
- D- Le dépistage ne peut être réalisé que dans le cadre d'un programme organisé par les autorités de santé publique
- E- Les seuls dépistages organisés en France sur l'ensemble du territoire sont ceux pour le cancer du sein et le cancer de la prostate

2012**QCM 13. Fréquence des cancers**

- A- Les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les cancers du sein, du poumon, de la sphère ORL
- B- Les cancers fréquents et découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne) sont les cancers du sein, de l'ovaire et cancer du col de l'utérus
- C- Les cancers fréquents et découverts à un âge élevé (relativement à la moyenne) sont les cancers de la prostate et du côlon
- D- Parmi les cancers d'incidence moins élevée découverts à un âge jeune (relativement à la moyenne), on peut citer les cancers du col de l'utérus, de la thyroïde et les mélanomes
- E- Les cancers d'incidence moins élevée et âge plus élevé (relativement à la moyenne) sont les cancers de la vessie et de l'estomac

QCM 14. Cancer et France métropolitaine

- A- Au niveau de la France métropolitaine, l'incidence et la mortalité par cancer présentent une variabilité marquée entre les régions
- B- Globalement, la situation est plus favorable dans le Sud par rapport aux régions du Nord de la France métropolitaine
- C- Globalement, la situation est plus favorable dans le Nord par rapport aux régions du Sud de la France métropolitaine
- D- Les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes chez les hommes que chez les femmes
- E- Les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes

QCM 15. Alimentation et cancers

- A- La nutrition fait partie des facteurs comportementaux sur lesquels il est possible d'agir pour accroître la prévention
- B- Les facteurs augmentant le risque de cancers sont par exemple : la consommation de boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité, la consommation de viandes rouges et de charcuteries, la consommation de sel et d'aliments salés
- C- Les facteurs augmentant le risque de cancers sont par exemple : la consommation de boissons alcoolisées, la consommation de fruits et légumes, la consommation de sel et d'aliments salés
- D- Les facteurs réduisant le risque de cancers sont par exemple : l'activité physique, la consommation de fruits et légumes et l'allaitement
- E- Les facteurs réduisant le risque de cancers sont par exemple : l'activité physique, la consommation de viandes rouges et l'allaitement

2011

QCM 7. Incidence des cancers en France en 2017

- A- Les trois cancers les plus fréquents chez l'homme sont le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du testicule
- B- Chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du colon-rectum et les leucémies aiguës
- C- Le cancer de la prostate est le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès chez l'homme
- D- Il y a plus de cas incidents de cancers chez l'homme que chez la femme (en nombre par an)
- E- Chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du colon-rectum et le cancer de la thyroïde

QCM 8. Les causes de décès et les cancers en France

- A- Le nombre de morts par cancers est stable en France depuis 1980
- B- En fait, le risque de mortalité par cancer a diminué entre 1980 et 2005
- C- La description de la situation de la mortalité par cancer et de l'évolution de la mortalité par cancer est faite à partir des taux standardisés sur l'âge
- D- Parmi les cancers, le cancer du sein est celui pour lequel on enregistre le plus de décès chez la femme en 2017
- E- Parmi les cancers, le cancer du poumon est celui pour lequel on enregistre le plus de décès chez l'homme en 2017

QCM 9. Les cancers et les facteurs de risques en France

- A- La vente d'alcool chez les plus de 15 ans diminue en France
- B- La consommation d'alcool reste encore l'une des plus élevées d'Europe
- C- Le tabac est la seconde cause de mortalité par cancer évitable
- D- Les infections par les Papillomavirus peuvent être à l'origine de certains cancers de l'oropharynx
- E- Les infections par les Papillomavirus peuvent être à l'origine de certains cancers du col de l'utérus

2010

QCM 7. Incidence des cancers en France en 2017

- A- Les trois cancers les plus fréquents chez l'homme sont le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du colon-rectum
- B- Chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du colon-rectum et le cancer du col de l'utérus
- C- Le cancer de la prostate est le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès chez l'homme
- D- Le cancer du poumon est le 3ème cancer le plus fréquent chez la femme
- E- Chez la femme, les trois cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du colon-rectum et le cancer de la thyroïde

QCM 8. Les causes de décès et les cancers en France

- A- Les cancers sont la première cause de mortalité juste devant les décès par accidents et suicides
- B- Le nombre de morts par cancers augmente en France depuis 1980
- C- Parmi les cancers, le cancer de la prostate est le cancer pour lequel on enregistre le plus de décès chez l'homme en 2017
- D- Le taux standardisés de mortalité par cancers diminue depuis 1980
- E- Parmi les cancers, le cancer du pancréas est le cancer pour lequel on enregistre le plus de décès chez l'homme en 2017

QCM 9. Les cancers et les facteurs de risque en France

- A- L'alcool est la 1^{ère} cause de mortalité par cancer évitable
- B- Le tabac est la première cause de mortalité par cancer évitable
- C- La consommation d'alcool et de tabac continue d'augmenter en France
- D- Les infections par les Papillomavirus sont à l'origine de cancers de l'ovaire
- E- La classification du Centre International sur le Cancer (CIRC) permet de classer les substances cancérigènes en trois catégories