

## UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin et de l'appareil génital

### **Annales Classées Corrigées**

#### Le pelvis :

- Fascias pariétaux
- Périnée
- Anatomie fonctionnelle du bassin

### **CORRIGE**

**2019****QCM 4. (UE8S)**

- A. VRAI
- B. FAUX
- C. FAUX : Les grandes lèvres sont des replis **cutanés** qui délimitent la vulve
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 2. (UE9S)**

- A. FAUX : Son insertion terminale se fait par un tendon robuste sur le **petit** trochanter
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : Il est recouvert par le fascia **iliaca**

**QCM 3. (UE9S)**

- A. FAUX : Le diaphragme pelvien est composé d'un muscle principal, le **muscle élévateur de l'anus**, et d'un muscle accessoire, le **muscle coccygien**
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : Le périnée est situé **au-dessous** du diaphragme pelvien
- E. FAUX : Les limites du périnée sont la symphyse pubienne, les tubérosités ischiatiques, **les branches ischio-pubiennes et l'apex du coccyx**

**QCM 4. (UE9S)**

- A. VRAI
- B. FAUX : Horizontalisation du **sacrum**
- C. FAUX : Angle lombo sacré plus **important**
- D. VRAI
- E. FAUX : Raccourcissement du **bassin**

**QCM 5. (UE9S)**

MédicalSciences - 2 rue François Daunes - 2<sup>ème</sup> étage, 33000 BORDEAUX - Tél : 05 56 01 25 15

- A. FAUX : Lors de l'accouchement, le détroit **inférieur** définit le plan de dégagement de la présentation
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : Le détroit moyen est un plan défini par le bord inférieur de la symphyse pubienne, les **épinés** ischiatiques et passant par S4 ou S5
- E. VRAI

**2018****QCM 4.** (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : le **muscle transverse superficiel** est tendu transversalement de la face interne de la branche ischio-pubienne au centre tendineux du périnée.
- E. FAUX.

**QCM 5.** (UE8S)

- A. FAUX : le détroit pubo-coccygien mesure environ **9,5** centimètres.
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 2.** (UE9S)

- 
- A. **VRAI.**  
B. FAUX : le muscle bulbo-spongieux est un muscle **pair**.  
C. **VRAI.**  
D. FAUX : le diaphragme urogénital a comme **muscles principaux** le **sphincter de l'urètre** et le **muscle transverse profond**.  
E. FAUX : le rectum fait suite au colon sigmoïde en regard de la **vertèbre S3**.
- 

---

**2017**

---

**QCM 24 .** (UE9S)

- A. **VRAI.**  
B. FAUX. L'angle lombosacré se rapproche de **135°-140°** chez l'adulte.  
C. **VRAI.**  
D. **VRAI.**  
E. **VRAI.**

**QCM 25 .** (UE9S)

- A. **VRAI.**  
B. FAUX. Il est défini par le bord inférieur de la symphyse pubienne et les **épinies ischiatiques**.  
C. FAUX. Il passe en général par **S5 ou S4/S5**.  
D. **VRAI.**  
E. **VRAI.**

---

**2016**

---

**QCM 2 :** (UE9S)

- 
- A. FAUX. Elle est **très limitée**.  
B. FAUX. L'angle lombosacré se rapproche de **135-140°** avec la croissance.  
C. **VRAI.**  
D. **VRAI.**  
E. FAUX. Les articulations sacro-iliaques sont **peu** mobiles.
- 

**QCM 3 :** (UE9S)

MédicalSciences - 2 rue François Daunes - 2<sup>ème</sup> étage, 33000 BORDEAUX - Tél : 05 56 01 25 15

- 
- A. **VRAI.**
  - B. **VRAI.**
  - C. FAUX. Il passe en général par **S5 ou S4/S5.**
  - D. FAUX. C'est le **détroit moyen** qui est le niveau zéro de l'engagement.
  - E. **VRAI.**
- 

**2014**

**QCM 7 :**

- A. FAUX. Le fascia iliaca est une lame aponévrotique **résistante.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. Le fascia iliaca sépare nettement le muscle ilio-psoas du **péritoine pariétal postérieur.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2013**

**QCM 2 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Le fascia iliaca est une lame aponévrotique **résistante.**
- C. FAUX. Les épaissements du fascia pelvien convergent vers **l'épine ischiatique.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Le fascia iliaca sépare nettement le muscle ilio-psoas du **péritoine pariétal postérieur.**

**QCM 6 :**

- A. FAUX. Les paracervix s'organisent autour des **vaisseaux vaginaux.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. La partie postérieure de la base vésicale est ouverte et **n'est pas renforcée** avec un risque de prolapsus (descente de l'organe).

**2012****QCM 4**

- A. FAUX. **Clitoris.**
- B. FAUX. **Orifice urétral.**
- C. FAUX. **Vestibule du vagin.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**2011****QCM 4 :**

- A. FAUX. Le fascia iliaca s'insère sur la moitié **latérale** de l'arcade inguinale.
- B. FAUX. Le fascia iliaca est une lame aponévrotique **résistante.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Le fascia iliaca sépare nettement le muscle ilio-psoas du **péritoine pariétal postérieur.**

**QCM 10 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Le périnée est limité latéralement par les branches ischio-pubiennes et les **tubérosités ischiatiques.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

**QCM 11:**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX. Les paracervix s'organisent autour des **vaisseaux vaginaux.**
- E. FAUX. La partie postérieure de la base vésicale est ouverte et **n'est pas renforcée** avec un risque de prolapsus (descente de l'organe).

**2010****QCM 12:**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. Le fascia iliaca sépare nettement le muscle ilio-psoas du **péritoine pariétal postérieur.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Les épaissements du fascia pelvien convergent vers **l'épine ischiatique.**

**QCM 13**

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. **Centre tendineux du périnée.**