

UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin
et de l'appareil génital

Annales Classées Corrigées

Le pelvis : Myologie

CORRIGE

2019**QCM 3. (UE8S)**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : Le muscle piriforme passe au niveau de la grande incisure ischiatique et se termine sur le **grand** trochanter
- E. VRAI

2018**QCM 1. (UE8S)**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : **nerf fémoral.**
- C. FAUX : **tendon commun du psoas iliaque.**
- D. FAUX : **bandelette ilio-pectinée.**
- E. **VRAI.**

QCM 3. (UE8S)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX.
- D. **VRAI.**
- E. FAUX : le muscle ilio-coccygien est **mince** et **parfois aponévrotique.**

2017**QCM 21.**

- A. FAUX. **Muscle iliaque.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

2016

QCM 4 : (UE9S)

- A. FAUX. **Muscle iliaque.**
- B. FAUX. **Nerf fémoral.**
- C. FAUX. **Tendon commun du psoas iliaque.**
- D. FAUX. **Bandelette ilio-pectinée.**
- E. **VRAI.**

2015

QCM 6 :

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

QCM 7 :

- A. FAUX. Le muscle obturateur interne est rotateur **externe** de la cuisse.
- B. FAUX. Le muscle coccygien naît de la face **interne** de l'épine ischiatique.
- C. FAUX. Le muscle pubo-coccygien naît sur la face postérieure du **corps du pubis**, près de la symphyse pubienne.
- D. FAUX. Le muscle élévateur de l'anus est le muscle essentiel du **diaphragme pelvien**.
- E. **VRAI.**

2014**QCM 5 :**

- A. FAUX. **Muscle iliaque.**
- B. FAUX. **Nerf fémoral.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

QCM 6 : MUSCLES DU BASSIN

- A. Le muscle piriforme passe dans la petite incisure ischiatique
- B. La terminaison du muscle obturateur interne passe en arrière de l'articulation coxo-fémorale
- C. Le muscle ilio-coccygien se termine sur le bord supérieur du grand trochanter
- D. Le muscle élévateur de l'anus est aussi appelé diaphragme pelvien
- E. Le muscle pubo-coccygien a principalement une fonction de soutien statique

- A. FAUX. Le muscle piriforme sort du petit bassin à travers la **grande incisure (ou ouverture) ischiatique.**
- B. **VRAI.**
- C. FAUX. Le muscle ilio-coccygien se termine sur les **bords latéraux du coccyx et sur le ligament ano-coccygien.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX. Le muscle pubo-coccygien est essentiellement **dynamique.**

2013**QCM 5 :**

- A. **VRAI.**
- B. FAUX. Le muscle piriforme s'insère sur la **face ventrale (ou pelvienne)** des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} vertèbres sacrées.
- C. FAUX. Le muscle piriforme sort du petit bassin à travers la **grande ouverture ischiatique.**
- D. FAUX. Le tendon du muscle piriforme adhère au tendon de terminaison du muscle jumeau **supérieur.**
- E. **VRAI.**

2012

QCM 5

- A. **VRAI.**
B. FAUX. Le muscle obturateur interne se termine sur la **face interne** (médiale) du grand trochanter.
C. FAUX. Le muscle piriforme est **oblique latéralement en avant et en bas.**
D. **VRAI.**
E. FAUX. Le muscle obturateur interne s'insère sur la quasi-totalité de la face médiale de la **membrane obturatrice.**

2011**QCM 9 :**

- A. FAUX. Le muscle piriforme est un muscle aplati, triangulaire à base **médiale**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX. Son tendon adhère au tendon de terminaison du muscle jumeau **supérieur**.
- E. **VRAI**.

2010**QCM 10 :**

- A. FAUX. **Muscle iliaque**.
- B. FAUX. **Nerf fémoral**.
- C. **VRAI**.
- D. **VRAI**.
- E. **VRAI**.

QCM 11 :

- A. FAUX. Le muscle piriforme sort du petit bassin à travers la **grande ouverture ischiatique**.
- B. **VRAI**.
- C. FAUX. Le muscle ilio-coccygien se termine sur les **bords latéraux du coccyx et sur le ligament ano-coccygien**.
- D. FAUX. Le muscle élévateur de l'anus est le muscle essentiel du **diaphragme pelvien**.
- E. FAUX. Le muscle pubo-coccygien est essentiellement **dynamique**.