Mémoire - Théorie des modèles

lg

Todo list

blabla . . . 4
exemple ci dessous à placer après la def ? ? . . . 5
blabla . . . 6
def : interprétation des formules,modèle . . . 7
prop : formule et plongement, formule et isomorphisme . . . 7
intro sur theoreme de compacité comme pierre angulaire de la théorie des modèles . . . 8
construction de Henkin en annexe ? . . . 8
. . . 9
. . . 9
. . . 9
ajouter des exemples ? . . . 10
A la fin, supprimer les résultats qu'on a au final pas utilisé 10
ajouter des exemples ? . . . 13
redondant avec idéal d'une variété ? a del ? . . . 13
unicite Admise ou pas ? . . . 15
def dans le chap 1 ou pas ? . . . 16
preuve élimination des quantificateurs . . . 16
blabla . . . 17
mettre ce qui sert . . . 18
preuve lien . . . 18
projection . . . 18
Preuve Chevalley . . . 18
lots of blabla . . . 19
blabla . . . 21
preuve Nullstelensatz fort . . . 22

Table des matières

Introduction **3**

1 Rudiments de théorie des modèles **4**
1.1 Structures et théories 4
1.1.1 Langages et structures 4
1.1.2 Formules et modèles 6
1.2 Ensembles définissables,quantificateurs 8
1.3 Théories et axiomes 8
1.4 Le Théorème de Compacité 8
1.5 Complétude, categoricité et test de Vaught 9

2 Corps algébriquement clos **10**
2.1 Propriétés de base 10
2.2 Extensions de corps 13
2.3 Clôture algébrique d'un corps 14
2.4 Théorie des corps algébriquement clos 16
2.5 Ensembles définissables, variétés 17

3 Applications **19**
3.1 Ax-Grothendieck 19
3.2 Nullstellensatz 21

Conclusion **23**

Bibliographie **23**

Introduction

Chapitre 1

Rudiments de théorie des modèles

1.1 Structures et théories

1.1.1 Langages et structures

blabla

L'objectif n'étant pas de faire un cours de logique, on se contente de donner les définitions indispensables pour la suite et de nombreux exemples, le lecteur pressé peut se contenter des exemples et se référer aux définitions en cas de doute sur le vocabulaire utilisé. On suit de près le plan de [Mar02] dans lequel on pourra trouver plus de détails.

Définition 1 (Langage)**.** Un **langage** $\mathcal{L}$ est la donnée de :

(i) Un ensemble $\mathcal{F}$ de **fonctions** et une arité $n_f \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Un ensemble $\mathcal{R}$ de **relations** et une arité $n_R \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un ensemble $\mathcal{C}$ de **constantes**.

Les éléments de ces ensembles sont appelés les **symboles** de $\mathcal{L}$. Rappelons que l'arité d'un symbole est le nombre d'arguments qu'il prend. Par convention, les constantes sont d'arité 0.

Définition 2 (Structure)**.** Une **$\mathcal{L}$-structure** $\mathcal{M}$ est la donnée d'un ensemble non vide M appelé **domaine** et des **interprétations** des symboles de $\mathcal{L}$:

(i) Une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^{n_f} \mapsto M$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Une ensemble $R^{\mathcal{M}} \subset M^{n_R}$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$ pour chaque $c \in \mathcal{C}$.

Notation 1. Dans la suite on notera, sauf mention contraire, les structures avec une lettre majuscule cursive $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{A}, \ldots)$ et leur domaine avec la même lettre majuscule droite $(M, N, A, \ldots)$.

Exemple 1 (Langage des groupes)**.** Si on étudie les groupes, on peut utiliser le langage $\mathcal{L}_{gp} = (\cdot, ^{-1}, e)$ où $\cdot$ est une fonction binaire $^{-1}$ une fonction unaire et e une constante. Une $\mathcal{L}_{gp}$-structure $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}}, ^{-1^{\mathcal{G}}}, e^{\mathcal{G}})$ sera un ensemble G muni d'une opération binaire $\cdot^{\mathcal{G}}$, d'une opération unaire $^{-1^{\mathcal{G}}}$ et d'un élément distingué $e^{\mathcal{G}}$.
Par exemple $(\mathbb{R}, \cdot, ^{-1}, 1)$ est une $\mathcal{L}_{gp}$-structure où on interprète $\cdot$ comme la multiplication usuelle, $^{-1}$ comme l'inversion usuelle et e comme 1.
Il faut faire attention au fait qu'il n'y a pour le moment aucune règle sémantique à vérifier, par exemple $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, s, 0)$ avec $\cdot^{\mathcal{N}} = +$ l'addition usuelle, $^{-1^{\mathcal{N}}} = s$ le successeur et $e^{\mathcal{G}} = 0$ est bien une $\mathcal{L}_{gp}$-structure même si ce n'est évidemment par un groupe.

exemple ci dessous à placer après la def ? ?

Exemple 2 (Langage des anneaux)**.** Il arrive souvent qu'on ne parte pas de zéro mais qu'on rajoute ou enlève des symboles à un langage existant ou alors qu'on augmente ou diminue la taille du domaine. Considérons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$, alors le langage $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$ des groupes notés additivement est un **sous-langage** de $\mathcal{L}_{ring}$ car chaque symbole de $\mathcal{L}_{agp}$ et aussi un symbole de $\mathcal{L}_{ring}$ avec la même arité. On dit aussi que $\mathcal{L}_{ring}$ est une **expansion** de $\mathcal{L}_{agp}$. Si on considère la structure $\mathbb{R}_{ring} = (\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0, 1)$, alors $\mathbb{R}_{agp} = (\mathbb{R}; +, -, 0)$ est une réduction de $\mathbb{R}_{ring}$. Si on change le domaine, on parle de sous-structure et d'extensions, ainsi $\mathbb{Z}_{ring} = (\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0, 1)$ est une **sous-structure** de $\mathbb{R}_{ring}$ et $\mathbb{R}_{ring}$ une **extension** de $\mathbb{Z}_{ring}$.

Définition 3 (Sous-langage, expansion)**.** Soit $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux langages. Si $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$, on dit que $\mathcal{L}$ est un **sous-langage** de $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}'$ une **expansion** de $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{M}'$ une $\mathcal{L}'$-structure, en restreignant l'interprétation donnée par $\mathcal{M}'$ au langage $\mathcal{L}$, on obtient une $\mathcal{L}$-structure notée $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$. On dit que $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$ est une réduction de $\mathcal{M}'$, et $\mathcal{M}'$ une expansion de $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$.

Définition 4. Plongement, sous-structure, extension Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ des $\mathcal{L}$-structures, un $\mathcal{L}$-plongement $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ (ou simplement **plongement**) est une fonction injective $\eta : M \to N$ qui préserve les interprétations de tous les symboles de $\mathcal{L}$, plus précisément :

(i) Pour chaque fonction f de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$,

$$\eta(f^{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^{\mathcal{N}}(\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_f}))$$

(ii) Pour chaque relation R de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_R} \in M$,

$$(a_1, \ldots, a_{n_R}) \in R^{\mathcal{M}} \iff (\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_R})) \in R^{\mathcal{N}}$$

(iii) Pour chaque constante c de $\mathcal{L}$, $\eta(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$

Si un plongement est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. On a alors un plongement $\mu : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ tel que $\eta \circ \mu$ est l'identité de $\mathcal{N}$ et $\mu \circ \eta$ l'identité de $\mathcal{M}$, on le note, comme d'habitude, η^{-1}. Si de plus, $\mathcal{N} = \mathcal{M}$, on parle d'**automorphisme**.

Si l'injection canonique est un plongement, $\mathcal{M}$ est une **sous-structure** de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}$ une **extension** de $\mathcal{M}$.

Exemple 3.

— Les inclusions évidentes $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ fournissent les $\mathcal{L}_{ring}$-plongements

$$\mathbb{Z}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{R}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{C}_{ring}.$$

— Si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ est la fonction $\eta(x) = e^x$, alors η est un $\mathcal{L}_{gp}$-plongement de $(\mathbb{Z}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$.

— Les seuls automorphismes de $\mathbb{Z}_{agp}$ sont l'identité et la fonction $x \mapsto -x$. En effet, si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est un plongement, alors $\eta(0) = 0$ et si $\eta(1) = n$, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\eta(m) = \eta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{\text{m}}) = \underbrace{\eta(1) + \cdots + \eta(1)}_{\text{m}} = mn.$$

et de même, $\eta(-n) = -\eta(n) = -mn$, pour avoir un inverse, η doit être surjective et donc on doit avoir $n = \pm 1$.

1.1.2 Formules et modèles

blabla

En plus des symboles spécifiques à un langage définis plus haut (relations, fonctions et constantes), le langage formel utilise également des variables $(x, y, z, \ldots)$ et des symboles logiques $=, \wedge, \neg, \exists, (,)$. En plus de ces symboles, un langage consiste aussi en des chaines (listes) de ces symboles appelées termes et formules. Ces symboles, termes et formules seront ensuite interprétés dans des structures. On a vu précédemment comment les symboles étaient interprétés, on va maintenant s'intéresser aux termes et aux formules.

Exemple 4 (Termes, formules)**.** Les **termes** sont des chaines de symboles qui font référence à des éléments ou à des fonctions de la structure. Reprenons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$, les chaines

$$0; (1+1); -((1+1)+1); x \cdot (1+1); (x+y)$$

sont des **termes**. On peut les interpréter dans $\mathbb{R}_{ring}$ respectivement comme les nombres $0; 2; -3$ et les fonctions $x \mapsto 2x$ et $(x, y) \mapsto x + y$. Notons qu'un terme ne dépend que du langage mais son interprétation dépend de la structure. Les **formules** sont des chaines qui donnent des informations sur la structure ou ses éléments. Par exemple $(1+1) = 0$ est une **formule** qui est **fausse** dans $\mathbb{R}_{ring}$ mais **vraie** dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_{ring}$, $\exists x[(x \cdot x) = (1+1)]$ affirme que 2 est un carré, elle est fausse dans $\mathbb{Z}_{ring}$ mais vraie dans $\mathbb{R}_{ring}$.

Définition 5 (Terme)**.** L'ensemble des termes d'un langage $\mathcal{L}$ est défini de la manière récursive suivante :

(i) Chaque variable est un terme.

(ii) Chaque constante de $\mathcal{L}$ est un terme.

(iii) Si f est une fonction de $\mathcal{L}$ d'arité n, et $t_1, \ldots, t_n$ des termes, alors $f(t_1, \ldots, t_n)$ est un terme.

(iv) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est un terme.

Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$-structure, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t. La définition récursive des termes permet la définition récursive d'une fonction $t^{\mathcal{M}} : M^n \to M$ comme suit :

(i) Si $t = c$ avec c une constante, $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = c^{\mathcal{M}}$.

(ii) Si $t = x_i$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = x_i$.

(iii) Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{x}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{x}))$

Proposition 1. *Soit $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ un plongement de $\mathcal{L}$-structures, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t et $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in M^n$. Alors*

$$\eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).$$

Démonstration. (On détaille cette preuve évidente car le même principe de preuve va apparaître à plusieurs reprises.)
On procède par récurrence sur la construction des termes.
Si $t = c$ avec c constante, on a

$$\begin{aligned} \eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= \eta(c^{\mathcal{M}}) && \text{par la Définition 5,} \\ &= \eta(c^{\mathcal{N}}) && \text{par définition d'un plongement,} \\ &= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})) && \text{encore par 5} \end{aligned}$$

Si $t = x_i$, alors en utilisant 5 deux fois, on a

$$t^{\mathcal{M}}(\overline{a}) = \eta(a_i) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))$$

Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors

$$\begin{aligned}
\eta(t^{\mathcal{M}}) &= \eta(f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \\
&= f^{\mathcal{N}}(\eta(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) && \text{par définition d'un plongement,} \\
&= f^{\mathcal{N}}(t_1^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})), \ldots, t_r^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))) && \text{par hypothèse de récurrence,} \\
&= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).
\end{aligned}$$

□

Définition 6 (Formule)**.** Comme pour les termes, on définie l'ensemble des **formules** de $\mathcal{L}$ de manière récursive :

(i) Si t_1 et t_2 sont des termes, alors $(t_1 = t_2)$ est une formule.

(ii) Si $t_1, \ldots, t_n$ sont des termes et R est une relation d'arité n, alors $R(t_1, \ldots, t_n)$ est une formule.

(iii) Si φ et ψ sont des formules, alors $\neg\phi$ et $(\varphi \vee \psi)$ sont des formules.

(iv) Si φ est une formule et x est une variable, alors $\exists x[\varphi]$ est une formule.

(v) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est une formule.
Les formules des points (i) et (ii) sont dites **atomiques** car elles ne contiennent pas de formules plus petites.

Exemple 5. Les variables peuvent jouer deux rôles distincts dans les formules selon qu'elles soient **quantifiées** ou non. Par exemple, la formule $x < 1 + 1$ donne une information sur la variable x alors que la formule $\exists x[x \cdot x = 2]$ indique si un élément est une racine, dans la seconde formule, la variable est **muette**, la formule à la même signification que $\exists y[y \cdot x = 2]$

Définition 7 (Variable libre/liée, phrase)**.** Une variable x d'une formule est **quantifiée** si elle suit immédiatement le symbole $\exists$, on dit alors que le quantificateur $\exists x$ **lie** la variable. Une variable qui n'est pas liée est dite **libre**.

Une formule sans variable libre est appelée une **phrase** ou un **énoncé**.

def : interprétation des formules,modèle

prop : formule et plongement, formule et isomorphisme

Remarque 1 (Abréviations)**.** Notre langage formel est très restreint, nous utiliserons des abréviations usuelles pour alléger les formules. Nous écrirons :

$$\begin{aligned}
\text{différent} &: (t_1 \neq t_2) && \text{pour } \neg(t_1 = t_2), \\
\text{ou} &: (\varphi \vee \psi) && \text{pour } \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\
\text{implication} &: (\varphi \to \psi) && \text{pour } (\neg\varphi \vee \psi), \\
\text{équivalence} &: (\varphi \leftrightarrow \psi) && \text{pour } ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)), \\
\text{pour tout} &: \forall x[\varphi] && \text{pour } \neg\exists x[\neg\varphi].
\end{aligned}$$

On préfère restreindre notre langage au strict minimum tout en utilisant ces autres symboles comme de simples abréviations pour ne pas alourdir nos preuves. En effet, comme le quantificateur universel ou la disjonction sont définis comme des combinaisons de symboles de notre langage restreint, nous pourrons les utiliser dans nos formules sans avoir à traiter leurs cas spécifiques lors des preuves par induction.

1.2 Ensembles définissables,quantificateurs

Définition 8 (Ensembles définissables)**.** Soit $\mathcal{M} = (M, \dots)$ une $\mathcal{L}$-structure. On dit qu'un sous-ensemble $X \subseteq M^n$ est **définissable** s'il existe une $\mathcal{L}$-formule $\phi(v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$ et $\overline{b} \in M^m$ tels que $X = \{\overline{a} \in M^n \mid \mathcal{M} \models \phi(\overline{a}, \overline{b})\}$. On dit que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ **définit** X. Soit $A \subseteq M$, on dit que X est A**-définissable**, ou **définissable sur** A, si le paramètre choisi peut être pris dans A, c'est-à-dire s'il existe une formule $\phi(\overline{v}, w_1, \dots, w_l)$ et $\overline{b} \in A^l$, tels que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ définit X.

1.3 Théories et axiomes

1.4 Le Théorème de Compacité

intro sur theoreme de compacité comme pierre angulaire de la théorie des modèles

Définition 9 (Preuve)**.** Soient ϕ une $\mathcal{L}$-formule, T une $\mathcal{L}$-théorie. Une **preuve de ϕ à partir de T** est une suite finie $\psi_1, \dots, \psi_n$ de $\mathcal{L}$-formules telle que $\psi_n = \phi$ et, pour chaque i, ψ_i est soit un axiome de T, soit déduite de $\psi_1, \dots, \psi_{i-1}$ par des règles logiques simples. Nous notons $T \vdash \phi$ s'il existe une preuve de ϕ à partir de T. Nous donnons des exemples de ce qu'on entend par "règles logiques simples" :

(i) De $\phi \wedge \psi$, nous concluons ϕ.

(ii) De ϕ et ψ, nous concluons $\phi \wedge \psi$.

(iii) De ϕ et $\phi \to \psi$, nous concluons ψ.

Définition 10 (Théorie cohérente/incohérente)**.** Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est incohérente s'il existe une $\mathcal{L}$-phrase ϕ telle que $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$, autrement, nous dirons que T est cohérente.

Remarque 2. Nous allons voir qu'une théorie est satisfaisable si et seulement si elle est cohérente. L'implication directe repose sur le théorème de correction, énoncant que notre système de preuve ne produit naturellement que des conséquences formelles s'interprétant comme vraies : si $T \vdash \phi$, alors $T \models \phi$. Nous omettons la vérification de ce résultat pour nous concentrer sur l'implication réciproque.

Théorème 1 (Théorème de complétude de Gödel)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie et ϕ une $\mathcal{L}$-phrase, alors $T \models \phi$ si et seulement si $T \vdash \phi$.*

construction de Henkin en annexe ?

Corollaire 1. *T est cohérente si et seulement si T est satisfaisable.*

Démonstration. Nous prouvons la contraposée. Supposons que T est insatisfaisable, par définition il n'existe pas de modèles de T, donc pour ϕ une phrase quelconque, $T \models (\phi \wedge \neg\phi)$ est trivialement verifié, et par théorème de complétude de Gödel, $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$. □

Théorème 2 (Théorème de compacité)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est satisfaisable si et seulement si tout sous-ensemble fini de T est satisfaisable.*

Démonstration. L'implication directe est claire : un modèle M satisfaisant T satisfait tout sous-ensemble $T_0 \subset T$. Réciproquement, nous prouvons la contraposée : supposons que T est insatisfaisable. D'après le corollaire précédent, T est incohérente. Il existe donc σ une preuve d'une contradiction à partir de T. σ étant par définition finie, elle invoque un nombre fini d'axiomes de T. Ainsi on a l'existence de $T_0 \subset T$ un sous-ensemble fini de T tel que σ est une preuve d'une contradiction à partir de T_0. T_0 est donc incohérent. On conclut en utilisant à nouveau le corollaire précédent : T_0 est insatisfaisable. $\square$

1.5 Complétude, categoricité et test de Vaught

Définition 11 (Théorie complète)**.** Une $\mathcal{L}$-théorie T est dite complète si pour toute $\mathcal{L}$-phrase ϕ, on a soit $T \models \phi$, soit $T \models \neg\phi$.

Proposition 2.

Chapitre 2

Corps algébriquement clos

Dans cette partie, toutes les structures sont des anneaux considérés comme $\mathcal{L}_{ring}$-structures donc plutôt que de noter $\mathcal{A}_{ring}$ ou $\mathcal{A}$, on désignera par la même lettre A à la fois le modèle et le domaine.

Pour des raisons de convenances, on rappelle ici le langage et les axiomes pour les anneaux (unitaires et commutatifs) et les corps qui avaient été donné plus haut.

Définition 12 (Anneaux, corps)**.** Le langage naturel des anneaux est $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$.

On a les axiomes des groupes abéliens (dans le langage des groupes additifs $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$)

R1 $\forall x, y, z[(x + y) + z = x + (y + z)]$,

R2 $\forall x[x + 0 \wedge 0 + x = x]$,

R3 $\forall x[x + (-x) = 0 \wedge (-x) + x = 0]$,

R4 $\forall x, y[x + y = y + x]$.

Ensuite les axiomes de monoïde commutatif (dans le langage $\mathcal{L}_{mon} = (\cdot, 1)$)

R5 $\forall x, y, z[(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)]$,

R6 $\forall x[x \cdot 1 \wedge 1 \cdot x = x]$,

R7 $\forall x, y[x \cdot y = y \cdot x]$.

enfin, la distributivité et l'*unitarité*

R8 $\forall x, y, z[x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)]$.

R9 $0 \neq 1$,

Ces huit phrases axiomatisent la théorie des anneaux commutatifs.

On rajoute ensuite l'axiome

F1 $\forall x[x = 0 \vee \exists y[x \cdot y = 1]]$.

pour obtenir les axiomes de la théorie des corps.

2.1 Propriétés de base

ajouter des exemples ?

A la fin, supprimer les résultats qu'on a au final pas utilisé ...

On rappelle ensuite quelques définitions et propriétés qui nous seront utiles par la suite. On donne certaines démonstrations, et on essaye d'utiliser la théorie des modèles quand cela semble raisonnable. On pourra trouver les autres démonstrations dans n'importe quel livre d'algèbre, par exemple dans [Ber25].

Définition 13 (Anneau intègre)**.** Un anneau non trivial est **intègre** si il est sans diviseur de zéro, c'est à dire si c'est un modèle pour la phrase

$$\forall x, y[x \cdot y = 0 \implies (x = 0 \vee y = 0)].$$

Proposition 3. *Si A est un anneau intègre, il possède un corps des fractions K_A qui vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout plongement $f : A \hookrightarrow F$ de A dans un corps F, il existe un unique plongement $\tilde{f} : K_A \hookrightarrow F$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, hook, "i"] \arrow[dr, hook, "f"'] & K_A \arrow[d, hook, dashed, "\exists! \tilde{f}"] \\ & F \end{tikzcd}$$

Exemple 6. On note $A[X_1, \ldots, X_n]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans A en n indéterminées dans un anneau A. Si A est intègre, $A[X_1, \ldots, X_n]$ également. Si A est un corps, le corps des fractions de $A[X_1, \ldots, X_n]$ est noté $A(X_1, \ldots, X_n)$ et on l'appelle le corps des fractions rationnelles.

Définition 14 (Morphisme d'anneaux, noyau)**.** Un **(homo)morphisme d'anneaux** est une application f entre deux anneaux A et B qui respecte la structure d'anneau, c'est à dire :

(i) $f(a + b) = f(a) + f(b), \forall a, b \in A$.

(ii) $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b), \forall a, b \in A$.

(iii) $f(1_A) = 1_B$.

Le noyau de f est l'ensemble $\ker(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} = f^{-1}(0)$.

Définition 15 (Idéal)**.** Un **idéal** d'un anneau A est un sous ensemble $I \subset A$ tel que :

(i) I est un sous-groupe additif de $(A, +)$.

(ii) $\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$.

L'**idéal engendré** par un ensemble $J \subset A$ est l'intersection de tous les idéaux de A contenant J, on le note (A)

Si un idéal I est tel que $I \subsetneq A$, on dit que l'idéal est **propre**.

Proposition 4. *Soit $f : A \implies B$ un morphisme d'anneaux et J un idéal de B, alors $I = f^{-1}(J)$ est un idéal de A. En particulier,* $\ker(f)$ *est un idéal de A.*

Démonstration. On sait déjà que I est une sous-groupe de A, ensuite pour $x \in I, a \in A$, on a $f(x) \in J$ donc

$$f(ax) = f(a)f(x) \in J$$

car J est un idéal et donc $ax \in J$ d'où le premier point. Comme $\{0\}$ est clairement un idéal, on a le second point. □

Définition 16 (Idéal premier, principal, maximal)**.** Un idéal I d'une anneau A est :

— **premier** si $\forall a, b \in A, ab \in I \implies (a \in I \vee b \in I)$

— **principal** si $\exists a \in A, I = (a)$.

— **maximal** si $I \neq A$ et pour tout idéal J tel que $I \subset J \subset A$, on a $J = I \vee J = A$.

Si tout idéal de A et principal, on dit que A est un anneau **principal**.

Définition 17 (Caractéristique,Sous-corps premier)**.** La **caractéristique** d'un corps est, si il existe, le plus petit entier strictement positif tel que $\underbrace{1+\cdots+1}_{\text{p}}=0$, et 0 sinon. Le **sous-corps premier** d'un corps F est l'intersection de tous ses sous-corps, c'est donc le sous-corps engendré par 1. Si F est de caractéristique $p>0$, alors son sous-corps premier est $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, sinon c'est $\mathbb{Q}$.

Proposition 5 (Anneau quotient, propriété universelle)**.** *Soit I un idéal d'un anneau A ; on note $\pi : A \implies A/I$ la projection canonique et soit $f : A \implies B$ un morphisme d'anneau qui d'annule sur I, alors il existe un unique morphisme $\overline{f} : A/I \implies B$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & B \\ A/I \arrow[ur, dashed, "\exists!\overline{f}"'] & \end{tikzcd}$$

Proposition 6. *Soit I un idéal d'un anneau A, alors :*

(i) A/I est intègre si et seulement si I est premier.

(ii) A/I est un corps si et seulement si I est maximal.

En particulier, tout idéal maximal est premier.

Démonstration. (i) Supposons A/I intègre, il n'est donc pas trivial donc $I \neq A$. Soit $a, b \in A$ tels que $ab \in I$, on a $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ donc par intégrité, $\overline{a} = \overline{0} \vee \overline{b} = \overline{0}$ donc $a \in I \vee b \in I$ donc I est premier. Réciproquement, si I est premier, $I \neq A$ donc A/I n'est pas trivial. Soient $\overline{a}, \overline{b} \in A/I$ tels que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, alors $\overline{ab} = \overline{0}$ donc $ab \in I$ donc comme I est premier, $a \in I \vee b \in I$ c'est à dire $\overline{a} = 0 \vee \overline{b} = 0$ donc A/I est intègre.

(ii) Supposons que A/I est un corps, comme précédemment on a $I \neq A$. Soit J un idéal de A tel que $I \subset J \subset A$, supposons $I \neq J$ et montrons qu'alors $J = A$. Soit $a \in J \backslash I$, on a $\overline{a} \neq \overline{0}$ donc il existe $\overline{b} \in A/I$ tel que $\overline{ab} = 1$ et donc $\overline{1-ab} = \overline{0}$ donc $ab - 1 \in I \subset J$ et donc $1 = (1-ab) + ab \in J$ ainsi, J contient un élément inversible et donc $J = A$ et par suite, I est maximal. Réciproquement, si I est maximal, $I \neq A$ et A/I est non trivial. Soit $\overline{a} \in (A/I) \backslash \{0\}$, soit $J = (a, I)$ l'idéal engendré par $a \notin I$ et I. On a $I \subsetneq J$ donc comme I est maximal, $J = A$ et particulier, $1 \in J$ donc il existe $b \in A, x \in I$ tels que $ab + x = 1$ donc $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$ et $\overline{a}$ est inversible, ainsi A/I est un corps.

Comme un corps est un anneau intègre, par ce qui précède, tout idéal maximal est premier.

□

Théorème 3 (Théorème de Krull)**.** *Soit I un idéal propre d'un anneau commutatif A, alors il existe un idéal maximal de A contenant I.*

Définition 18 (Radical d'un idéal, idéal radiciel)**.** Soit I un idéal d'un anneau commutatif A, on appelle **radical** de I et on note $\sqrt{I}$ l'ensemble des éléments de A dont une puissance appartient à I :

$$\sqrt{I} = \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, a^n \in I\}.$$

Il est clair que $\sqrt{I}$ est un idéal de A, et qu'on a toujours $I \subset \sqrt{I}$. Si on a l'égalité $I = V(I)$, on dit que l'idéal I est **radiciel**.

2.2 Extensions de corps

ajouter des exemples ?

Les corps algébriquement clos se manifestent comme des extensions de corps, on a donc besoin de quelques résultats les concernant. On commence par les extensions simples puis on passe aux extensions finies.

Définition 19 (Extension de corps)**.** Soit K un corps, une **extension** de K est un corps L qui contient K comme sous-corps. On le note L/K. Le corps L muni de son produit et de la loi externe $K \times L \implies L : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est une K-algèbre. La dimension de L comme K-espace vectoriel est appelé **degré** de L/K et noté $[L : K]$. Une **sous-extension** de L/K est un sous-corps de L contenant K.

Définition 20 (Sous-extension engendrée, extension simple)**.** Soit L/K une extension de corps, et soit $E \subset L$, on note $K(E)$ l'intersection des sous-corps contenant K et E, c'est donc la plus petite sous-extension de L/K qui contient E. L'extension $K(E)/K$ est la **sous-extension** de L/K **engendrée** par E. Si il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$, on dit que l'extension L/K est **simple** ou **monogène**.

Lemme 1. *Soit $K(a)/K$ une extension simple, il existe un unique morphisme (dit d'évaluation) $ev_a : K[X] \implies K(a)$ tel que $\forall b \in K, ev_a(b) = b$ et $ev_a(X) = a$.*

redondant avec idéal d'une variété ? a del ?

Définition 21 (Idéal annulateur)**.** Le noyau du morphisme d'évaluation ev_a du lemme précédent est appelé **idéal anulteur** et noté $I(a)$, on a donc

$$I(a) := \{f \in K[x] \mid f(a) = 0\}.$$

Plus généralement, si $V \subset K$ est un ensemble (algébrique), l'**idéal annulateur** de V est l'ensemble

$$I(V) := \{f \in K[x] \mid f(V) = 0 \forall b \in V\}.$$

Proposition 7 ($K[X]$ est principal)**.** *Soit K un corps, alors $K[X]$ est principal et pour tout idéal $I = (P)$ non nul, les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) P est irréductible.

(ii) I est un idéal premier.

(iii) I est un idéal maximal.

Définition 22 (Polynome minimal)**.** Soit $K(a)/K$ une extension simple, un polynôme P qui engendre $I(a)$ est appelé **polynome minimal** de a.

Théorème 4 (Existence d'un corps de rupture)**.** *Soit K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme non constant. Il existe une extension L de K dans laquelle P admet au moins une racine.*

Démonstration. Supposons d'abord que P est irréductible dans $K[X]$. Comme $K[X]$ est principal et que P est irréductible, l'idéal (P) est maximal (proposition 7).

Donc d'après la proposition 6 l'anneau quotient $L = K[X]/(P)$ est un corps.

Montrons que L est l'extension recherchée :

1. L **contient** K **:** Considérons la projection canonique $\pi : K[X] \to L$. La restriction de π aux polynômes constants, $\phi : K \to L$ définie par $\phi(a) = \pi(a)$, est un morphisme d'anneaux. Comme K est un corps, ϕ est injectif. On peut donc identifier K à son image $\phi(K) \subset L$.

2. P **a une racine dans** L **:** Soit $\alpha = \pi(X)$ la classe de l'indéterminée X dans L. Évaluons le polynôme $P = \sum a_i X^i$ en α :

$$P(\alpha) = \sum_i a_i(\pi(X))^i = \sum_i \pi(a_i X^i) = \pi\left(\sum_i a_i X^i\right) = \pi(P)$$

Or, par construction, $P \in (P)$, donc $\pi(P) = 0$ dans L. Ainsi, $P(\alpha) = 0$ et α est une racine de P dans L.

Et si P n'est pas irréductible, il suffit d'appliquer ce qui précède sur un de ses facteurs irréductibles. □

Proposition 8 (Classification des extensions simples)**.** *Soit $K(a)/K$ une extension simple. De ce qui précède, on déduit que l'extension est entièrement déterminée, à isomorphisme près, par le choix d'un polynôme minimal de a qui est irréductible. Donc classifier les extensions simples revient à classifier les idéaux premiers de $K[X]$.*

Exemple 7. Prenons $K = \mathbb{Q}$ et $a = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Le polynôme minimal de $\sqrt{2}$ est $X^2 - 2$. Prenons maintenant $a = \pi$, comme π est transcendant, son polynôme minimal est le polynôme nul et $I(\pi) = \{0\}$ donc $ev_\pi : \mathbb{Q}[X] \implies \mathbb{Q}(\pi)$ est injectif et par suite, $\mathbb{Q}(r) \simeq \mathbb{Q}(X)$.

Définition 23 (Extension finie)**.** Soit L/K une extension de corps, si il existe $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in L^n$ tel que $L = K(\overline{a})$, on dit que l'extension est **finie**.

Proposition 9 (Classification des extensions finies)**.** *Soit $K(a_1, \ldots, a_n)/K$ une extension finie. Comme dans le cas simple, on a $K(a_1, \ldots, a_n) \simeq K[X_1, \ldots, X_n]/I(a_1, \ldots, a_n)$ donc pour classifier les extensions finies, il suffit de classifier les idéaux premiers de $K[X_1, \ldots, X_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.*

Théorème 5 (Base de Hilbert)**.** *Soit K un corps et $n \in \mathbb{N}^*$ alors tout idéal de $K[X_1, \ldots, X_n]$ est engendré par un nombre fini de polynômes.*

Définition 24 (Extension algébrique)**.** Soit L/K une extension de corps, si tout élément de F est algébrique sur K, on dit que L/K est une **extension algébrique**.

Proposition 10. *Si L/K est une extension algébrique finie, alors c'est une extension simple.*

Lemme 2. *Si L/K et K/F sont des extensions algébriques, alors L/F également.*

2.3 Clôture algébrique d'un corps

Définition 25 (Corps algébriquement clos,clôture algébrique)**.** On dit qu'un corps K est **algébriquement clos** si tout polynôme non constant de $K[X]$ admet une racine dans K. On dit que L est une **clôture algébrique** de K si L/K est une extension algébrique et L est algébriquement clos.

On va avoir besoin des lemmes suivants :

Lemme 3. *Pour tout corps K, il existe une extension K^*/K telle que tout polynôme non constant $P \in K[X]$ admette au moins une racine dans K^*.*

Démonstration. Considérons le langage des anneaux auquel on ajoute les constantes de K et une constante pour chaque polynôme unitaire non constant $P \in K[X]$,

$$\mathcal{L}_K = \mathcal{L}_{ring} \cup \{c_x \mid x \in K\} \cup \{c_P \mid P \in K[X] \text{ unitaire non constant}\}$$

Soit T la théorie constituée de :

1. $\mathrm{Diag}(K)$ (pour assurer que le modèle sera une extension de K).
2. L'axiome $P(c_P) = 0$ pour chaque $P \in K[X]$.

Soit T_0 un sous-ensemble fini de T. Il ne fait intervenir qu'un nombre fini de polynômes $P_1, \ldots, P_m$. D'après le théorème 4 il existe une extension finie L de K contenant une racine r_i pour chaque P_i. En interprétant chaque constante c_{P_i} par la racine r_i, on a $L \models T_0$.

Ainsi, tout sous-ensemble fini de T est satisfiable, par le théorème de compacité (théorème 2) la théorie T est satisfiable. Soit $K^* \models T$, comme $K^* \models \mathrm{Diag}(K)$, $K \subset K^*$ et par construction, tout polynôme non constant de $K[X]$ y admet une racine d'où le résultat. □

Lemme 4 (Union d'une chaîne de corps)**.** *Soit $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de corps telle que pour tout n, K_n est un sous-corps de K_{n+1} (on parle d'une **chaîne croissante**). Alors l'ensemble $K_\infty = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$, muni des opérations induites, est un corps.*

Démonstration. Soient $x, y \in K_\infty$. Par définition de la réunion, il existe des indices i et j tels que $x \in K_i$ et $y \in K_j$. Posons $N = \max(i, j)$. Par croissance de la chaîne, $K_i \subseteq K_N$ et $K_j \subseteq K_N$, donc x et y appartiennent tous deux au corps K_N.

Les opérations $x + y$, $x \cdot y$, $-x$ et x^{-1} (si $x \neq 0$) sont donc bien définies dans K_N et par suite dans K_∞. Les axiomes des corps (associativité, distributivité, etc.) étant vérifiés dans chaque K_n, ils le sont dans l'union. □

On peut maintenant montrer le résultat suivant :

Proposition 11. *Tout corps admet une clôture algébrique.*

Démonstration. Soit K un corps, Définissons par récurrence une chaîne de corps $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

— $K_0 = K$.

— K_{n+1} est l'extension de K_n obtenue par le lemme 3 (telle que tout polynôme de $K_n[X]$ ait une racine dans K_{n+1}).

Soit $L = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$. D'après le lemme 4, L est un corps. Ensuite, soit $P \in L[X]$ un polynôme non constant. Comme P possède un nombre fini de coefficients, il existe un rang n tel que tous les coefficients de P appartiennent à K_n, c'est-à-dire $P \in K_n[X]$. Par construction, P admet une racine dans K_{n+1} et donc dans L donc L est algébriquement clos. En posant $\overline{K} = \{x \in L \mid x \text{ algébrique sur} K\}$, il est immédiat que $\overline{K}$ que est une clôture algébrique de K. □

Théorème 6 (Théorème de Steinitz)**.** *Tout corps K admet une clôture algébrique, unique à isomorphisme près. On la notera $\overline{K}$*

unicite Admise ou pas ?

Démonstration. L'existence a été montrée par la proposition 11 et on admettra l'unicité. □

Définition 26 (Indépendance algébrique, base de transcendance)**.** Soit L/K une extension de corps, un sous-ensemble $E \subset L$ est **algébriquement indépendant** sur K si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in K[X_1, \ldots, X_n]$ non nul, si $e_1, \ldots, e_n \in E$ sont distincts, alors $P(e_1, \ldots, e_n) \neq 0$. Si E est algébriquement indépendant sur K et que L est une extension algébrique de $K(E)$, alors on dit que E est une base de transcendance de L/K.

Proposition 12. *Toute extension de corps admet une base de transcendance et toutes les bases de transcendance d'une extension ont un même cardinal appelé le **degré de transcendance** de l'extension.*

Proposition 13. *Deux corps algébriquement clos sont isomorphes si et seulement si ils ont même caractéristique et même degré de transcendance*

Théorème 7 (Théorème de structure des corps finis)**.** *Soit $p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des racines du polynôme $P(X) = X^{p^k} - X$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ est un sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ noté $\mathbb{F}_{p^k}$ et c'est l'unique corps de cardinal p^k à isomorphisme près et de plus, $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{k \geq 1} \mathbb{F}_{p^k}$.*

2.4 Théorie des corps algébriquement clos

On a maintenant tous les outils algébriques nécessaires et pouvons revenir à la théorie des modèles. On commence par définir la théorie des corps algébriquement clos (ACF). Puis on montre successivement qu'elle admet l'élimination des quantificateurs, la complétude ainsi que le principe de Lefschetz qui nous seront indispensables pour la suite. On étudie ensuite les ensembles définissables de la théorie et leur lien avec les variétés algébriques.

Définition 27 (Théorie des corps algébriquement clos)**.** On se place dans le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$ avec les axiomes des corps (définition 12).
On axiomatise les corps algébriquement clos en rajoutant, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, l'axiome

$$\forall a_0, \ldots, a_{n-1}, \exists x [x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0].$$

On note ACF l'ensemble des axiomes des corps algébriquement clos.

On axiomatise la caractéristique $p \in \mathbb{P}$ en notant $\chi_p : \underbrace{1 + \cdots 1 = 0}_{\text{p}}$.

On pose alors

$$\mathrm{ACF}_p := \mathrm{Th}(ACF \cup \chi_p)$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p et

$$\mathrm{ACF}_0 := \mathrm{Th}(ACF \cup \{\neg \chi_p \mid p \in \mathbb{P}\})$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On notera ACF_n la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique n pour $n \in \mathbb{P} \cup \{0\}$.

def dans le chap 1 ou pas ?

Définition 28 (Elimination des quantificateurs)**.** On dit qu'une théorie T a l'**élimination des quantificateurs** si pour toute formule φ, il existe une formule sans-quantificateurs θ telle que $T \models \varphi \leftrightarrow \theta$. Plus précisément, une $\mathcal{L}$-théorie T a l'**élimination des quantificateurs** dans $\mathcal{L}$ si pour toute $\mathcal{L}$-formule $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$, il existe une $\mathcal{L}$-formule $\theta(x_1, \ldots, x_m)$ sans quantificateurs, où $n \leq m$ telle que

$$T \models \forall x_1 \cdots \forall x_m (\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \theta(x_1, \ldots, x_m))$$

Théorème 8 (Théorème de Tarski)**.** *La théorie* ACF *a l'élimination des quantificateurs*

Démonstration.
preuve élimination des quantificateurs

□

Proposition 14 (Complétude)**.** *La théorie* ACF_n *est complète.*

Démonstration. On montre le résultat pour ACF_p, la preuve pour ACF_0 est identique en remplaçant $\mathbb{F}_p$ par $\mathbb{Q}$.
Soient K, L tels que $K, L \models \mathrm{ACF}_p$ et φ une phrase dans le langage des anneaux. Par l'élimination des quantificateurs, il existe une phrase θ telle que $\mathrm{ACF}_n \models \varphi \leftrightarrow \theta$. Par le section 1.5, $K \models \theta \models\leftrightarrow \mathbb{F}_p \models \theta \iff L \models \theta$ et par donc $K \models \varphi \leftrightarrow K \models \theta \leftrightarrow L \models \theta \leftrightarrow L \models \varphi$ et donc K et L sont équivalentes et ACF_p est complète. □

Corollaire 2 (Principe de Lefschetz)**.** *Soit φ une phrase du langage des anneaux. On a les équivalences suivantes*

(i) *φ est vraie sur $\mathbb{C}$.*

(ii) *Il existe un corps algébriquement clos de caractéristique 0 sur lequel φ est vraie.*

(iii) *φ est vraie sur tout corps algébriquement clos de caractéristique 0.*

(iv) *Il existe $M > 0$ tel que pour tout premier $p > M$, il existe un corps algébriquement clos de caractéristique p sur lequel φ est vraie.*

(v) *Il existe des premiers p arbitrairement grands et des corps algébriquement clos de caractéristique p sur lesquels φ est vraie.*

Démonstration. On montre que $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$ puis $3 \implies 4 \implies 5 \implies 2$.
Il est clair que $1 \implies 2$ et $3 \implies 1$, $2 \implies 3$ est une conséquence immédiate de la complétude (proposition 14).
$(3 \implies 4)$: On a $\mathrm{ACF}_0 \models \varphi$ donc par compacité (théorème 2), il existe $\Sigma \subset \mathrm{ACF}_0$ fini tel que $\Sigma \models \varphi$. Comme Σ est fini, l'ensemble $E = \{p \in \mathbb{P} \mid \neg\chi_p \in \Sigma$ aussi. En posant $M = \max(E)$ (et $M = 0$ si $E = \emptyset$), pour $p > M$, on a $\mathrm{ACF}_p \models \Sigma$ et donc $\mathrm{ACF}_p \models \varphi$.
$4 \implies 5$ est claire et enfin,
$(5 \implies 2)$: Supposons que $\mathrm{ACF}_0 \not\models \varphi$, par la proposition 14 ACF_0 est complète ainsi $\mathrm{ACF}_0 \models \neg\varphi$ donc par ce qui précède, $\mathrm{ACF}_p \models \neg\varphi$ pour p suffisamment grand ce qui contredit 4 d'où le résultat. □

2.5 Ensembles définissables, variétés

Dans cette section, on fixe un corps algébriquement clos K et un entier $n \geq 1$. Le théorème 8 montre que tous les ensembles définissables de K^n sont définissables sans quantificateurs. Dans cette section, on précise ce que sont les ensembles définissables sont, leur lien avec les variétés affines et plus généralement avec les ensembles constructibles.

blabla

Définition 29 (Variété affine)**.** Soit $S \subset K[\overline{x}]$, on note $V(S)$ le sous ensemble de K^n formé des zéros communs à tous les éléments de S. C'est à dire :

$$V(S) = \{\overline{a} \in K^n \mid P(\overline{a}) = 0, \forall P \in S\}.$$

Les sous-ensembles de K^n de ce type sont les sous-variétés algébrique affine de K^n. Dans la suite on utilisera simplement **variété** pour les qualifier.

Définition 30 (Idéal d'une variété)**.** Soit $V \subset K^n$, on appelle idéal de V, et on note $I(V)$ l'ensemble des polynômes nuls sur V. C'est à dire :

$$I(V) = \{P \in K[\overline{x}] \mid P(\overline{a}) = 0, \forall \overline{a} \in V\}.$$

On a les propriétés immédiates suivantes :

Lemme 5.

mettre ce qui sert

Proposition 15. *Soit $V \subset K^n$ une variété, alors il existe un ensemble E fini de polynômes tel que $V = V(E)$.*

Démonstration. Supposons $V = V(P)$, alors par le lemme 5, on a $V = V(I(V(P)))$ et par le théorème 5, l'idéal $I(V(P))$ est engendré par un ensemble fini E de polynômes d'où le résultat. □

Définition 31 (Ensemble constructible)**.** Un sous-ensemble de K^n est dit **constructible** s'il est une combinaison booléenne finie (union, intersection, complémentaire) de variétés.

Ainsi, les ensembles constructibles sont exactement les sous-ensembles de K^n qui sont les définissables sans quantificateurs avec paramètres dans K, et comme ACF élimine les quantificateurs (théorème 8), ce sont exactement les ensembles définissables.

Proposition 16 (Dictionnaire Logique-Géométrie)**.** *Tout sous ensemble de K^n définissable dans le language des anneaux avec paramètres dans K est une union **finie** d'ensembles de la forme $V \backslash W$ avec V, W des variétés de K^n.*

Démonstration.

preuve lien

□

Proposition 17 (Projection)**.**

projection

Théorème 9 (Théorème de Chevalley)**.** *Soit $m \in \mathbb{N}^*$, S un ensemble constructible de K^n, et $f : K^n \to K^m$ une fonction **polynomiale**, alors $f(S) \subset K^m$ est .*

Démonstration.

Preuve Chevalley

□

Chapitre 3

Applications

lots of blabla

3.1 Ax-Grothendieck

On présente dans un premier temps le cas particulier de $\mathbb{C}^n$ et sa preuve détaillée avant de passer au cas général d'une variété algébrique sur un corps algébriquement clos dont l'idée est la même.

On va avoir besoin du lemme suivant :

Lemme 6. *Pour tout couple (n, d) d'entiers positifs, il existe une phrase $\varphi_{n,d}$ dans le langage des anneaux qui exprime que dans un corps K, toute famille $(f_1, \ldots, f_n)$ de polynômes en n variables de degré inférieur ou égal à d, si l'application associée est injective, alors elle est surjective.*

Démonstration. Construisons la phrase pour l'exemple $n = 3$ et $d = 2$, la construction générale est la même.

Un polynôme P en 3 variables de degré ≤ 2 est une combinaison linéaire des 10 monômes suivants :

$$1, \quad x_1, x_2, x_3, \quad x_1^2, x_2^2, x_3^2, \quad x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3$$

Une application polynomiale $f : K^3 \to K^3$ est définie par un triplet de polynômes (f_1, f_2, f_3). Chacun nécessitant 10 coefficients, l'application est donc entièrement déterminée par un tuple de $3 \times 10 = 30$ coefficients. Considérons 30 variables (au sens logique) que nous noterons globalement par le vecteur $\overline{c} = (c_k, d)$. Pour chaque composante $k \in \{1, 2, 3\}$, on peut écrire formellement le terme polynomial associé :

$$f_k(\overline{c}, \overline{x}) = \sum_{\delta \leq 2} c_{k,\delta} \cdot \overline{x}^{\delta}$$

L'injectivité s'exprime par la formule :

$$\mathrm{Inj}(\overline{c}) : \forall \overline{x} \forall \overline{y} \left(\left[\bigwedge_{k=1}^{3} f_k(\overline{c}, \overline{x}) = f_k(\overline{c}, \overline{y}) \right] \longrightarrow (\overline{x} = \overline{y}) \right)$$

La surjectivité s'exprime par la formule :

$$\mathrm{Surj}(\overline{c}) : \forall \overline{z} \exists \overline{w} \left(\bigwedge_{k=1}^{3} f_k(\overline{c}, \overline{w}) = z_k \right)$$

Et on a alors :

$$\varphi_{3,2} : \forall \overline{c}\,(\mathrm{Inj}(\overline{c}) \longrightarrow \mathrm{Surj}(\overline{c}))$$

qui est bien une formule de longueur finie du premier ordre dans le langage des anneaux. □

Théorème 10 (Ax-Grothendieck)**.** *Soit $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est injective, alors elle est bijective.*

Démonstration. D'après le lemme 6 et par principe de Lefschetz (corollaire 2), il suffit de montrer le résultat pour $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout $p \in \mathbb{P}$. Par le théorème 7, toute partie finie de $\overline{\mathbb{F}_p}$ est contenue dans un sous-corps fini de $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit $f = (f_1, \ldots, f_n) : \overline{\mathbb{F}_p}^n \to \overline{\mathbb{F}_p}^n$, une application polynomiale injective. Supposons qu'il existe $y \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$ qui n'est pas dans l'image de f. Soit K le sous-corps fini de $\overline{\mathbb{F}_p}$ qui contient toutes les composantes de y et tous les coefficients des f_i, alors f induit une application $K^n \to K^n$ qui est injective et non surjective, ce qui est absurde car K est fini. □

Lemme 7. *Pour tout quadruplet d'entiers (n, m, d, δ), il existe une phrase $\varphi_{n,m,d,\delta}$ dans le langage des anneaux qui exprime la propriété suivante : Pour tout corps K, pour toute variété algébrique $V \subset K^n$ définie par m équations de degré au plus δ, et pour toute application polynomiale $f : V \to V$ définie par des polynômes de degré au plus d, si f est injective alors elle est surjective.*

Démonstration. Illustrons la construction de la phrase $\phi_{n,m,d,s}$ dans un cas simple :

— $n = 2$ (Dimension ambiante : le plan K^2).

— $m = 1$ (La variété V est définie par 1 équation).

— $d = 2$ (L'équation est de degré ≤ 2, c'est une conique).

— $\delta = 1$ (L'application f est polynomiale de degré ≤ 1, c'est une application affine).

Coefficients :

— La variété V est définie par l'annulation d'un polynôme P de degré ≤ 2 en 2 variables. Il y a 6 monômes $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_2^2, x_1x_2)$. On note $\overline{a}$ le vecteur des 6 coefficients de P. On définit l'appartenance à V par la formule :

$$x \in V_{\overline{a}} \iff P(\overline{a}, \overline{x}) = 0$$

— L'application f est définie par 2 polynômes (f_1, f_2) de degré ≤ 1. Chaque polynôme a 3 coefficients $(c_0 + c_1x_1 + c_2x_2)$. On note $\overline{c}$ le vecteur des $2 \times 3 = 6$ coefficients définissant f.

Conditions sur les coefficients Contrairement au cas affine (lemme 6), n'importe quel choix de coefficients $\overline{c}$ ne convient pas, il faut que f envoie bien les points de V dans V. On introduit une formule de "Stabilité" :

$$\mathrm{Stable}(\overline{a}, \overline{c}) : \forall \overline{x}\,(P(\overline{a}, \overline{x}) = 0 \longrightarrow P(\overline{a}, f(\overline{c}, \overline{x})) = 0)$$

Injectivité et Surjectivité restreintes à V On veut que les quantificateurs ne portent que sur les points de V, on utilise donc la formule d'appartenance introduite précédemment

$$\mathrm{Inj}_V(\overline{a}, \overline{c}) : \forall \overline{x} \forall \overline{y}\,([\overline{x} \in V_{\overline{a}} \wedge \overline{y} \in V_{\overline{a}} \wedge f(\overline{c}, \overline{x}) = f(\overline{c}, \overline{y})] \longrightarrow \overline{x} = \overline{y})$$

$$\mathrm{Surj}_V(\overline{a}, \overline{c}) : \forall \overline{z}\,(\overline{z} \in V_{\overline{a}} \longrightarrow \exists \overline{w}[\overline{w} \in V_{\overline{a}} \wedge f(\overline{c}, \overline{w}) = \overline{z}])$$

On a donc

$$\varphi_{2,1,2,1} : \forall \overline{a} \forall \overline{c}\,[(\mathrm{Stable}(\overline{a}, \overline{c}) \wedge \mathrm{Inj}_V(\overline{a}, \overline{c})) \longrightarrow \mathrm{Surj}_V(\overline{a}, \overline{c})]$$

□

Théorème 11 (Ax-Grothendieck)**.** *Soit K un corps algébriquement clos, V une variété algébrique sur K et $f : V \to V$ une application polynomiale. Si f est injective, alors elle est bijective.*

Démonstration. La preuve suit exactement le même schéma que pour le cas affine $V = \mathbb{C}^n$ (théorème 10). Par le lemme et par principe de Lefschetz, il suffit de démontrer le résultat pour $K = \overline{\mathbb{F}_p}$.

La seule adaptation nécessaire concerne la construction du sous-corps fini. Si l'on suppose qu'il existe $y \in V$ hors de l'image de f, on considère le sous-corps fini $k \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par : les coefficients de l'application f et les coordonnées de y (comme précédemment) ET les coefficients des polynômes définissant la variété V.

Alors l'ensemble des points rationnels $V(k) = V \cap k^n$ est fini (car inclus dans k^n). Par stabilité, f induit une application $f : V(k) \to V(k)$ injective et non surjective, ce qui est exclu. □

3.2 Nullstellensatz

blabla

La définition d'un corps algébriquement clos demande que chaque polynôme non constant admette une racine dans le corps, mais grâce à l'élimination des quantificateurs (théorème 8), on peut étendre ce résultat à des systèmes d'équations polynomiales en plusieurs variables de la manière suivante.

Théorème 12. *Soit K un corps algébriquement clos, si un système **fini** d'équations polynomiales (et/ou de négations d'équations polynomiales) à coefficients dans K admet une solution dans une extension L de K, alors il admet une solution dans K.*

Démonstration. Soit $\overline{c}$ un n-uplet qui contient les coordonnés de tous les coefficients des polynômes du système, on peut coder le système avec une formule $\varphi(\overline{x}, \overline{c})$ où $\varphi(\overline{x}, \overline{y})$ sera de la forme

$$(\bigwedge_{i=1}^{p} f_i(\overline{x}, \overline{y}) = 0) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{q} g_i(\overline{x}, \overline{y}) \neq 0)$$

où les f_i, g_i sont des polynômes de $\mathbb{Z}[\overline{x}, \overline{y}]$. Supposons que $L \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. Alors, d'après la section 1.5, alors $\overline{L} \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. Donc, comme ACF admet l'élimination des quantificateur (théorème 8), il existe une formule $\theta(\overline{y})$ sans quantificateurs telle que $\mathrm{ACF}_n \vdash \forall \overline{y} [\exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y}) \leftrightarrow \theta(\overline{y})]$. Ainsi on a $\mathrm{ACF}_n \models \theta(\overline{c})$ et comme θ est sans quantificateur et K une sous-structure de $\overline{L}$ d'après le section 1.5 on a $K \models \theta \overline{c}$ et finalement, comme $K \models \mathrm{ACF}_n$, on a $K \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{y})$. □

Le théorème précédent affirme que pour savoir si un système d'équations admet des solutions, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que dans un corps algébriquement clos, il ne donne cependant pas d'indication sur l'existence ou non de solutions. Pour cela, on a besoin du Nullstelensatz.

Théorème 13 (Nullstelensatz faible)**.** *Soit K un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\overline{x}]$. Alors I est un idéal propre si et seulement si $V(I) \neq \emptyset$.*

Démonstration. Le sens réciproque est clair, I est propre si et seulement si $1 \notin I$, comme 1 ne s'annule pas, si $1 \in I, V(I) = \emptyset$.
Supposons maintenant que I est un idéal propre. Par le théorème de Krull (théorème 3), I est contenu dans un idéal maximal J. Posons $L = K[\overline{x}]/J$, comme J est maximal, c'est une extension de corps de K. Notons $\overline{y} = \pi(\overline{x})$ la classe de $\overline{x}$, pour tout $f \in J$, et en particulier pour $f \in I$, on a $f(\overline{y}) = 0$. Ensuite, par le théorème de la base de Hilbert (théorème 5), l'idéal I est engendré par un nombre fini de polynômes $f_1, \ldots, f_k$ et donc $L \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc par le théorème 12, $K \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc $V(I) \neq \emptyset$. □

Lemme 8. *Soit I un idéal de $K[\overline{x}]$, alors $V(\sqrt{I}) = V(I)$.*

Démonstration. C'est immédiat par intégrité de $K[\overline{x}]$. □

Théorème 14 (Nullstelensatz)**.** *Soit K un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\overline{x}]$. Alors*

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

Démonstration.

preuve Nullstelensatz fort

□

Conclusion

Bibliographie

[Ber25] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. fre. 3e édition [revue et enrichie]. 2025. isbn : 978-2-4932-3032-4.

[Bou05] Elisabeth Bouscaren. *Introduction à la théorie des modèles*. Université Paris-Sud (Orsay). 2005. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~elisabeth.bouscaren/pub/Noteshyeres.pdf (visité le 25/12/2025).

[Deb99] Olivier Debarre. *Introduction à la géométrie algébrique*. Notes de cours. Université Paris Cité. 1999. url : https://www.math.ens.psl.eu/~debarre/DEA99.pdf (visité le 25/12/2025).

[GD66] A. Grothendieck et J. Dieudonné. « Éléments de Géométrie Algébrique ». fre. In : *Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques* 28.1 (1966), p. 5-248. issn : 0073-8301.

[Kir19] Jonathan Kirby. *An Invitation to Model Theory*. Cambridge University Press, 2019.

[Mar02] David Marker. *Model Theory*. eng. Dordrecht : Springer New York, 2002. isbn : 0-387-98760-6.

[Ser09] Jean-Pierre Serre. « How to use finite fields for problems concerning infinite fields ». English. In : *Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory. Proceedings of the 11th international conference, CIRM, Marseilles, France, November 5–9, 2007*. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 2009, p. 183-193. isbn : 978-0-8218-4716-9.