第111回看護師国家試験（2022年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録8問（直接眼科2・関連領域3・弱い関連3）。実施日：令和4年2月13日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第111回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
111A37	一般	弱い関連	閉眼下での上肢の評価	2
111A48	一般	関連領域	副鼻腔炎手術後の説明（複視）	2
111A78	一般	直接眼科	眼の遠近調節を行う筋	3
111A79	一般	弱い関連	咀嚼運動の脳神経（滑車・動眼の選択肢）	3
111A100	状況設定	弱い関連	胆道閉鎖症（眼球結膜の黄染）	2
111B03	必修	関連領域	情報機器作業と視力障害	2
111B12	必修	関連領域	内分泌器官（涙腺）	3
111B38	一般	直接眼科	点眼薬の投与	4

111A37　閉眼下での上肢の評価

区分：一般／分類：弱い関連／主題：神経学的検査と閉眼／出典：午前問題PDF 18ページ

※ この問題には図があります。図は転載していません。公式PDFの該当ページで確認してください。

上肢のフィジカルアセスメントの立位での実施場面の写真（別冊No. 1）を別に示す。手のひらを上にして、肩の高さで水平に前方に両腕を伸ばしてもらった。その後、閉眼してもらうと、左腕が回内しながら下がっていった。アセスメントの結果で正しいのはどれか。

1　位置覚の異常
2　錐体路の障害
3　小脳機能の異常
4　関節可動域の障害

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	位置覚の異常ではRomberg徴候など感覚性失調の所見が出る。
2	正答	上肢Barré徴候陽性は錐体路（皮質脊髄路）の障害による軽度の運動麻痺を示す。
3	誤答	小脳機能は指鼻試験や踵膝試験で評価する。
4	誤答	関節可動域の障害では挙上そのものが制限される。

公式正答：2　錐体路の障害

ポイント：閉眼で姿勢保持が崩れるかを見る検査には、Barré徴候、Romberg試験、Mann試験がある。

111A48　副鼻腔炎手術後の説明（複視）

区分：一般／分類：関連領域／主題：鼻副鼻腔手術と眼の合併症／出典：午前問題PDF 21ページ

A さん（32歳、男性）は慢性副鼻腔炎と診断され経過観察をしていたが、症状が改善せず手術を受けることになった。A さんへの術後の生活についての説明で適切なのはどれか。

1　咽頭にたまった分泌物は飲み込んでも良い。
2　物が二重に見えるときは看護師に伝える。
3　手術当日から入浴が可能である。
4　臥床時は頭部を低く保つ。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	分泌物は飲み込まず吐き出す。
2	正答	物が二重に見える（複視）は眼窩壁損傷や眼窩内出血・外眼筋障害のサインで、早期発見が必要。
3	誤答	出血予防のため当日の入浴は避ける。
4	誤答	頭部を高くして出血・腫脹を抑える。

公式正答：2　物が二重に見えるときは看護師に伝える。

ポイント：副鼻腔炎の眼合併症（眼窩蜂窩織炎）や、手術時の眼窩・視神経損傷の可能性から、術後の視機能の観察が重要。

111A78　眼の遠近調節を行う筋

区分：一般／分類：直接眼科／主題：眼の構造・機能／出典：午前問題PDF 31ページ

眼の遠近調節を行う筋はどれか。

1　下斜筋
2　下直筋
3　毛様体筋
4　上眼瞼挙筋
5　瞳孔括約筋

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	下斜筋は眼球を上外方へ回す外眼筋。
2	誤答	下直筋は眼球を下方へ動かす外眼筋。
3	正答	毛様体筋が収縮すると毛様小帯が緩み水晶体が厚くなって近くにピントが合う。副交感神経（動眼神経）支配。
4	誤答	上眼瞼挙筋は上まぶたを上げる。
5	誤答	瞳孔括約筋は縮瞳させる筋で、ピントではなく光量を調節する。

公式正答：3　毛様体筋

ポイント：「調節＝毛様体筋」「光量＝虹彩（瞳孔括約筋・散大筋）」「眼球運動＝外眼筋」。

111A79　咀嚼運動の脳神経（滑車・動眼の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：脳神経と眼（対光反射・眼球運動）／出典：午前問題PDF 32ページ

咀嚼運動にかかわる脳神経はどれか。

1　嗅神経
2　滑車神経
3　三叉神経
4　動眼神経
5　内耳神経

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	嗅神経は嗅覚。
2	誤答	滑車神経は上斜筋を支配し眼球を下内方へ動かす。
3	正答	三叉神経の下顎神経が咬筋・側頭筋などの咀嚼筋を支配する。
4	誤答	動眼神経は外眼筋の多くと上眼瞼挙筋、瞳孔括約筋を支配する。
5	誤答	内耳神経は聴覚・平衡覚。

公式正答：3　三叉神経

ポイント：眼に関わる脳神経：Ⅱ視神経（視覚）、Ⅲ動眼・Ⅳ滑車・Ⅵ外転（眼球運動）、Ⅴ三叉（角膜知覚）、Ⅶ顔面（閉眼・涙腺）。

111A100　胆道閉鎖症（眼球結膜の黄染）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：黄疸と眼球結膜／出典：午前問題PDF 44ページ

> 【状況設定文】A ちゃん（生後24日、女児）は両親と3人暮らし。母親が母子健康手帳の便色カードを見て、A ちゃんの便色が気になったため、A ちゃんを連れて近所の小児科医院を受診した。A ちゃんは在胎39週、出生体重3,100g、出生時に異常はない。現在、混合栄養で体重は3,700gである。体温37.2℃、呼吸数36/分、心拍数108/分、整、血圧78/44mmHg。眼球結膜に黄染を認める。血液検査結果：Hb 12.6g/dL、白血球7,800/μL、血小板21万/μL、プロトロンビン時間〈PT〉88%、総ビリルビン11.3mg/dL、直接ビリルビン9.5mg/dL、AST 96U/L、ALT 126U/L。紹介先の病院で腹部超音波検査を実施した結果、A ちゃんは胆道閉鎖症の疑いがあり入院した。

A ちゃんの便として考えられるのはどれか。

1　褐色便
2　灰白色便
3　タール便
4　イチゴゼリー様便

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	褐色便は胆汁が流れている正常便。
2	正答	胆汁の排泄が途絶えると便の色素（ステルコビリン）がなくなり灰白色便になる。便色カードで早期発見する。
3	誤答	タール便は上部消化管出血。
4	誤答	イチゴゼリー様便は腸重積。

公式正答：2　灰白色便

ポイント：黄疸は眼球結膜（強膜）に最も早く現れ、総ビリルビン2〜3mg/dL以上で視認できる。新生児では生理的黄疸との鑑別に直接ビリルビンと便色を使う。

111B03　情報機器作業と視力障害

区分：必修／分類：関連領域／主題：職業性疾病と眼／出典：午後問題PDF 7ページ

職業性疾病のうち情報機器〈VDT〉作業による健康障害はどれか。

1　じん肺
2　視力障害
3　振動障害
4　皮膚障害

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	じん肺は粉じん吸入。
2	正答	長時間の画面注視で眼精疲労、視力低下、ドライアイが起こる。
3	誤答	振動障害は振動工具。
4	誤答	皮膚障害は化学物質など。

公式正答：2　視力障害

111B12　内分泌器官（涙腺）

区分：必修／分類：関連領域／主題：眼の構造・機能（涙腺）／出典：午後問題PDF 9ページ

内分泌器官はどれか。

1　乳腺
2　涙腺
3　甲状腺
4　唾液腺

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	乳腺は外分泌腺。
2	誤答	涙腺は涙液を結膜嚢に分泌する外分泌腺。涙は鼻涙管を通って鼻腔へ流れる。
3	正答	甲状腺は甲状腺ホルモンを血中に分泌する内分泌器官。
4	誤答	唾液腺は外分泌腺。

公式正答：3　甲状腺

ポイント：涙腺は眼窩の上外側にあり、分泌は副交感神経（顔面神経）が促進する。

111B38　点眼薬の投与

区分：一般／分類：直接眼科／主題：点眼／出典：午後問題PDF 17ページ

点眼薬の投与について正しいのはどれか。

1　点眼時は上眼瞼を上げる。
2　点眼容器の先端は眼瞼結膜に当てる。
3　点眼後は眼球を圧迫する。
4　眼から溢れた薬液は拭き取る。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	上眼瞼ではなく下眼瞼を下方に軽く引いて結膜嚢を露出させる。
2	誤答	容器の先端が眼瞼や睫毛に触れると汚染する。離して滴下する。
3	誤答	眼球は圧迫しない。点眼後は静かに閉眼し、目頭（涙嚢部）を軽く押さえて全身への吸収を減らす。
4	正答	眼からあふれた薬液は皮膚炎や色素沈着の原因になるため拭き取る。

公式正答：4　眼から溢れた薬液は拭き取る。

ポイント：複数の点眼薬は5分以上あけて点眼する。1滴で十分で、多く差しても効果は増えない。