第113回看護師国家試験（2024年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録11問（直接眼科2・関連領域5・弱い関連4）。実施日：令和6年2月11日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第113回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
113A14	必修	関連領域	脳死の状態（縮瞳）	3
113A19	必修	関連領域	膝蓋腱反射低下と夜盲症	1
113B08	必修	直接眼科	老化に伴う視覚の変化	1
113B25	必修	関連領域	緑内障患者への禁忌薬	3
113B26	一般	直接眼科	交感神経の興奮による眼の反応	1
113B34	一般	弱い関連	指鼻試験（視野の選択肢）	2
113B80	一般	弱い関連	咽頭結膜熱の原因ウイルス	4
113B84	一般	関連領域	Sjögren症候群（涙腺）	2・4
113B92	状況設定	関連領域	肺切除術の合併症（Horner症候群）	1
113B100	状況設定	弱い関連	急性糸球体腎炎（眼瞼浮腫）	2
113B101	状況設定	弱い関連	高血圧時の症状（眼のかゆみの選択肢）	2

113A14　脳死の状態（縮瞳）

区分：必修／分類：関連領域／主題：瞳孔所見と脳死／出典：午前問題PDF 10ページ

脳死の状態はどれか。

1　縮瞳がある。
2　脳波で徐波がみられる。
3　自発呼吸は停止している。
4　痛み刺激で逃避反応がある。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	脳死では瞳孔は散大・固定（両側4㎜以上）し、縮瞳はみられない。
2	誤答	脳波は平坦になる。
3	正答	脳幹機能の喪失により自発呼吸は停止し、無呼吸テストで確認する。
4	誤答	痛み刺激への反応はない。

公式正答：3　自発呼吸は停止している。

ポイント：脳死判定の項目は、深昏睡、瞳孔散大・固定、脳幹反射（対光・角膜反射など）の消失、平坦脳波、自発呼吸の停止。

113A19　膝蓋腱反射低下と夜盲症

区分：必修／分類：関連領域／主題：ビタミン欠乏と眼／出典：午前問題PDF 11ページ

膝蓋腱反射の低下で疑われる病態はどれか。

1　脚気
2　壊血病
3　くる病
4　夜盲症

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	脚気では末梢神経障害で腱反射が低下し、心不全（浮腫）を伴う。
2	誤答	壊血病はビタミンC欠乏で出血傾向。
3	誤答	くる病はビタミンD欠乏で骨の変形。
4	誤答	夜盲症はビタミンA欠乏で、網膜のロドプシン合成が障害され暗所で見えにくくなる。腱反射は保たれる。

公式正答：1　脚気

ポイント：ビタミンA欠乏は夜盲・角膜乾燥症（眼球乾燥症）を起こす。

113B08　老化に伴う視覚の変化

区分：必修／分類：直接眼科／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午後問題PDF 8ページ

老化に伴う視覚の変化で正しいのはどれか。

1　視野が狭くなる。
2　近くが見やすくなる。
3　色の識別がしやすくなる。
4　明暗順応の時間が短縮する。

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	加齢で周辺視野が狭くなり、転倒やぶつかりの原因になる。
2	誤答	老視で近くは見にくくなる。
3	誤答	水晶体の黄変で青系の色の識別がしにくくなる。
4	誤答	明暗順応の時間は延長する。

公式正答：1　視野が狭くなる。

ポイント：高齢者の環境調整は、十分な照明、段差の明示、暗所への急な移動を避ける。

113B25　緑内障患者への禁忌薬

区分：必修／分類：関連領域／主題：緑内障／出典：午後問題PDF 13ページ

緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。

1　コデイン
2　アスピリン
3　アトロピン
4　ジゴキシン
5　フェニトイン

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	コデインは鎮咳薬・鎮痛薬で緑内障の禁忌ではない。
2	誤答	アスピリンは禁忌ではない。
3	正答	アトロピンは散瞳により隅角が狭くなり房水の流出が妨げられ、急性緑内障発作を誘発し得る。
4	誤答	ジゴキシンは視覚異常（黄視）を起こすが緑内障の禁忌ではない。
5	誤答	フェニトインは禁忌ではない。

公式正答：3　アトロピン

ポイント：抗コリン作用をもつ薬（アトロピン、ブチルスコポラミン、三環系抗うつ薬、抗ヒスタミン薬など）は閉塞隅角緑内障で注意する。

臨床上の補足：添付文書上の禁忌は「閉塞隅角緑内障」で、治療中の開放隅角緑内障は多くが慎重投与。医師に確認する。

113B26　交感神経の興奮による眼の反応

区分：一般／分類：直接眼科／主題：自律神経と瞳孔／出典：午後問題PDF 13ページ

交感神経の興奮によって起こる眼の反応はどれか。

1　散瞳
2　流涙
3　明順応
4　対光反射

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	交感神経は瞳孔散大筋を収縮させ散瞳する。
2	誤答	涙腺分泌は副交感神経（顔面神経）が促進する。
3	誤答	明順応は網膜の錐体細胞の働きで、交感神経の反応ではない。
4	誤答	対光反射は副交感神経（動眼神経）による縮瞳。

公式正答：1　散瞳

ポイント：散瞳＝交感、縮瞳＝副交感。有機リン中毒（副交感優位）で縮瞳、抗コリン薬で散瞳。

113B34　指鼻試験（視野の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：神経学的検査と視野／出典：午後問題PDF 15ページ

指鼻試験で評価するのはどれか。

1　視野
2　小脳機能
3　表在反射
4　複合知覚

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	視野は対座法や視野計で評価する。
2	正答	指鼻試験では測定障害や企図振戦を観察し、小脳機能を評価する。
3	誤答	表在反射は腹壁反射など。
4	誤答	複合知覚は二点識別覚や立体覚。

公式正答：2　小脳機能

113B80　咽頭結膜熱の原因ウイルス

区分：一般／分類：弱い関連／主題：結膜炎を起こす感染症／出典：午後問題PDF 31ページ

感染症と代表的な原因ウイルスの組合せで正しいのはどれか。

1　手足口病 ― アデノウイルス
2　咽頭結膜熱 ― ヒトパピローマウイルス〈HPV〉
3　突発性発疹症 ― コクサッキーウイルス
4　伝染性単核球症 ― Epstein-Barr〈EB〉ウイルス
5　ヘルパンギーナ ― 単純ヘルペスウイルス

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	手足口病はコクサッキーウイルスやエンテロウイルス。
2	誤答	咽頭結膜熱はアデノウイルスによる。発熱・咽頭炎・結膜炎が三徴で、学校感染症第二種。
3	誤答	突発性発疹はヒトヘルペスウイルス6・7型。
4	正答	伝染性単核球症はEpstein-Barrウイルスによる。
5	誤答	ヘルパンギーナはコクサッキーウイルスA群。

公式正答：4　伝染性単核球症 ― Epstein-Barr〈EB〉ウイルス

ポイント：アデノウイルスは咽頭結膜熱と流行性角結膜炎（はやり目）の原因で、接触感染対策（タオルの共用禁止、手洗い）が重要。

113B84　Sjögren症候群（涙腺）

区分：一般／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（Sjögren症候群）／出典：午後問題PDF 33ページ

Sjögren〈シェーグレン〉症候群でリンパ球が浸潤して障害が起こるのはどれか。2つ選べ。

1　胸腺
2　涙腺
3　甲状腺
4　唾液腺
5　副甲状腺

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	胸腺は重症筋無力症と関連。
2	正答	涙腺の障害で涙液分泌が減り、乾燥性角結膜炎（ドライアイ）になる。
3	誤答	甲状腺は橋本病などの自己免疫疾患で障害される。
4	正答	唾液腺の障害で口腔乾燥、う歯の増加が起こる。
5	誤答	副甲状腺は関与しない。

公式正答：2　涙腺、4　唾液腺

ポイント：ドライアイの看護は人工涙液の点眼、加湿、長時間の画面注視を避ける指導。シルマー試験で涙液量を測る。

113B92　肺切除術の合併症（Horner症候群）

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（Horner症候群）／出典：午後問題PDF 36ページ

> 【状況設定文】A さん（58歳、男性、会社員）は、身長175cm、体重73kgである。A さんは、健康診断の胸部エックス線撮影で異常陰影を指摘され、3週前に胸部造影CT検査を受けた。左肺下葉に約8mmの病変が見つかり、精密検査の結果、肺癌（T1N0M0）と診断され、本日、手術目的で入院した。咳嗽、息苦しさ、喀痰はない。喫煙歴があり、20年間20本/日、禁煙後18年である。バイタルサイン：体温36.9℃、呼吸数14/分、脈拍72/分、整、血圧136/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%（room air）。検査所見：赤血球510万/μL、Hb 15.6g/dL、Ht 47%、白血球6,200/μL、血小板32万/μL、総蛋白7.7g/dL、アルブミン4.2g/dL、空腹時血糖102mg/dL。呼吸機能所見：%VC 76%、FEV1% 73%。

A さんは、入院2日目に胸腔鏡下左下葉切除術を受ける予定である。A さんは看護師に「全身麻酔で手術を受けるのは初めてです。医師から手術の説明はあったけれど、合併症についてもう一度教えてもらえますか」と質問した。A さんに生じる可能性が高い合併症はどれか。

1　気胸
2　反回神経麻痺
3　Horner〈ホルネル〉症候群
4　Pancoast〈パンコースト〉症候群

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	肺の切除後は肺瘻（エアリーク）による気胸が起こり得るため、胸腔ドレーンの管理と呼吸状態の観察を行う。
2	誤答	反回神経麻痺は上縦隔や甲状腺の手術で起こりやすい。
3	誤答	Horner症候群は頸部交感神経の障害で縮瞳・眼瞼下垂・眼裂狭小・顔面の発汗低下を起こす。肺尖部腫瘍の浸潤で生じ、左下葉の手術では起こりにくい。
4	誤答	Pancoast症候群は肺尖部腫瘍による腕神経叢浸潤で上肢の疼痛や筋萎縮を起こす。

公式正答：1　気胸

ポイント：Horner症候群の三徴（縮瞳・眼瞼下垂・眼球陥凹）は第112回午前48の肺尖部肺癌の設問と合わせて覚える。

113B100　急性糸球体腎炎（眼瞼浮腫）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：全身疾患と眼（腎炎の眼瞼浮腫）／出典：午後問題PDF 42ページ

> 【状況設定文】A ちゃん（7歳、女児）は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に来院した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、A ちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数84/分、血圧130/80mmHgで、床上安静の指示が出された。

A ちゃんの入院時の看護計画で適切なのはどれか。

1　水分摂取を促す。
2　1日3回の血圧測定を行う。
3　食事の持ち込みを許可する。
4　腰部に消炎鎮痛薬を貼用する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	乏尿・浮腫があるため水分は制限する。
2	正答	高血圧性脳症や心不全を防ぐため血圧を定期的に測定し、安静を保つ。
3	誤答	塩分・蛋白質の制限があるため持ち込みは許可しない。
4	誤答	腰部の痛みはなく、消炎鎮痛薬は腎機能に影響する。

公式正答：2　1日3回の血圧測定を行う。

ポイント：腎性浮腫は組織の緩い眼瞼に朝方から現れやすく、腎疾患を疑う所見になる。

113B101　高血圧時の症状（眼のかゆみの選択肢）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：全身疾患と眼（腎炎の眼瞼浮腫）／出典：午後問題PDF 42ページ

> 【状況設定文】A ちゃん（7歳、女児）は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に来院した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、A ちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数84/分、血圧130/80mmHgで、床上安静の指示が出された。

入院3日。両眼瞼の浮腫と肉眼的血尿は続いていた。看護師がA ちゃんのベッドサイドを訪れると、A ちゃんは「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。A ちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数92/分、血圧148/88mmHgであった。この状況からA ちゃんに起こりうる症状はどれか。

1　眼のかゆみ
2　意識障害
3　耳漏
4　鼻閉

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	眼のかゆみはアレルギー性結膜炎の症状で、この状況とは関係がない。
2	正答	血圧148/88mmHgと頭痛・嘔気は高血圧性脳症の前兆で、意識障害・けいれんに進み得る。
3	誤答	耳漏は中耳炎。
4	誤答	鼻閉は関係がない。

公式正答：2　意識障害

ポイント：小児の血圧は成人基準より低く、学童で130/80mmHg以上は高血圧。