第114回看護師国家試験（2025年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録9問（直接眼科2・関連領域4・弱い関連3）。実施日：令和7年2月16日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第114回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
114A11	必修	直接眼科	眼球運動を行う神経	2
114A31	一般	弱い関連	重症筋無力症の合併症	1
114A80	一般	関連領域	Ⅱ型アレルギー（アレルギー性結膜炎）	5
114A86	一般	関連領域	末梢性顔面神経麻痺の症状（眼瞼・複視）	3・5
114A97	状況設定	弱い関連	JCS（開眼）	2
114B52	一般	直接眼科	散瞳薬を用いた眼底検査の説明	4
114B56	一般	関連領域	内視鏡検査前の確認（白内障）	4
114B88	一般	関連領域	高齢者の感覚器の変化（暗順応）	2・4
114B118	状況設定	弱い関連	災害時の感染予防（ゴーグル）	1

114A11　眼球運動を行う神経

区分：必修／分類：直接眼科／主題：脳神経と眼（対光反射・眼球運動）／出典：午前問題PDF 9ページ

眼球運動を行う神経はどれか。

1　視神経
2　外転神経
3　顔面神経
4　三叉神経

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	視神経は網膜からの視覚情報を伝える感覚神経で、眼球を動かさない。
2	正答	外転神経は外側直筋を支配し、眼球を外側に向ける。
3	誤答	顔面神経は表情筋（閉眼）を支配する。
4	誤答	三叉神経は顔面の知覚と咀嚼筋を支配する。

公式正答：2　外転神経

ポイント：動眼神経は上直筋・下直筋・内側直筋・下斜筋・上眼瞼挙筋と瞳孔括約筋、滑車神経は上斜筋、外転神経は外側直筋。

整理：麻痺すると複視が起こる。外転神経麻痺では内斜視になる。

114A31　重症筋無力症の合併症

区分：一般／分類：弱い関連／主題：重症筋無力症と眼／出典：午前問題PDF 15ページ

重症筋無力症myasthenia gravis に合併する頻度が最も高いのはどれか。

1　胸腺腫
2　胸膜中皮腫
3　甲状腺腫瘍
4　悪性リンパ腫

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	重症筋無力症の約10～20%に胸腺腫、多くに胸腺過形成がみられ、胸腺摘出術の適応になる。
2	誤答	胸膜中皮腫はアスベスト曝露と関連。
3	誤答	甲状腺腫瘍との合併頻度は高くない。
4	誤答	悪性リンパ腫は関連しない。

公式正答：1　胸腺腫

ポイント：眼筋型では眼瞼下垂と複視が主症状で、夕方に悪化する日内変動が特徴。

114A80　Ⅱ型アレルギー（アレルギー性結膜炎）

区分：一般／分類：関連領域／主題：アレルギーと眼／出典：午前問題PDF 30ページ

Ⅱ型アレルギーで起こる疾患はどれか。

1　糸球体腎炎
2　関節リウマチ
3　アトピー性皮膚炎
4　アレルギー性結膜炎
5　特発性血小板減少性紫斑病〈ITP〉

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	糸球体腎炎は免疫複合体によるⅢ型。
2	誤答	関節リウマチはⅢ型（およびⅣ型）の機序。
3	誤答	アトピー性皮膚炎はⅠ型を中心とする。
4	誤答	アレルギー性結膜炎は花粉などへのIgE抗体による即時型（Ⅰ型）。かゆみ・充血・流涙が出る。
5	正答	ITPは血小板に対する自己抗体で血小板が破壊されるⅡ型。

公式正答：5　特発性血小板減少性紫斑病〈ITP〉

ポイント：眼のアレルギー疾患はⅠ型が中心。春季カタルやアトピー性角結膜炎は重症型で角膜障害を伴う。

114A86　末梢性顔面神経麻痺の症状（眼瞼・複視）

区分：一般／分類：関連領域／主題：顔面神経と眼／出典：午前問題PDF 32ページ

片側性の末梢性顔面神経麻痺の症状はどれか。2つ選べ。

1　眼瞼が下垂する。
2　顔面の知覚が鈍い。
3　口角が垂れ下がる。
4　物が二重に見える。
5　額にできるしわに左右差がある。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	眼瞼下垂は上眼瞼挙筋（動眼神経）の障害。顔面神経麻痺では眼輪筋が働かず「閉じられない」状態になる。
2	誤答	顔面の知覚は三叉神経の支配で保たれる。
3	正答	口輪筋の麻痺で口角が下がり、水が漏れる。
4	誤答	複視は外眼筋を動かす動眼・滑車・外転神経の障害で起こる。
5	正答	末梢性では前頭筋も麻痺し額のしわに左右差が出る。中枢性では額のしわは保たれる。

公式正答：3　口角が垂れ下がる。、5　額にできるしわに左右差がある。

ポイント：閉眼不全があると角膜が乾燥し角膜炎・潰瘍を起こすため、点眼・眼軟膏と就寝時の眼の保護（テープ・眼帯）が看護のポイント。

整理：「眼瞼下垂＝動眼神経」「閉眼不全＝顔面神経」を混同しない。

臨床上の補足：Bell麻痺やRamsay Hunt症候群が代表。

114A97　JCS（開眼）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：意識レベル評価と開眼／出典：午前問題PDF 38ページ

> 【状況設定文】A さん（50歳、女性、会社員）は、職場で激しい頭痛を訴えて倒れ、意識を失って、救急搬送された。救命救急センター到着時のバイタルサインは、体温36.7℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧168/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%（room air）であった。閉眼していたので、大声で話しかけると開眼したが、すぐに閉眼して眠り込んでしまう。

A さんの意識レベルは、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で評価するとどれか。

1　Ⅱ-10
2　Ⅱ-20
3　Ⅲ-100
4　Ⅲ-200

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	Ⅱ-10は普通の呼びかけで開眼する。
2	正答	Ⅱ-20は大きな声または体をゆさぶることで開眼する。刺激をやめると眠る。
3	誤答	Ⅲ-100は痛み刺激に払いのける動作をするが開眼しない。
4	誤答	Ⅲ-200は痛み刺激で少し手足を動かす。

公式正答：2　Ⅱ-20

ポイント：JCSのⅠ桁は開眼している、Ⅱ桁は刺激で開眼する、Ⅲ桁は刺激しても開眼しない。開眼の有無が評価の軸になる。

114B52　散瞳薬を用いた眼底検査の説明

区分：一般／分類：直接眼科／主題：検査・散瞳／出典：午後問題PDF 21ページ

散瞳薬を用いた眼底検査を受ける成人への説明で適切なのはどれか。

1 「角膜を観察します」
2 「検査後に抗菌薬を点眼します」
3 「眼を閉じた状態で検査室に誘導します」
4 「点眼後30 分で散瞳薬の効果が現れます」

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	眼底検査で観察するのは網膜・視神経乳頭・血管。角膜は前眼部の検査で見る。
2	誤答	散瞳薬を点眼して検査するが、検査後に抗菌薬を点眼する決まりはない。
3	誤答	眼を閉じて誘導する必要はない。散瞳後はまぶしいので暗い場所で待ってもらう。
4	正答	散瞳薬（トロピカミドなど）は点眼後20〜30分で散瞳し、数時間続くため、効果発現までの待ち時間を説明する。

公式正答：4 「点眼後30 分で散瞳薬の効果が現れます」

ポイント：第109回午後52と同じ主題。散瞳薬使用時は閉塞隅角緑内障の有無の確認、検査後の羞明・近見障害、自動車運転の禁止を説明する。

臨床上の補足：急性緑内障発作の既往や浅前房のある患者には散瞳薬が禁忌になる。

114B56　内視鏡検査前の確認（白内障）

区分：一般／分類：関連領域／主題：検査前の確認（緑内障と白内障の区別）／出典：午後問題PDF 23ページ

A さん（81 歳、男性）は、大腸内視鏡検査を受けることになった。検査前にA さんへ看護師が確認する項目で最も優先されるのはどれか。

1　義歯の使用
2　白内障cataract の有無
3　保持できない姿勢
4　前立腺肥大症の有無

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	義歯は上部消化管内視鏡で重要。
2	誤答	白内障は水晶体の混濁で、抗コリン薬の禁忌ではない。禁忌になるのは閉塞隅角緑内障。
3	誤答	体位保持は確認するが最優先ではない。
4	正答	ブチルスコポラミンなどの抗コリン薬は尿閉を起こすため、前立腺肥大症は最優先で確認する。

公式正答：4　前立腺肥大症の有無

ポイント：抗コリン薬の禁忌は「緑内障・前立腺肥大症・重篤な心疾患・麻痺性イレウス」。緑内障と白内障を取り違える設問。

臨床上の補足：実際には点眼で管理された開放隅角緑内障は多くの場合問題にならず、閉塞隅角かどうかを確認する。

114B88　高齢者の感覚器の変化（暗順応）

区分：一般／分類：関連領域／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午後問題PDF 34ページ

高齢者における感覚器の変化の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1　高音域の聴力が保持される。
2　痛覚の感受性が低下する。
3　味覚の閾値が低下する。
4　暗順応が低下する。
5　嗅覚は保持される。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	高音域から聴力が低下する（老人性難聴）。
2	正答	痛覚・温度覚の感受性が低下し、けがややけどに気付きにくい。
3	誤答	味覚の閾値は上昇し、味を感じにくくなる。
4	正答	瞳孔が小さくなり、網膜の感度も落ちるため暗い場所への順応に時間がかかる。夜間の転倒予防に関わる。
5	誤答	嗅覚は低下する。

公式正答：2　痛覚の感受性が低下する。、4　暗順応が低下する。

ポイント：視覚の加齢変化は、老視、暗順応の低下、視野の狭小化、色（青系）の識別低下、まぶしさの増加。

臨床上の補足：夜間はフットライトを置き、急に暗い場所へ移動させない。

114B118　災害時の感染予防（ゴーグル）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：個人防護具と眼の防護／出典：午後問題PDF 54ページ

> 【状況設定文】午後1時に震度6強の地震が発生し、避難所が開設された。地震発生の2時間後、避難所に救護所が設置され、近隣の病院から医療救護班が派遣された。医療救護班が複数の被災者に対応するなか、A さん（54歳、男性）が搬送されてきた。A さんは右大腿部に4cmの切創があり出血部位をタオルで押さえている。すぐに看護師が切創部の処置を介助することになった。

このときの看護師の感染予防対策で正しいのはどれか。

1　ゴーグルを装着して処置の介助を行う。
2　使い捨て手袋を1時間ごとに交換する。
3　処置を行う前に破傷風のワクチンを受ける。
4　看護師が着用するガウンにA さん用と記載しA さん専用にする。

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	血液・体液が眼に入る曝露を防ぐため、飛散が予想される処置ではゴーグルやフェイスシールドを着用する（標準予防策）。
2	誤答	手袋は処置ごと・患者ごとに交換し、時間で交換するものではない。
3	誤答	破傷風予防は受傷者に必要な対応で、看護師が処置前に接種するものではない。
4	誤答	ガウンは処置ごとに交換・廃棄する。

公式正答：1　ゴーグルを装着して処置の介助を行う。

ポイント：眼の結膜は粘膜で、血液媒介感染（B型肝炎など）の曝露経路になる。