

Results of *Gastrocnemius* Muscle Weight in Each Treatment Group

Group 1. *Autograft* treatment

Group <i>Autograft</i>	M. <i>gastrocnemius</i> (grams)		<i>Gastrocnemius</i> Muscle Weight Ratio
	Right	Left	
I	1,52	2,28	0.67
II	1,26	1,9	0.66
III	1,46	2,12	0.69
IV	1,84	2,58	0.71
V	1,08	1,96	0.55
VI	1,8	2,7	0.67
VII	1,56	2,7	0.58

Group 2. Treatment with umbilical cord MSC

Group Umbilical Cord MSC	M. <i>gastrocnemius</i> (grams)		<i>Gastrocnemius</i> Muscle Weight Ratio
	Right	Left	
I	0,70	2,30	0.30
II	0,58	1,98	0.29
III	0,68	1,86	0.37
IV	-	-	die
V	0,52	1,85	0.28
VI	0,50	1,92	0.26
VII	0,38	2,06	0.18

Group 3. Treatment with umbilical cord MSC secretome

Secretariat Group	M. <i>gastrocnemius</i> (grams)		<i>Gastrocnemius</i> Muscle Weight Ratio
	Right	Left	
I	1,38	1,86	0.74
II	1,68	2,36	0.71
III	2,12	2,22	0.95
IV	0,78	1,74	0.45
V	0,68	1,46	0.47
VI	1,30	2,14	0.61
VII	1,62	2,12	0.76

Group 4. Treatment with *Conduit* Only

<i>Conduit</i> group only	<i>M. gastrocnemius</i> (grams)		<i>Gastrocnemius</i> Muscle Weight Ratio
	Right	Left	
I	0.3	1.25	0.24
II	0.48	2.4	0.20
III	0.58	1.9	0.31
IV	0.4	2.06	0.19
V	1.28	2.38	0.54
VI	0.54	2.74	0.20
VII	0.88	1.84	0.48