

Sisteme de generatori și sisteme liniar-independente

1. Determinați dimensiunea spațiului generat de următorii vectori

(a)

$$x_1 = (1, 2, 3); x_2 = (4, 5, 6); x_3 = (7, 8, 9); x_4 = (10, 11, 12).$$

(b)

$$x_1 = (1, -1, 0, 0); \quad x_2 = (0, 1, -1, 0); \quad x_3 = (0, 0, 1, -1); \\ x_4 = (0, 0, 0, 1); \quad x_5 = (7, -3, -4, 5).$$

2. Extrageți câte o bază din sistemele de vectori următoare:

(a)

$$x_1 = (-1, 4, -3, -2); x_2 = (3, -7, 5, 3); x_3 = (3, -2, 1, 0); x_4 = (-4, 1, 0, 1).$$

(b)

$$x_1 = (3 - i, 1 - 2i, -7 + 5i, 4 + 3i); \quad x_2 = (1 + 3i, 1 + i, -6 - 7i, 4i); \\ x_3 = (0, 1, 1, -3).$$

3. Determinați toate bazele (de cardinal maxim) care se pot extrage dintre vectorii

$$x_1 = (1 + i, 1 - i, 2 + 3i); \quad x_2 = (i, 1, 2); \quad x_3 = (1 - i, -1 - i, 3 - 2i); \\ x_4 = (4, -4i, 10 + 2i).$$

4. Verificați că vectorii e_1, \dots, e_n formează o bază și scrieți descompunerea vectorului x în raport cu această bază:

(a)

$$e_1 = (2, 2, -1), e_2 = (2, -1, 2), e_3 = (-1, 2, 2); x = (1, 1, 1).$$

(b)

$$e_1 = (1, 2, 1, 1), \quad e_2 = (2, 3, 1, 0), \quad e_3 = (1, 2, 1, 4), \\ e_4 = (4, 2, -1, -6); \quad x = (0, 0, 2, 7).$$

5. Descompuneți polinomul $X^5 - X^4 + X^3 - X^2 - X + 1$ în raport cu bazele

- (a) $\{1, X, X^2, X^3, X^4, X^5\}$;
- (b) $\{1, X + 1, X^2 + 1, X^3 + 1, X^4 + 1, X^5 + 1\}$;
- (c) $\{1 + X^3, X + X^3, X^2 + X^3, X^3, X^4 + X^3, X^5 + X^3\}$

6. Determinați dimensiunea și câte o bază în subspațiul generat de vectorii

$$\begin{aligned}x_1 &= (1, 2, 2, -1); \quad x_2 = (2, 3, 2, 5); \quad x_3 = (-1, 4, 3, -1); \\x_4 &= (2, 9, 3, 5).\end{aligned}$$

7. Fie $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice de rang r . Fie $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}^m$ coloanele lui A . Arătați că $\dim \text{Sp}\{c_1, \dots, c_m\} = r$. Formulați un rezultat analog pentru liniile lui A .