**(ENSP** elearning.ensp.ac.ma

Dispositif Minimum d'Urgence en Santé Sexuelle et Reproductive\_Session\_ Juin 2023 Tableau de bord / Mes cours / DMU-SSR-2023 / Prise en main de la plateforme (26 & 27 juin 2023) / Pré-test

Navigation du test Question 1Vous avez tenté de vous procurer des Kits d'accouchement hygiénique via l'UNFPA. Malheureusement, des problèmes de logistique ont énormément retardé leur arrivée. Que

faites-vous pour redresser la situation? Réponse enregistrée

Noté sur 1,00 ☑ a. Vous décidez au cours de la réunion de santé reproductive où vous procurer les kits Marquer la ☑ b. Vous vous procurez localement les éléments du kit et vous les assemblez sur place question C. Vous signez un contrat avec une agence locale pour qu'elle produise des kits

☐ d. Vous faites la commande des kits auprès d'une autre source d'approvisionnement et attendez qu'elle arrive Question **2** Le rôle du professionnel de la santé dans la prévention et la gestion des conséquences de la violence sexuelle, consiste dans la triade suivante : Terminer le test..

Réponse enregistrée O a. Réponse, suivi, réhabilitation Noté sur 1,00 O b. Détection, prévention, réponse Marquer la question O c. Prévention, réponse et planification • d. Coordination, prévention, réponse Effacer mon choix

Question **3** Concernant les phases d'évolution spontanée de l'infection par le VIH : Réponse enregistrée

O a. Le dépistage du VIH n'est pas indiqué Noté sur 1,00 • b. Les 3 phases sont : phase de primo-infection, la phase de latence clinique et la phase sida maladie Marquer la O c. Durant la phase de primo-infection, la réplication virale est faible question O d. Durant la phase de primo-infection, les personnes infectées par le VIH ne peuvent pas transmettre le virus tout en ayant une sérologie négative

Effacer mon choix

☐ a. Des latrines

☑ a. 7j/7j

□ b. Du lundi au Vendredi

faites-vous pour redresser la situation?

☐ c. De 7h à 19h

☑ d. 24H/24H

O a. 25 %

• b. 15 %

O c. 20 %

O d. 4%

• a. 21 jours

O b. 6 mois

O c. 6 semaines

Effacer mon choix

• c. Les soins prénatals

Effacer mon choix

✓ b. Des soins prénatals

✓ c. Des transfusions de sang sécurisées

Etat de stress post traumatique

Plaies ou écorchures sur le corps

Infections sexuellement transmissibles

☑ a. Les enfants mineurs non accompagnés et séparés

☑ d. Les communautés des migrants, surtout les femmes

☑ c. Co-animer des formations sur le VIH/SIDA

☑ a. S'assurer que les réunions de coordination de SSR sont établies

☑ b. Communiquer les besoins en équipements à l'UNFPA et à d'autres agences

☑ d. Organiser des actions de sensibilisation de la communauté à la prévention des IST

Des préservatifs féminins sont mis à disposition dans les kits de SSR inter-organisations

La prévention de la grossesse suite à un viol utilise la méthode suivante dans les 72h jusqu'à 120h:

O c. La charge virale correspond à la distance par rapport au terme de la maladie

☐ d. Touche 3 hommes pour 2 femmes au niveau national, à prédominance rurale

☑ a. Hétérogène, concentrée chez les populations clés avec prédominance de la transmission sexuelle

□ b. Homogène, concentrée chez les populations clés avec prédominance de la transmission sanguine

☑ d. Une équipe médicale apte à réaliser des accouchements par césarienne, disponible 24 h/24, 7 j/7

Après l'accouchement une femme non allaitante peut commencer la pilule micro progestative :

🗹 c. Vous vous assurez que des médecins qualifiés soient disponibles dans l'hôpital de référence

☑ d. Organiser des formations de maternité sans risques pour le personnel médical

☑ c. Éviter les transfusions sanguines pour des pathologies qui ne sont pas sévères

Les populations Clés cible du Programme National de Lutte contre le Sida sont :

☑ d. Choisir les donneurs de sang parmi la communauté déplacée

🔲 c. Prévalence la plus élevée dans la région de Casablanca-Settat, concerne surtout la population jeune

Quels sont les besoins d'un établissement de référence pour fournir des soins obstétricaux d'urgence complets?

Vous coordonnez la mise en place du DMU. Vous faites en sorte que les soins obstétricaux d'urgence soient disponibles dans la clinique du camp. Quelles mesures prenez-vous?

☑ b. Vous établissez un système de communication pour consulter des prestataires qualifiés afin d'obtenir des directives pour la référence

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les activités qui doivent être entreprises afin de garantir la sécurité transfusionnelle?

O a. Les Professionnels de Sexe, les Hommes ayant des relations Sexuelles avec les Hommes, les usagers de drogue injectables

O c. Les Professionnels de Sexe, les Hommes ayant des relations Sexuelles avec les Hommes, les usagers de drogues

☑ b. Le Professionnel de santé peut demander le test de dépistage VIH sans le consentement du patient

☑ c. La stigmatisation et la discrimination des Personnes Vivant avec le VIH constituent un obstacle à l'accès aux soins

☐ d. Démontre la volonté du Maroc d'intégrer une approche basée sur les droits de l'Homme dans la riposte au sida

O a. Durant la phase de latence clinique, le sujet reste asymptomatique et les sérologies du VIH sont négatives

O d. La durée est courte durant lesquels le sujet infecté reste asymptomatique

Quelle(s) situation(s) expose(nt) les femmes aux risques de violence sexuelle?

☑ c. La plupart (et non l'ensemble) des officiers de protection sont des femmes

Après l'accouchement, une femme allaitante peut commencer la prise de la pilule oestro progestative :

Que conseillez-vous après un rapport sexuel non protégé pour pévenir une grossesse non désirée ?

Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces mesures n'empêche pas les violences sexuelles dans une situation de crise ?

• b. Mettre en place des installations de bains publics au sein des camps pour les hommes et les femmes

O c. Impliquer les femmes dans le processus de prise de décisions quant à l'agencement du site/camp

☑ a. Le manque de disponibilité en combustibles dans ou près du camp

✓ b. Les hommes distribuent des vivres et d'autres biens

✓ d. Des chemins éclairés vers les latrines avoisinantes

O a. A n'importe quel moment après l'accouchement

a. Se faire insérer un dispositif intra utérin

O d. Prendre une pilule oestro progestative

O e. Prendre une pilule microprogestative

O c. Aucune réponse n'est juste

Effacer mon choix

Effacer mon choix

O a. 1 an

• b. 3 mois

O c. 1 mois

O d. 6 mois

Effacer mon choix

• b. Prendre la pilule pour la contraception d'urgence dans les 72 heures

O a. Impliquer les femmes dans la distribution de matériaux et fournitures

O d. S'assurer que les femmes ont leurs propres cartes d'enregistrement

Pour quelle durée d'utilisation les kits de SSR sont-ils conçus ?

Le code contre l'exploitation et les abus sexuels s'applique :

✓ a. Des installations pour un lavage des mains fréquent

☑ d. Une utilisation en toute sécurité d'objets tranchants

☑ b. au personnel humanitaire de la région

☑ d. au personnel des ONG internationales

✓ c. au personnel de l'ONU

O d. Réponse A et C

Effacer mon choix

œuvre?

☐ a. à des individus employés à cet effet par la population locale

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont requises pour la prévention des infections ?

Le Programme National de l'Élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant recommande de:

• b. Prévenir la transmission du VIH de la femme enceinte vivant avec le VIH (FEVVIH) à son enfant

☐ d. Une bonne adhérence au traitement ARV permet de maintenir une charge virale indétectable

☑ a. Communiquer les besoins en équipements à l'UNFPA et à d'autres agences

Que conseillez-vous en cas d'oubli de prise d'une pilule micro progestative?

DMU-SSR-2023

Obtenir l'app mobile

☑ c. Organiser des actions de sensibilisation de la communauté à la prévention des IST

• a. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement avec une protection supplémentaire pendant 7 jours

Aller à...

Résumé de conservation de données

Connecté sous le nom « Khadija OUSAYR » (Déconnexion)

☑ b. S'assurer que les réunions de coordination de SSR sont établies

☑ d. Co-animer des formations sur le VIH/SIDA

O d. Prendre la pilule oubliée et continuer normalement

O b. Prendre 2 pilules

Effacer mon choix

→ Renseignez votre fiche personnelle

O c. Aucune réponse n'est juste

O c. Interdire aux femmes vivant avec le VIH (FVVI) d'avoir des enfants pour protéger les nouveaux nés

☑ a. Le traitement par les ARV inverse la progression de l'infection par le VIH, réduit la charge virale et augmente le taux des CD4

□ b. Le traitement par les Antirétroviraux (ARV) inverse la progression de l'infection et limite la transmission du VIH

☑ c. Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des équipements médicaux

Décrire l'impact du traitement sur l'évolution de l'infection par le VIH

☑ b. La mise au rebut des déchets médicaux grâce à des matériaux inflammables et la mise en terre d'objets coupants loin de l'établissement de santé

O a. Offrir une contraception adaptée aux FVVIH pour éviter les grossesses non désirées et développer des liens avec les services de santé sexuelle et reproductive

Le traitement par les Antirétroviraux (ARV) inverse la progression de l'infection par le VIH, réduit le taux des CD4 et augmente la charge virale

Vous êtes le nouveau Coordinateur SSR et vous venez d'arriver dans une situation d'urgence. Quelles sont les quelques premières mesures de SSR que vous pouvez déjà mettre en

Terminer le test..

• b. Aucune réponse n'est juste

O c. 40 jours

O e. 21 jours

Od. Avant 6 semaines

Effacer mon choix

☐ c. En l'absence de traitement, l'infection à VIH connait une évolution spontanée en 3 phases

☐ b. Tous les sujets infectés évoluent vers le stade sida maladie

• c. La sérologie VIH est positive car les anticorps anti-VIH sont présents à ce stade en quantité suffisante pour être détectés

🗹 a. S'assurer de la sécurité de tout sang utilisé pour les transfusions en effectuant des tests du VIH et d'autres maladies transmissibles par voie sanguine

O b. Les Professionnels de Sexe, les Hommes ayant des relations Sexuelles avec les Hommes, les usagers de drogue injectables et les Professionnels de Santé

• d. Les Professionnels de Sexe, les Hommes ayant des relations Sexuelles avec les Hommes, les usagers de drogue injectables, les migrants et les détenus

La stratégie Nationale des Droits Humains et le Sida mise en œuvre par le Ministère de la santé et de la Protection Sociale et le Conseil National des Droits de l'Homme:

a. Correspond à l'évolution spontanée de la maladie, et l'ordre habituel et prévisible dans lequel apparaissent ses différentes manifestations (cliniques, biologiques et immunologiques)

d. Correspond à l'évolution spontanée de la maladie, et l'ordre habituel et prévisible dans lequel apparaissent ses différentes manifestations (cliniques, biologiques et immunologiques)

Les professionnels de Santé ne peuvent pas rompre le secret professionnel pour protéger la vie du conjoint/partenaire même après le décès du patient

Le système immunitaire est encore assez fort pour protéger l'organisme mais la réplication virale est plus forte que pendant la primo-infection

S'assurer de la disponibilité suffisante de tests sanguins pour le VIH ou d'autres maladies et des fournitures pour les analyses de sang

Vous vous assurez que le personnel qualifié à la clinique du camp est uniquement disponible la journée afin de stabiliser le patient en lui prodiguant des soins obstétricaux de base

O d. Le taux de CD4 correspond à la vitesse d'évolution de la maladie

• a. La charge virale (CV) et taux de lymphocytes CD4 sont les 2 paramètres biologiques témoignant de l'évolution de l'infection à VIH

O b. La numération formule sanguine (NFS) et la C-Réactive Protéine (CRP) sont les 2 marqueurs biologiques de l'infection à VIH

Les kits d'accouchement hygiénique doivent être fournis à toute femme âgée de plus de 20 ans

☐ b. Fistule vésico - vaginale

☐ d. Traumatisme à l'anus

g. Angoisse

☐ h. Dépression

☐ i. Trouble de sommeil

✓ b. Les femmes âgées

Sélectionnez une réponse :

Sélectionnez une réponse :

• a. La pilule du lendemain

O b. Condom féminin

O d. Dispositif intra utérin

Marqueurs biologiques de l'infection par le VIH

Effacer mon choix

Effacer mon choix

L'épidémie de Sida au Maroc est :

✓ a. Des transfusions de sang sécurisées

O d. A n'importe quel moment après l'accouchement

✓ b. Des soins prénatals

C. Pédiatrie

a. 6 semaines

• b. 21 jours

O c. 2 mois

O e. 40 jours

Effacer mon choix

Effacer mon choix

**Durant la phase de latence :** 

Effacer mon choix

L'histoire naturelle de la maladie :

sous traitement

en l'absence de traitement

O c. Les injectables

œuvre?

O Vrai

Faux

O Vrai

Faux

✓ c. Les jeunes filles adolescentes

☐ e. Grossesses non désirées

Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont justes :

a. Pédiatrie

O e. A n'importe quel moment après l'accouchement

O d. L'accès à la contraception d'urgence et la prophylaxie post-exposition

O a. La garantie de la protection physique

O b. La prise en charge psychosociale

O d. 40 jours

Effacer mon choix

Les préservatifs peuvent être mis à disposition dans :

☐ b. Des points de distribution alimentaire

✓ d. Des établissements de santé

Les trois modes de transmission du VIH:

✓ c. Des bureaux de services communautaires

a. La prévention des Accidents d'Exposition au Sang n'a pas d'impact dans la prévention du VIH

☑ a. Vous vous procurez localement les éléments du kit et vous les assemblez sur place

☐ d. Vous décidez au cours de la réunion de santé reproductive où vous procurer les kits

c. Vous faites la commande des kits auprès d'une autre source d'approvisionnement et attendez qu'elle arrive

Quel sera approximativement le pourcentage de femmes enceintes par rapport à la population déplacée à un temps donné?

Après l'accouchement, une femme non allaitante peut commencer la prise de la contraception oestro progestative :

Quel service n'est PAS lié au DMU pour les femmes et les filles qui sont des survivantes d'une violence sexuelle ?

Quels sont les besoins d'un établissement de référence pour fournir des soins obstétricaux complets ?

☑ d. Une équipe médicale apte à réaliser des accouchements par césarienne, disponible 24 h/24, 7 j/7

Les conséquences physiques des violences sexuelles comprennent les affections ou problèmes suivants sauf :

☑ a. Vous vous assurez que des médecins qualifiés soient disponibles dans l'hôpital de référence

Parmi les populations à plus haut risque de violence sexuelle dans les situations de crise on peut citer:

☑ d. Vous établissez un système de communication pour consulter des prestataires qualifiés afin d'obtenir des directives pour la référence

☑ b. Organiser des formations de maternité sans risques pour le personnel médical

☐ d. Le niveau communautaire/poste santé dans la gestion d'urgence humanitaire n'est pas concerné par le traitement clinique des survivantes au viol

Vous coordonnez la mise en place du DMU. Vous faites en sorte que les soins obstétricaux d'urgence soient disponibles dans la clinique du camp. Quelles mesures prenez-vous?

🗹 c. Vous vous assurez que le personnel qualifié à la clinique du camp est uniquement disponible la journée afin de stabiliser le patient en lui prodiguant des soins obstétricaux de base

Vous êtes le nouveau Coordinateur SSR et vous venez d'arriver dans une situation d'urgence. Quelles sont les quelques premières mesures de SSR que vous pouvez déjà mettre en

☑ a. Le viol est un acte de pénétration non consenti du vagin, de l'anus ou de la bouche

c. La seule forme de violence sexuelle observée dans les situations d'urgence est le viol

☑ b. Le Kit d'urgence pour le traitement post viol est le kit n°3 de couleur rose

☐ b. Vous signez un contrat avec une agence locale pour qu'elle produise des kits

Dans le but de réduire la mortalité matenelle en situation de crise, le DMU préconise que les services de SONU soient disponibles:

Vous avez tenté de vous procurer des Kits d'accouchement hygiénique via l'UNFPA. Malheureusement, des problèmes de logistique ont énormément retardé leur arrivée. Que

☑ b. Sanguine, la plus fréquente, sexuelle et verticale de la mère à l'enfant

☐ c. Sexuelle, la plus fréquente, sanguine et verticale de la Mère-Enfant

☐ d. L'allaitement maternel transmet le VIH et donc proscrit

Question **4** 

Réponse enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

question

Question **5** 

Réponse enregistrée

Noté sur 1,00

question

Question **6** 

Réponse enregistrée

Noté sur 1,00

question

Question **7** 

Réponse enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **8** 

Réponse enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

question

Question **9** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **10** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **11** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **12** 

Noté sur 1,00

Question 13

Noté sur 1,00

Question 14

Noté sur 1,00

Question **15** 

Noté sur 1,00

Question **16** 

Réponse

enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

Question 17

Noté sur 1,00

Marquer la

Question 18

Noté sur 1,00

Question 19

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **20** 

Noté sur 1,00

Question 21

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **22** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **23** 

Noté sur 1,00

Question **24** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **25** 

Noté sur 1,00

Question **26** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **27** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **28** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **29** 

Noté sur 1,00

Question **30** 

Noté sur 1,00

Question **31** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **32** 

enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **33** 

Noté sur 1,00

Question **34** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **35** 

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **36** 

Noté sur 1,00

Question **37** 

Noté sur 1,00

Question **38** 

Noté sur 1,00

Question **39** 

Réponse

question

enregistrée

Noté sur 1,00

Marquer la

Question **40** 

Noté sur 1,00

Marquer la

question

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée

question

question

Réponse enregistrée

question

question

Réponse enregistrée

question

Réponse enregistrée