Matematică 1 (Analiză)

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: Mircea Olteanu

13 octombrie 2019

Cuprins

1 Serii de numere reale pozitive **2**
1.1 Seria geometrică 2
1.2 Seria armonică 3
1.3 Criterii de convergență 3
1.4 Exerciții 5

2 Criterii de convergență (cont.). Serii oarecare **6**
2.1 Exerciții 7
2.2 Serii alternante 8
2.3 Aproximarea sumelor seriilor convergente 8

3 Convergența seriilor — Exerciții **10**

4 Șiruri și serii de funcții **12**
4.1 Șiruri de funcții 12
4.1.1 Convergență punctuală și convergență uniformă 12
4.1.2 Transferul proprietăților 13
4.2 Serii de funcții 14
4.3 Serii de puteri 15
4.4 Polinomul Taylor și seria Taylor 16
4.5 Exerciții 17

Index **22**

Bibliografie **22**

SEMINAR 1

SERII DE NUMERE REALE POZITIVE

Intuitiv, o serie poate fi gîndită ca o sumă infinită, dată de o regulă a unui termen general. De exemplu, seria:

$$\sum_{n\geq 0} \frac{3n}{5n^2 + 2n - 1}$$

are termenul general de forma $x_n = \dfrac{3n}{5n^2 + 2n - 1}$ și putem rescrie seria mai simplu $\sum x_n$, presupunînd implicit că indicele n ia cea mai mică valoare permisă și merge pînă la ∞.

Natura seriilor este fundamental diferită de cea a șirurilor prin faptul că seriile *acumulează*. De exemplu, să considerăm șirul constant $a_n = 1, \forall n$. Atunci, evident, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$. Pe de altă parte, dacă luăm seria de termen general a_n, adică $\sum a_n$, observăm că aceasta are suma ∞, deci este divergentă.

În continuare, vom studia criterii prin care putem decide dacă o serie este sau nu convergentă. Dar înainte de aceasta, vom folosi foarte des două serii particulare, pe care le detaliem în continuare.

1.1 Seria geometrică

Pornim de la progresiile geometrice studiate în liceu. Fie (b_n) o progresie geometrică, cu primul termen b_1 și cu rația q. Deci termenul general are formula $b_n = b_1 q^{n-1}$. Atunci suma primilor n termeni ai progresiei se poate calcula cu formula:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} b_k = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Dacă, însă, în această sumă considerăm „toți“ termenii progresiei, obținem *seria* geometrică, anume $\sum\limits_{n\geq 1} b_n$.

Suma acestei serii coincide cu $\lim_{n\longrightarrow\infty} S_n$ și se poate observa cu ușurință că seria geometrică este convergentă dacă și numai dacă $|q| < 1$. Mai mult, în caz de convergență, suma seriei se poate calcula imediat ca fiind $b_1 \cdot \dfrac{1}{1-q}$.

1.2 Seria armonică

Această serie se mai numește *funcția zeta a lui Riemann* și se definește astfel:

$$\zeta(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad s \in \mathbb{Q}.$$

Remarcăm cîteva cazuri particulare:

$$\begin{aligned}
\zeta(0) &= \sum 1 = \infty \\
\zeta(1) &= \sum \frac{1}{n} = \infty \\
\zeta(2) &= \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \\
\zeta(-1) &= \sum n = \infty \\
\zeta(-2) &= \sum n^2 = \infty.
\end{aligned}$$

Rezultatul general este:

Teoremă 1.1: *Seria armonică $\zeta(s)$ este convergentă dacă și numai dacă $s > 1$.*

1.3 Criterii de convergență

Ne păstrăm în continuare în contextul seriilor cu termeni reali și pozitivi, pe care le scriem în general $\sum x_n$.

Convergența poate fi decisă ușor folosind criteriile de mai jos.

Criteriul necesar: Dacă $\lim_{n\longrightarrow\infty} x_n \neq 0$, atunci seria $\sum x_n$ este divergentă.

Observaţie 1.1: Să remarcăm că, așa cum îi spune și numele, criteriul de mai sus dă doar condiții necesare, nu și suficiente pentru convergență! De exemplu, pentru $\zeta(1)$, termenul general tinde către 0, dar seria este divergentă.

Criteriul de comparație termen cu termen: Fie $\sum y_n$ o altă serie de numere reale și pozitive.

- Dacă $x_n \leq y_n, \forall n$, iar seria $\sum y_n$ este convergentă, atunci și seria $\sum x_n$ este convergentă;
- Dacă $x_n \geq y_n, \forall n$, iar seria $\sum y_n$ este divergentă, atunci și seria $\sum x_n$ este divergentă.

Acest criteriu seamănă foarte mult cu criteriul de comparație de la șiruri. Astfel, avem că un șir mai mare (termen cu termen) decît un șir divergent este divergent, iar un șir mai mic (termen cu termen) decît un șir convergent este convergent. Celelalte cazuri sînt nedecise.

De asemenea, mai remarcăm că, în studiul seriei $\sum x_n$ apare seria $\sum y_n$, care trebuie aleasă convenabil astfel încît să aibă loc condițiile criteriului. În practică, cel mai des vom alege această nouă serie ca fiind o serie geometrică sau una armonică, cu rația, respectiv exponentul alese convenabil.

Criteriul de comparație la limită: Fie $\sum y_n$ o altă serie de numere reale și pozitive, astfel încît $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} \in (0, \infty)$. Atunci cele două serii au aceeași natură, adică $\sum x_n$ este convergentă dacă și numai dacă $\sum y_n$ este convergentă.

Criteriul raportului: Fie $\ell = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n}$.

- Dacă $\ell > 1$, atunci seria $\sum x_n$ este divergentă;
- Dacă $\ell < 1$, atunci seria $\sum x_n$ este convergentă;
- Dacă $\ell = 1$, atunci criteriul nu decide.

Criteriul radical: Fie $\ell = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$.

- Dacă $\ell > 1$, atunci seria $\sum x_n$ este divergentă;
- Dacă $\ell < 1$, atunci seria $\sum x_n$ este convergentă;
- Dacă $\ell = 1$, atunci criteriul nu decide.

1.4 Exerciții

1. Studiați convergența seriilor $\sum x_n$ în cazurile de mai jos:

(a) $x_n = \left(\dfrac{3n}{3n+1}\right)^n$; (D, necesar)

(b) $x_n = \dfrac{1}{n!}$; (C, raport)

(c) $x_n = \dfrac{1}{n\sqrt{n+1}}$; (C, comparație la limită cu $\zeta(3/2)$)

(d) $x_n = \dfrac{n+1}{2n+3}$; (D, necesar)

(e) $x_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n$; (D, necesar)

(f) $x_n = \dfrac{n!}{n^{2n}}$; (C, raport)

(g) $x_n = \left(\dfrac{n+1}{3n+1}\right)^n$; (C, radical)

(h) $x_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$; (C, radical)

(i) $x_n = \dfrac{1}{7^n + 3^n}$; (C, comparație cu geometrică)

(j) $x_n = \dfrac{2 + \sin n}{n^2}$; (C, comparație cu armonică)

(k) $x_n = \dfrac{\sin^2 n}{n^2+1}$; (C, comparație cu armonică)

(l) $x_n = \sqrt{n^4 + 2n + 1} - n^2$; (D, comparație cu armonică)

2*. Studiați convergența *șirurilor* cu termenul general x_n din exercițiul anterior și comparați cu comportamentul seriilor.

SEMINAR 2

CRITERII DE CONVERGENȚĂ (CONT.). SERII OARECARE

Pe lîngă criteriile prezentate în seminarul anterior, vor mai fi de folos și altele, pe care le enumerăm mai jos. În continuare, menționăm că vom lucra cu o serie de forma $\sum x_n$ și sîntem în ipoteza $x_n \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}$.

Criteriul Raabe-Duhamel: Fie limita următoare:

$$\ell = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right).$$

Atunci:

- Dacă $\ell > 1$, seria este convergentă;
- Dacă $\ell < 1$, seria este divergentă;
- Dacă $\ell = 1$ criteriul nu decide.

În multe situații, criteriul Raabe-Duhamel este folositor cînd criteriul raportului nu decide. Remarcați că, în acest caz, limita de mai sus este o nedeterminare de forma $\infty \cdot 0$, care de multe ori se poate calcula și este diferită de 1.

Criteriul logaritmic: Fie limita:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-\ln x_n}{\ln n}.$$

- Dacă $\ell > 1$, seria este convergentă;
- Dacă $\ell < 1$, seria este divergentă;

- Dacă $\ell = 1$, criteriul nu decide.

Criteriul condensării: Dacă (x_n) este un șir descrescător și cu termeni pozitivi, atunci seriile $\sum x_n$ și $\sum 2^n x_{2^n}$ au aceeași natură.

Criteriul integral: Fie $f : (0, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$ o funcție crescătoare și definim șirul:

$$a_n = \int_1^n f(t)dt.$$

Atunci seria $\sum f(n)$ este convergentă dacă și numai dacă șirul (a_n) este convergent.

2.1 Exerciții

1. Studiați natura următoarelor serii cu termeni pozitivi, cu termenul general x_n dat de:

(a) $x_n = \dfrac{1}{\ln n}$; (D, integral/comparație)

(b) $x_n = \dfrac{1}{n \ln n}$; (D, integral/condensare)

(c) $x_n = \dfrac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$ (D, Raabe)

(d) $x_n = \left(1 - \dfrac{3 \ln n}{2n}\right)^n$ (C, logaritmic)

(e) $x_n = \dfrac{1}{n \sqrt[n]{n}}$ (D, comparație/logaritmic)

(f) $x_n = \left(\dfrac{1}{\ln n}\right)^{\ln(\ln n)}$; (D, logaritmic)

(g) $x_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$ (C, logaritmic)

(h) $x_n = \dfrac{a^n (n!)^2}{(2n)!}$, $a > 0$. (raport, discuție a?4)

2.2 Serii alternante

În continuare, discutăm și cazul cînd termenii seriei pot fi negativi. Dar vom fi interesați doar de un caz particular, anume acela al seriilor *alternante*, adică acelea în care un termen este negativ, iar celălalt pozitiv. Mai precis, o serie $\sum x_n$ se numește *alternantă* dacă $x_n \cdot x_{n+1} < 0$, pentru orice n.

Singurul criteriu de convergență pe care îl folosim pentru aceste cazuri este:

Criteriul lui Leibniz: Fie $\sum_n (-1)^n x_n$ o serie alternantă. Dacă șirul (x_n) este descrescător și converge către 0, seria este convergentă.

De asemenea, vom mai fi interesați și de:

- *serii absolut convergente*, adică acele serii pentru care și seria modulelor, și seria dată sînt convergente;
- *serii semiconvergente*, adică acele serii pentru care seria inițială este convergentă, dar seria modulelor este divergentă.

Evident, cum $x \leq |x|$, rezultă că orice serie absolut convergentă este convergentă, dar reciproca nu este adevărată.

Pentru acest caz, avem:

Criteriul Abel-Dirichlet: Presupunem că seria $\sum x_n$ se mai poate scrie sub forma $\sum \alpha_n y_n$, unde (α_n) este un șir monoton și mărginit (deci convergent). Dacă și seria $\sum y_n$ este convergentă, atunci seria inițială $\sum \alpha_n y_n$ este convergentă.

Formulare alternativă: Dacă (α_n) este un șir monoton, care tinde către 0, iar șirul cu termenul general $Y_n = y_1 + \cdots + y_n$ este mărginit, atunci seria $\sum \alpha_n y_n$ este convergentă.

De exemplu, studiem seria $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$. Este o serie alternantă, deci:

- seria modulelor este $\zeta(1)$, care este divergentă;
- pentru seria dată, aplicăm criteriul lui Leibniz, cu șirul $x_n = \frac{1}{n}$, care este descrescător către 0, deci seria este convergentă.

Concluzia este că seria $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ este *semiconvergentă*.

Exercițiu: Folosind criteriul Leibniz, studiați natura seriei cu termenul general:

$$x_n = (-1)^n \frac{\log_a n}{n}, a > 1.$$

2.3 Aproximarea sumelor seriilor convergente

Presupunem că avem o serie convergentă și alternantă. Se poate arăta foarte simplu că, dacă notăm cu S suma seriei, iar cu s_n suma primilor n termeni, cu x_n termenul general al seriei, are

loc inegalitatea:

$$\varepsilon = |S - s_n| \leq x_{n+1}. \tag{2.1}$$

Cu alte cuvinte, eroarea aproximației are ordinul de mărime al primului termen neglijat.

Deocamdată, exemplele simple pe care le studiem sînt de forma:

Exercițiu: Să se aproximeze cu o eroare mai mică decît ε sumele seriilor definite de termenul general x_n de mai jos:

(a) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n!}$, $\varepsilon = 10^{-3}$;

(b) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n^3\sqrt{n}}$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

În ambele cazuri, se folosește inegalitatea din (2.1), de unde se scoate n. Se obține $n = 6$ pentru primul exercițiu și $n = 4$ pentru al doilea.

Concluzia este că, pentru a obține valoarea sumei seriei cu o precizie de 3, respectiv 2 zecimale, este suficient să considerăm primii 5, respectiv primii 3 termeni ai seriei. Eroarea este comparabilă cu primul termen *neglijat* din serie.

SEMINAR 3

CONVERGENȚA SERIILOR — EXERCIȚII

Studiați convergența seriilor de forma $\sum x_n$. În cazul seriilor alternante, decideți și convergența absolută sau semiconvergența:

(1) $x_n = (\arctan 1)^n$; (D, radical)

(2) $x_n = \sqrt{n} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$; (D, comparație la limită)

(3) $x_n = \frac{1}{n - \ln n}$; (D, comparație la limită)

(4) $x_n = (-1)^n \frac{n+1}{n^3}$; (C, Leibniz)

(5) $x_n = \frac{\ln n}{2n^3 - 1}$; (C, comparație)

(6) $x_n = \frac{\sqrt[n]{2}}{n^2}$; (C, comparație/integral)

(7) $x_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt[3]{n^2}}$; (C, comparație)

(8) $x_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$; (C, integral)

(9) $x_n = \frac{\ln n}{n^2}$; (C, comparație)

(10) $x_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$; (D, comparație la limită)

(11) $x_n = \dfrac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$; (C, Leibniz)

(12) $x_n = \dfrac{(-1)^n n!}{(2n)!}$; (C, Leibniz)

(13) $x_n = \dfrac{\arctan n}{n^2 + 1}$; (C, comparație/integral)

(14) $x_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\ln(n+1)}$; (D, necesar)

(15) $x_n = (-1)^{n+1} \dfrac{2n+1}{3^n}$; (C, Leibniz)

(16) $x_n = \dfrac{\sqrt[3]{n^3 + n^2} - n}{n^2}$; (parțial 2018–2019)

(17) $x_n = (-1)^n \dfrac{n}{n^2 - 1}$; (parțial 2018–2019)

(18) $x_n = (-1)^n (\sqrt{n^2 + 1} - n)$; (parțial 2018–2019)

(19) $x_n = \dfrac{a^n}{2n^2 + 1}$; (discuție după a)

(20) $x_n = (-1)^n \dfrac{(2n)!}{n^n}$; (parțial FIA)

(21) $x_n = \left(\dfrac{n}{n+a}\right)^{n^2}$, $a > 0$; (discuție după a)

(22) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{2^{2n} \cdot n!}$ (parțial FIA)

(23) $x_n = \dfrac{a^n}{n^3}$, $a > 0$. (discuție după a)

SEMINAR 4

ȘIRURI ȘI SERII DE FUNCȚII

4.1 Șiruri de funcții

4.1.1 Convergență punctuală și convergență uniformă

Fie $(f_n)_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ un șir (o familie) de funcții, adică pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, avem cîte o funcție $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Putem gîndi aceste șiruri de funcții ca pe niște generalizări ale șirurilor de numere reale. Dacă în cazul acela, regula generală era fixată, dată de $x_n = x(n)$, în cazul șirurilor de funcții, pentru fiecare indice n, putem avea cîte o regulă diferită, dată de o funcție f_n.

Dacă șirurile de numere reale au drept limită un număr real și astfel putem spune că un șir de numere reale aproximează un număr real, în cazul șirurilor de funcții, limita va fi, în general, o funcție. Deci putem spune că aceste șiruri aproximează funcții. Însă noțiunea de convergență în cazul șirurilor de funcții este ceva mai subtilă.

Definiţie 4.1: Fie $(f_n)_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ un șir de funcții.

Spunem că șirul $(f_n)_n$ *converge punctual (simplu)* la funcția f dacă are loc:

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in D.$$

Pe scurt, putem nota aceasta prin $f_n \xrightarrow{PC} f$ sau $f_n \xrightarrow{s} f$, iar funcția f se va numi *limita punctuală* a șirului (f_n).

Acest tip de convergență este foarte puternic, deoarece este definit destul de grosier, astfel că avem nevoie de rafinări ale conceptului.

Celălalt tip de convergență este definit mai jos.

Definiţie 4.2: În condițiile și cu notațiile de mai sus, spunem că șirul (f_n) este *uniform convergent* la funcția f dacă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0 \text{ a. î. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall n \geq N_\varepsilon, \forall x \in D.$$

Notația va fi $f_n \xrightarrow{UC} f$ sau $f_n \xrightarrow{u} f$.

Cu alte cuvinte, șirul (f_n) se păstrează arbitrar de aproape de funcția limită, de la un anumit rang încolo.

Ca și în cazul șirurilor de numere, se va folosi mai des în exerciții o teoremă de caracterizare.

Propoziţie 4.1: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, are loc:*

$$f_n \xrightarrow{u} f \iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Se poate vedea că proprietatea de convergență uniformă o implică pe cea de convergență punctuală, însă reciproca este falsă.

De exemplu, fie $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n, n \geq 1$.

Atunci se poate vedea imediat că:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

De aici rezultă că $f_n \xrightarrow{s} f$, unde funcția f este definită pe cazuri mai sus.

Dar un calcul simplu arată că:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1 \neq 0,$$

deci șirul nu este uniform convergent.

4.1.2 Transferul proprietăților

În unele situații, putem verifica proprietățile de convergență simplă și mai ales uniformă prin transferul proprietăților. Cu alte cuvinte, vom ști ce proprietăți analitice (continuitate, integrabilitate) ale funcțiilor se păstrează prin convergență și aceasta ne va da condiții necesare pentru a studia acel tip de convergență.

Teoremă 4.1 (Transfer de continuitate)**:** *Fie $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ un șir de funcții.*

Dacă fiecare f_n este funcție continuă, iar șirul f_n converge uniform la funcția f, atunci f este continuă.

Această teoremă ne ajută să verificăm convergență uniformă astfel: dacă știm (am demonstrat) că fiecare termen f_n este funcție continuă, iar funcția f, obținută prin convergența *punctuală* a șirului (singurul candidat posibil și pentru convergența uniformă!) nu este o funcție continuă, atunci știm sigur că șirul nu converge uniform la f.

Teoremă 4.2 (Integrare termen cu termen)**:** *Fie $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ un șir de funcții și $f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție.*

Dacă $f_n \xrightarrow{u} f$, atunci are loc proprietatea de integrare termen cu termen, adică:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

Cu alte cuvinte, dacă știm că are loc convergența uniformă, atunci limita și integrala pot comuta.

Teoremă 4.3 (Derivare termen cu termen)**:** *Fie $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ un șir de funcții și $f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție.*

Presupunem că funcțiile f_n sînt derivabile, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Dacă $f_n \xrightarrow{s} f$ și dacă există o funcție $g : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel încît $f_n' \xrightarrow{u} g$, atunci f este derivabilă și $f' = g$.

Această proprietate este similară celei de integrabilitate și ne arată că, dacă are loc convergența punctuală a șirului funcțiilor și uniformă a șirului derivatelor, atunci limita și derivata pot comuta.

4.2 Serii de funcții

Pasul următor este să studiem serii de funcții. Pentru convergența acestora, avem un singur criteriu de utilizat.

Teoremă 4.4 (Weierstrass)**:** *Fie (a_n) un șir cu termeni pozitivi, $\sum f_n(x)$ o serie de funcții, cu fiecare $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, astfel încît $|f_n(x)| \leq a_n$ pentru orice $x \in D$, iar seria $\sum a_n$ este convergentă, atunci seria $\sum f_n$ converge uniform.*

Transferul proprietăților se formulează pe scurt astfel (vom păstra notațiile și contextul din teorema lui Weierstrass de mai sus):

- *Transfer de continuitate:* Dacă f_n sînt funcții continue, iar seria $\sum f_n$ converge uniform la f, atunci funcția f este continuă.

- *Integrare termen cu termen:* Dacă seria $\sum f_n$ converge uniform la f, atunci f este integrabilă și are loc:
$$\int_a^b \sum_n f_n(x)dx = \sum_n \int_a^b f_n(x)dx,$$
pentru orice interval $[a, b] \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ din domeniul de definiție al funcțiilor f_n.

- *Derivare termen cu termen*: Presupunem că toate funcțiile f_n sînt derivabile. Dacă seria $\sum f_n$ converge punctual la f și dacă există $g : D \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel încît $\sum f_n'$ converge uniform la g, atunci f este derivabilă și $f' = g$.

Toate aceste proprietăți, însă, vor fi utile într-un caz particular de serii de funcții, anume acela al seriilor de puteri.

4.3 Serii de puteri

Pornim cu o serie de funcții $\sum f_n$, dar în care fiecare termen f_n este o funcție de tip polinomial. Astfel că, de fapt, seriile de puteri pot fi scrise în general sub forma $\sum a_n(x-a)^n$, cu $a_n, a \in \mathbb{R}$, caz în care se numesc *serii de puteri centrate în a*, definite de șirul (a_n).

În majoritatea cazurilor, vom lucra cu serii de puteri centrate în origine, care se vor scrie, în general, $\sum a_n x^n$.

Toate rezultatele de la serii de funcții sînt valabile și cu demonstrații imediate, dat fiind că funcțiile polinomiale sînt ușor de studiat. Rezultatele specifice sînt următoarele.

Teoremă 4.5 (Abel)**:** *Fie $\sum a_n(x-a)^n$ o serie de puteri centrată în $a \in \mathbb{R}$. Atunci există un număr $0 \le R \le \infty$ astfel încît:*

- *Seria este absolut convergentă pe intervalul $(a-R, a+R)$;*
- *Seria este divergentă pentru $|x| > R$;*
- *Seria este uniform convergentă pentru $[-r, r]$, pentru $0 < r < R$.*

Numărul R se numește raza de convergență a seriei*, iar intervalul $(a-R, a+R)$ se numește* intervalul de convergență*.*

Problema centrală acum va fi calculul razei de convergență, care se poate face cu unul dintre criteriile de mai jos.

Teoremă 4.6 (Cauchy-Hadamard)**:** *Fie $\sum a_n(x-a)^n$ o serie de puteri. Fie R raza sa de convergență și fie $\omega = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$. Atunci:*

- *$R = \omega^{-1}$, pentru $0 < \omega < \infty$;*
- *$R = 0$, dacă $\omega = \infty$;*
- *$R = \infty$, dacă $\omega = 0$.*

Teoremă 4.7: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, raza de convergență se poate calcula și cu formula:*

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Observaţie 4.1: Remarcăm că proprietățile de transfer sînt imediate în cazul seriilor de puteri. Rezultă că, dacă $\sum a_n(x-a)^n$ este o serie de puteri convergentă la $S(x)$, atunci:

- Seria derivatelor, $\sum na_n(x-a)^{n-1}$, are aceeași rază de convergență cu seria inițială și are suma $S'(x)$;
- Seria primitivelor, $\sum \frac{a_n}{n+1}(x-a)^{n+1}$ are aceeași rază de convergență cu seria inițială, iar suma sa este o primitivă a funcției S.

4.4 Polinomul Taylor și seria Taylor

Orice funcție cu proprietăți analitice „bune“ poate fi aproximată cu un polinom.

Definiţie 4.3: Fie $D \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^m(D)$, adică este continuă și are derivata continuă, pînă la a m-a iterație.

Pentru orice $a \in D$ definim *polinomul Taylor* de grad $n \leq m$ asociat funcției f în punctul a prin:

$$T_{n,f,a} = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Restul (eroarea de aproximare), numit și *restul Lagrange* este definit prin:

$$R_{n,f,a} = f(x) - T_{n,f,a}(x).$$

Pentru cazul particular al polinomului Taylor de grad 1, acesta se mai numește *aproximația liniară* a funcției f, iar pentru gradul 2, *aproximația pătratică.*

Evident, acest polinom poate fi folosit mai departe pentru a studia *seria* Taylor asociată unei funcții. Formal, conceptul este definit mai jos.

Teoremă 4.8 (Seria Taylor)**:** *Fie $a < b$ și $f \in \mathcal{C}^\infty([a,b])$, astfel încît să existe $M > 0$ cu $|f^{(n)}(x)| \leq M$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $x \in [a,b]$.*

Atunci pentru orice $x_0 \in (a,b)$, se definește seria Taylor a lui f în jurul punctului x_0, care va fi uniform convergentă pe $[a,b]$, iar suma sa este funcția f, adică avem:

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \quad \forall x \in [a,b].$$

Pentru cazul particular $x_0 = 0$, seria se numește Maclaurin.

Observaţie 4.2: Dacă nu se specifică punctul în jurul căruia să se facă dezvoltarea în serie Taylor pentru funcția f, vom presupune că lucrăm cu serii Maclaurin.

Observaţie 4.3: Conform proprietăților de aproximare a sumelor seriilor convergente din seminarul anterior, știm că eroarea de aproximare (restul Lagrange, în acest caz) este comparabilă cu primul termen neglijat din seria Taylor (echivalent, cu următorul termen din polinomul Taylor).

4.5 Exerciții

1. Să se studieze convergența punctuală și uniformă a șirurilor de funcții:

(a) $f_n : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{1}{nx+1}, n \geq 0;$

(b) $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n - x^{2n}, n \geq 0;$

(c) $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}, n > 0;$

(d) $f_n : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2};$

(e) $f_n : (-1,1) \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{1-x^n}{1-x};$

(f) $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{2nx}{1+n^2x^2};$

(g) $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x+n}{x+n+1};$

(h) $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}.$

2. Să se arate că șirul de funcții dat de:

$$f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan x^n$$

converge uniform pe $\mathbb{R}$, dar:

$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right)'_{x=1} \neq \lim_{n\to\infty} f_n'(1).$$

Rezultatele diferă deoarece șirul derivatelor nu converge uniform pe $\mathbb{R}$.

3. Să se arate că șirul de funcții dat de:

$$f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = nxe^{-nx^2}$$

este convergent, dar:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx \neq \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx.$$

Rezultatul se explică prin faptul că șirul nu este uniform convergent. De exemplu, pentru $x_n = \dfrac{1}{n}$, avem $f_n(x_n) \longrightarrow 1$, dar, în general, $f_n(x) \longrightarrow 0$.

4. Să se dezvolte următoarele funcții în serie Maclaurin, precizînd și domeniul de convergență:

(a) $f(x) = e^x$;

(b) $f(x) = \sin x$;

(c) $f(x) = \cos x$;

(d) $f(x) = (1 + x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

(e) $f(x) = \dfrac{1}{1 + x}$;

(f) $f(x) = \ln(1 + x)$;

(g) $f(x) = \arctan x$;

(h) $f(x) = \ln(1 + 5x)$;

(i) $f(x) = 3\ln(2 + 3x)$.

5. Să se calculeze raza de convergență și mulțimea de convergență pentru următoarele serii de puteri:

(a) $\sum_{n\geq 0} x^n$;

(b) $\sum_{n\geq 1} n^n x^n$;

(c) $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n+1} \dfrac{x^n}{n}$;

(d) $\sum_{n\geq 1} \dfrac{n^n x^n}{n!}$;

(e) $\sum \dfrac{(x-1)^{2n}}{n \cdot 9^n}$;

(f) $\sum \dfrac{(x+3)^n}{n^2}$.

6. Găsiți mulțimea de convergență și suma seriei:

$$\sum_{n\geq 0}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Indicație: Se derivează termen cu termen și rezultă seria geometrică de rază $-x^2$, căreia i se poate calcula suma, care apoi se integrează.

7. Să se calculeze cu o eroare mai mică decît 10^{-3} integralele:

(a) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx$;

(b) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x}\,dx$;

(c) $\displaystyle\int_0^{1} e^{-x^2}\,dx$.

8. Să se calculeze polinomul Taylor de grad 3 în jurul originii pentru funcțiile:

(a) $f(x) = 3\ln(2+x)$;

(b) $f(x) = \arctan x$;

(c) $f(x) = \sqrt{1+2x}$.

9. Găsiți aproximarea liniară și pătratică a funcțiilor:

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$;

(b) $f(x) = \sin(\cos x)$;

(c) $f(x) = e^{\sin x}$;

(d) $f(x) = \arcsin x$.

10. Folosind seria Taylor, aproximați cu o eroare mai mică decît 10^{-3} numerele:

(a) $\sqrt[3]{65}$;

(b) $\sin 32$;

(c) $\arctan \frac{1}{2}$;

(d) $e^{-0,2}$;

(e) $\ln 1,1$;

(f) $\ln 4$;

(g) $\ln 5$.

Indicație: Atenție la domeniile de convergență!

11. Să se calculeze cu o eroare mai mică decît 10^{-3} integralele:

(a) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$;

(b) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$;

(c) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\arctan x}{x} dx$;

(d) $\displaystyle\int_0^{1} e^{-x^2} dx$.

12. Găsiți mulțimea de convergență și suma seriei:

$$\sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Indicație: $R = 1$ (raport), iar suma se poate afla derivînd termen cu termen. Rezultă (prin derivare) seria geometrică de rază $-x^2$, cu suma $\dfrac{1}{x^2+1}$, valabilă pentru $x \in (-1, 1)$.

Rezultă $f(x) = \arctan x + c$.

13. Arătați că seriile numerice de mai jos sînt convergente și calculați sumele lor, folosind serii de puteri:

(a) $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{3n+1}$;

(b) $\sum_{n\geq 0} \frac{(n+1)^2}{n!}$;

(c) $\sum_{n\geq 1} \frac{n^2(3^n-2^n)}{6^n}$.

Indicații:

(a) Seria satisface criteriul lui Leibniz, deci este convergentă.

Pentru a găsi suma, pornim cu seria de puteri $\sum(-1)^n \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$.

Intervalul de convergență este $(-1,1)$, iar pentru $x=1$, avem seria dată.

Fie f suma acestei serii de puteri în intervalul $(-1,1)$. Derivăm termen cu termen și obținem:

$$f'(x) = \sum(-1)^n x^{3n} = \frac{1}{1+x^3},$$

pentru $|x|<1$, ca suma unei serii geometrice alternate.

Rezultă:

$$f(x) = \int \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{6}\ln\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan 2x - 1\sqrt{3} + c,$$

pentru $|x|<1$. Calculînd $f(0)$, găsim $c = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$.

(b) Se folosește seria pentru e^x, din care obținem seria pentru $(x+x^2)e^x$, pe care o derivăm termen cu termen.

Pentru $x=1$, se obține seria cerută, cu suma $5e$.

(c) Descompunem seria în două, apoi folosim seria de puteri $\sum n^2x^n$, pe care o derivăm termen cu termen, pentru a obține seria pentru nx^{n-1}, apoi seria pentru nx^n.

INDEX

convergență
- simplă, 12
- uniformă, 12

criteriul
- Abel-Dirichlet, 8
- condensării, 7
- de comparație
  - la limită, 4
  - termen cu termen, 3
- integral, 7
- Leibniz, 8
- logaritmic, 6
- necesar, 3
- Raabe-Duhamel, 6
- radical, 4
- raportului, 4
- Weierstrass, 14

polinom
- Taylor, 16

serii
- alternante, 8
- armonice, 3
- de funcții, 14
- de numere pozitive, 2
- de puteri, 15
- geometrice, 2
- Maclaurin, 16
- Taylor, 16

teorema
- Abel, 15
- Cauchy-Hadamard, 15

transfer
- de continuitate, 13
- de derivabilitate, 14
- de integrabilitate, 14

BIBLIOGRAFIE

[Burtea, 2006] Burtea, M. (2006). *Manual de matematică M1, clasa a XI-a.* Carminis.

[Costache, 2009] Costache, L. (2009). *Analiză matematică.* Printech.

[Olteanu, 2004] Olteanu, M. (2004). *Analiză matematică.* online.

[Țena, 2006] Țena, M. (2006). *Manual de matematică M1, clasa a XI-a.* Art.