


Stagione influenzale 2010/2011

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



Nella stagione 2010-2011 la fascia d'età maggiormente colpita è quella tra 0 e 14 anni con un livello di massima incidenza pari a 29,1 casi per 1000 assistiti nella fascia 0-4 anni e pari a 28,6 nella fascia 5-14 anni, in quella 15-64 anni pari a 7,8 e pari a 2,3 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni.



Stagione influenzale 2010/2011

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza per fascia di età in Italia nella stagione influenzale 2010-2011.

g u	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
Settimana					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2010-42	882	834	1158321	0,72	168	2,03	142	0,88	453	0,66	71	0,31
2010-43	1026	1085	1345810	0,81	181	1,94	213	1,17	591	0,73	100	0,38
2010-44	1050	1122	1375503	0,82	176	1,81	208	1,11	636	0,78	102	0,37
2010-45	1063	1315	1396468	0,94	200	2,06	246	1,32	735	0,88	134	0,48
2010-46	1072	1514	1409976	1,07	265	2,71	264	1,41	852	1,01	133	0,47
2010-47	1074	1801	1409016	1,28	329	3,33	364	1,92	974	1,16	134	0,48
2010-48	1075	1995	1409379	1,42	322	3,19	437	2,26	1099	1,31	137	0,49
2010-49	1080	2423	1415655	1,71	418	4,19	653	3,38	1182	1,40	170	0,61
2010-50	1091	3315	1430177	2,32	595	5,84	900	4,59	1635	1,93	185	0,65
2010-51	1050	4369	1380714	3,16	807	8,50	1220	6,62	2072	2,51	270	0,98
2010-52	1058	6108	1389759	4,40	1076	11,12	1610	8,64	3025	3,64	397	1,44
2011-01	1088	7074	1419612	4,98	983	9,95	1237	6,57	4318	5,08	536	1,90
2011-02	1116	9426	1462949	6,44	1295	12,27	1880	9,32	5600	6,45	651	2,26
2011-03	1114	11946	1456258	8,20	2251	20,96	3360	16,46	5830	6,79	505	1,77
2011-04	1101	14950	1435437	10,41	3017	28,62	4901	25,07	6447	7,58	585	2,06
2011-05	1102	15940	1444480	11,04	3011	29,12	5646	28,59	6689	7,80	594	2,08
2011-06	1089	14308	1423688	10,05	2753	26,49	4943	24,94	6061	7,21	551	1,96
2011-07	1069	10849	1396634	7,77	2172	21,03	3405	17,31	4795	5,83	477	1,74
2011-08	1046	7503	1375522	5,45	1489	15,11	2160	11,46	3509	4,30	345	1,27
2011-09	1026	5594	1358931	4,12	1046	10,70	1419	7,56	2799	3,48	330	1,23
2011-10	1000	4075	1315090	3,10	761	8,17	965	5,37	2092	2,68	257	0,98
2011-11	916	2723	1296669	2,10	486	5,25	571	3,18	1461	1,91	205	0,79
2011-12	963	2072	1267894	1,63	390	4,42	410	2,38	1117	1,48	155	0,61
2011-13	932	1397	1227822	1,14	261	3,13	264	1,60	753	1,03	119	0,48
2011-14	886	1096	1169795	0,94	212	2,64	209	1,39	584	0,83	91	0,38
2011-15	860	926	1132491	0,82	183	2,43	157	1,10	502	0,73	84	0,36
2011-16	781	690	1026856	0,67	143	2,15	101	0,80	392	0,63	54	0,26
2011-17	596	412	785802	0,52	82	1,54	57	0,56	235	0,50	38	0,24

Stagione influenzale 2010/2011




Nella tabella sottostante è riportata la popolazione di assistiti in sorveglianza, suddivisa per fascia di età, per settimana.

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2010-42	82.771	160.986	687.787	226.777	1.158.321
2010-43	93.322	182.188	804.141	266.159	1.345.810
2010-44	97.232	187.373	818.604	272.294	1.375.503
2010-45	96.925	185.780	835.313	278.450	1.396.468
2010-46	97.844	187.683	843.583	280.866	1.409.976
2010-47	98.827	189.445	841.105	279.639	1.409.016
2010-48	100.797	193.291	837.913	277.378	1.409.379
2010-49	99.770	193.061	842.916	279.908	1.415.655
2010-50	101.922	196.150	849.156	282.949	1.430.177
2010-51	94.975	184.309	825.747	275.683	1.380.714
2010-52	96.782	186.270	831.704	275.003	1.389.759
2011-01	98.812	188.267	849.818	282.715	1.419.612
2011-02	105.530	201.636	867.902	287.881	1.462.949
2011-03	107.393	204.130	858.771	285.964	1.456.258
2011-04	105.426	195.498	850.935	283.578	1.435.437
2011-05	103.412	197.490	857.645	285.933	1.444.480
2011-06	103.910	198.179	840.656	280.943	1.423.688
2011-07	103.280	196.686	822.740	273.928	1.396.634
2011-08	98.548	188.554	815.765	272.655	1.375.522
2011-09	97.760	187.575	805.000	268.596	1.358.931
2011-10	93.111	179.726	779.956	262.297	1.315.090
2011-11	92.647	179.330	766.727	257.965	1.296.669
2011-12	88.210	172.038	753.616	254.030	1.267.894
2011-13	83.450	164.659	733.231	246.482	1.227.822
2011-14	80.178	150.020	702.183	237.414	1.169.795
2011-15	75.330	142.450	684.115	230.596	1.132.491
2011-16	66.447	125.653	624.044	210.712	1.026.856
2011-17	53.231	102.530	468.740	161.301	785.802

In questa stagione hanno partecipato mediamente 1.007 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a settimana, con un minimo di 596 e un massimo di 1.116. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.325.597 assistiti.



Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali dalla stagione 2004-2005 alla 2010-2011.



La curva epidemica della stagione influenzale 2010-2011 ha raggiunto il picco alla quinta settimana del 2011 con un'incidenza pari a 11,04 casi su 1000 assistiti.

Il picco epidemico nell'attuale stagione influenzale si colloca ad un livello intermedio tra le stagioni in cui è stato osservato un livello di incidenza alta (stagione 2004-2005) e quelle in cui tale livello è stato basso.