


Stagione influenzale 2006/2007

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



La fascia d'età maggiormente colpita è quella tra 0 e 4 anni, in cui il livello di massima incidenza è stato di 23,93 casi su 1000 assistiti; nella fascia 5-14 anni di 17,38, in quella 15-64 anni è di 5,83 e di 2,65 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni.

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza in Italia nella stagione influenzale 2006/2007.


Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2006-42	648	216	839158	0,26	37	0,71	41	0,40	126	0,24	12	0,07
2006-43	728	257	940408	0,27	36	0,61	47	0,40	132	0,23	42	0,23
2006-44	786	264	1018516	0,26	35	0,56	42	0,34	139	0,22	48	0,24
2006-45	856	482	1112240	0,43	68	1,00	71	0,52	268	0,39	75	0,34
2006-46	871	576	1128853	0,51	97	1,40	100	0,72	294	0,42	85	0,38
2006-47	879	599	1139219	0,53	103	1,47	113	0,81	294	0,42	89	0,39
2006-48	893	683	1157608	0,59	122	1,71	141	0,99	342	0,48	78	0,34
2006-49	890	751	1155228	0,65	125	1,77	149	1,06	373	0,52	104	0,45
2006-50	878	1022	1141139	0,90	195	2,77	175	1,25	521	0,74	131	0,58
2006-51	846	1221	1101079	1,11	245	3,65	259	1,93	566	0,83	151	0,69
2006-52	846	1783	1098249	1,62	353	5,29	363	2,71	850	1,25	217	1,00
2007-01	881	2069	1143863	1,81	298	4,35	338	2,44	1169	1,65	264	1,16
2007-02	896	2599	1162870	2,23	335	4,76	437	3,10	1536	2,13	291	1,26
2007-03	902	3639	1171110	3,11	727	10,27	924	6,46	1719	2,37	269	1,16
2007-04	896	5436	1164898	4,67	1165	16,76	1552	11,03	2322	3,21	397	1,71
2007-05	895	7210	1160725	6,21	1371	19,56	2095	14,89	3284	4,56	460	2,00
2007-06	897	8830	1165694	7,57	1594	22,69	2448	17,38	4191	5,79	597	2,58
2007-07	876	8729	1134904	7,69	1646	23,93	2390	17,33	4098	5,83	595	2,65
2007-08	874	7335	1132554	6,48	1426	21,02	1947	14,18	3443	4,90	519	2,30
2007-09	867	5202	1123879	4,63	980	14,34	1358	9,90	2481	3,57	383	1,71
2007-10	852	3424	1100967	3,11	620	9,30	834	6,21	1675	2,46	295	1,35
2007-11	830	2417	1076824	2,24	453	7,01	594	4,56	1166	1,74	204	0,96
2007-12	813	1886	1056618	1,78	373	5,97	462	3,62	885	1,35	166	0,79
2007-13	806	1421	1047465	1,36	262	4,30	328	2,64	723	1,11	108	0,51
2007-14	758	906	985213	0,92	158	2,80	191	1,67	485	0,79	72	0,36
2007-15	742	689	965529	0,71	134	2,36	139	1,22	349	0,58	67	0,35
2007-16	719	518	933995	0,55	116	2,09	111	1,00	239	0,41	52	0,28
2007-17	664	268	867269	0,31	54	1,09	67	0,68	114	0,21	33	0,19

La sorveglianza della stagione influenzale 2006/2007 è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2006-42	51835	102959	517666	166698	839158
2006-43	59022	116931	577968	186487	940408
2006-44	62682	125363	628684	201787	1018516
2006-45	67877	136640	688677	219046	1112240
2006-46	69186	138125	698096	223446	1128853
2006-47	69851	139663	704022	225683	1139219
2006-48	71539	142777	714675	228617	1157608
2006-49	70660	140718	715045	228805	1155228
2006-50	70294	139662	705366	225817	1141139
2006-51	67194	133957	681364	218564	1101079
2006-52	66726	133863	680464	217196	1098249
2007-01	68450	138304	710399	226710	1143863
2007-02	70343	140988	720948	230591	1162870
2007-03	70797	143040	725338	231935	1171110
2007-04	69517	140697	723060	231624	1164898
2007-05	70095	140652	719488	230490	1160725
2007-06	70261	140822	723288	231323	1165694
2007-07	68784	137875	703445	224800	1134904
2007-08	67849	137319	702049	225337	1132554
2007-09	68345	137179	694920	223435	1123879
2007-10	66668	134331	681988	217980	1100967
2007-11	64592	130137	668579	213516	1076824
2007-12	62493	127521	655249	211355	1056618
2007-13	60894	124301	652075	210195	1047465
2007-14	56441	114510	616710	197552	985213
2007-15	56816	113822	602059	192832	965529
2007-16	55421	111333	580421	186820	933995
2007-17	49762	98420	543972	175115	867269

In questa stagione hanno inviato dati in media 831 medici sentinella a settimana, con un massimo di 902 e un minimo di 648. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.079.503 assistiti.

Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.



La curva epidemica della stagione influenzale 2006/2007 ha raggiunto il picco alla settimana settimana del 2007 con 7,69 casi su 1000 assistiti.

Il livello massimo di incidenza raggiunto, in questa stagione influenzale, si colloca ad un livello intermedio tra la stagione di maggiore incidenza, (2004/2005), e quella in cui è stato osservato il più basso livello di incidenza (2005/2006).