Pengobatan

- Istirahat
- Kompres es lokal
- Obat-obatan (NSAID, Ibuprofen)
- Fisioterapi
- Kinetio tape
- 🗸 Terapi latihan
- 🗸 Pembedahan (sesuai indikasi)



TENS




Ultrasound



Kinetio tape

Terapi latihan



Pencegahan

- Hindari aktivitas berat berlebihan
- Lakukan olahraga yang ringan
- Lakukan peregangan sebelum dan setelah olahraga/latihan untuk mengurangi risiko cedera
- Posisi duduk yang benar

Nyeri bahu:

Tendinitis Bicipitalis





Jl. dr. Kayadoe, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Ambon - Maluku Telp 0911 - 344871

www.rsudhaulussy.malukuprov.go.id

Definisi

Tendonitis/tendinitis adalah peradangan atau iritasi tendon/urat otot.

Tendinitis bisipitalis adalah peradangan pada tendon *caput longus biceps brachii*.

Penyebab

Trauma

Trauma akibat jatuh atau dipukul pada daerah bahu atau dapat juga terjadi pada orang-orang yang bekerja keras dengan posisi seperti tersebut diatas dan secara berulang-ulang.

Strain

Strain atau gerakan yang berulang misalnya melempar dengan tangan terletak lebih tinggi atau lebih rendah dari bahu, menarik, mengangkat, melempar, atau menggali tanah.

Degeneratif

Degeneratif atau berhubungan dengan usia, semakin tua dan berulang penggunaan tendon biseps menyebabkan tendon melemah hingga pecah.

Faktor Risiko

- Usia
- Mengangkat beban berat
- Penggunaan bahu berulang berlebihan





Tanda dan Gejala



- Nyeri bahu yang memburuk dengan gerakanPergerakan bahu terbatas
- Kelemahan otot
- Deformitas lengan (tonjolan popeye)
- Sensasi klik/gertakan dengan gerakan bahu


Pemeriksaan Nyeri Bahu



Speed's test



Yergason's test



Drop arm test



Lippman test



Apley scratch test