

ಆಗಸ್ಟ್

- ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು, ನೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು
- ರಿಪೇರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು
- ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಪಿನ್ (120 ಗ್ರಾಂ/200 ಲೀಟರ್ ನೀರು) ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು
- ಕಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು
- ಹವಮಾನ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಧ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು
- ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಪೀಡಿತ ಅರೇಬಿಕಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು/ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು. ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತ ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನೆ ಹಾಕಬೇಕು
- ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಪಾಸ್ (600 ಮಿಲಿ / 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು) ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು

August

- **Continue Handling, Centering and Desuckering**
- **Spray Bavistin (120 Gram/ 200 litres) in black rot affected areas, provide drainage**
- **Weeding**
- **Apply mid monsoon Urea if weather permits**
- **Supply planting**
- **Tracing and collar pruning/Uprooting/Burning of White Stem Borer affected Arabica plants. If stumps to be stored, immerse them in water for 10 days**
- **If berry borer found, spray chloropyriphos (600 ml/200 liters)**