


2003 / 45



தூக்கலீதம் = டிரைபிள்

எதிரம்.

N_2 உதவாகிய லீதம் = 0.02 mol l^{-1}

NO மறைதல் வெப்பம் = 0.04 mol l^{-1}

H_2 மறைதல் வெப்பம் = 0.04 mol l^{-1}

H_2O உதவாகிய லீதம் = 0.04 mol l^{-1}

because

$\text{NO} : \text{H}_2 : \text{N}_2 : \text{H}_2\text{O}$

mol/l 2 : 2 : 1 : 1

தூக்கலீதம் கிடைக்க மாற்றமாக N_2 உதவாகிய லீதம் 0.02 mol l^{-1} மறைதல் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்.
 15 கிழி 0.02 mol N_2 உதவாகிய லீதம், என்ன கூறப்படவில்லை
 எனவே 0.04 கிழி 0.04 mol NO , H_2 மறைதல்,
 0.04 mol H_2O உதவாகிய லீதம்.

51) பல்படிக்கலான உடைய தூக்கலீதம் தூக்கலீதம் தூக்கலீதம்
 ஏதிரத்தி கூடிய எதிரத்தி பல்படிக்கலான பல்படிக்கலான

குறித்தவாறு தூக்கலீதம் பல் படிக்கலான உடையதின் அலற்றித்தி
 கிடைக்க ஏதிரத்தி உடைய பல்படிக்கலான, உடைய
 எதிரத்தி உடைய தூக்கலீதம் கிடைக்க ஏதிரத்தி உடைய
 உடைய பல்படிக்கலான

கூற்று 1

கூற்று 2

ප්‍රශ්න අංකය: විෂය අංකය:

විෂය නම: පිටුව අංකය:

i)

$$n = \frac{N}{L}$$

$$L = \frac{N}{n}$$

$$\frac{d}{x} \text{ or } \frac{e}{y} \text{ or } \frac{f}{2}$$

ii)

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

ආග්‍ර ක්ෂේත්‍ර

$$P = \kappa A x P^0 A$$

$$P(A) = \frac{x}{x+y} \times J$$

2)

$$PT = PA + PR$$

$$PT = \frac{x}{x+y} J + \frac{y}{x+y} K$$

3)

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$\frac{xJ}{x+y} + \frac{yK}{x+y} \times S$$

$$n = \frac{\frac{xJ}{x+y} + \frac{yK}{x+y} \times S}{R \times T}$$

$$\frac{n}{L} = \frac{\frac{xJ}{x+y} + \frac{yK}{x+y} \times S}{R \times T}$$

$$n = \frac{xJ + yK}{x+y} \times S \times L$$

$$n = \frac{xJ + yK}{x+y} \times S \times \frac{d}{x}$$

$$PV = nRT$$

$$nR = \frac{PV}{T}$$

$$\frac{N}{L} = \frac{y^k \times S}{(x+y) RT}$$


$$N = \frac{y^k}{(x+y)} \times \frac{S}{RT} \times \frac{1}{h}$$

$$PV = \frac{1}{3} m n \bar{c^2}$$

$$\bar{c^2} = \frac{3PV}{mN}$$

$$\bar{c^2} = \frac{3 \times \frac{y^k}{(x+y)} \times \frac{S}{RT} \times \frac{1}{h} \times L \times e}{L \times e}$$

ജ്വലനക്രമം.



AB കണ്ടുപിടിത്ത $\rightarrow r$
BC കണ്ടുപിടിത്ത $\rightarrow s$

വിനകരം!

* ജ്വലനക്രമം കണ്ടുപിടിത്ത കണ്ടുപിടിത്ത കണ്ടുപിടിത്ത. ജ്വലനക്രമം കണ്ടുപിടിത്ത കണ്ടുപിടിത്ത. ജ്വലനക്രമം കണ്ടുപിടിത്ത കണ്ടുപിടിത്ത. ജ്വലനക്രമം കണ്ടുപിടിത്ത കണ്ടുപിടിത്ത.

$$f_{A-A} = f_{B-B} = f_{A-B}$$


H₂O/D₂O

$$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C} \quad \text{CH}_3\text{CH}_2-\text{R}$$
$$\begin{array}{c} \text{—H} / \text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—} \\ \text{CH}_3 / \text{CH}_2\text{CH}_2\text{—} \end{array}$$

H₂O / 220


மொதி
∴ மூலியம்

உதாரணம்



X120 0 - - - - - 1
X220 0 - - - - - 1

கொத்தி



2020 0 - - - - -
2020 1 - - - - -

* கிடைத்திருக்கின்ற சான்றுகளைக் கொடுத்தும் வைப்பினைக்
கூடிய சான்றுகளைக் கொடுத்தினைகளுக்கு கிடைக்கக் கூடிய
கிடைக்க சான்று கொடுத்த சான்றுகளை வைப்பினைக் கொடுத்த
கூடிய சான்று வைப்பினைக் கொடுத்த சான்று


உதிரை உதிரை எதிர் விவரம்: சிறப்பு: மலர் திருவிழா (மார்ச் 2017) பக்கம்

H_2O HNO_3
 மூலக்கூறு >


பொருத்தினை

∴ ஆலியசக்தி

ജനപ്രകാശം



பாதிதம் நயத்ரபயஸ்வி
பாதுகெந்துகை


$$2HNO_3 \rightarrow O_2 + 2H_2O + 2NO$$
$$2H_2O \quad 1 - - - - 5$$

$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ 0 - - - - - 1

$$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$$

4. ஐராளி எதிர்நிலைச் சண்டரஸ் சேனா தொகுக்கும் ஸெபரேஷன் கிரூப் தீவிரம்மணன் தொகுதினை கண்டு கிடைப்பின் சா.ம.

* உதிக் எதிர்வினகல் கண்கலல் கலலை எதிர்த்தும் எவப்பதினல்
எதிர்த்து கண்கலல் கலல் திரவத்தின் எதிர்த்துஎவப்பும் உயர்வாக
கலம்

* சாதிக் சூத்ரிலிளகல் கணதரலன் சூதூதிதினககாண வணுபக
உயர்வுபுள்ளி
மாறுகசூதூதினகல சண்பண கா/ம்.

→ கைத்தொகுப்பு ஆய்வுக்கும் வைப்பறினையும், கைத்தொகுப்பு மூலமாயும் வைப்பறினையும் கவனமாகக் கா/ம.

* கிஸ்டியக் காரைகளானது கிரேஸாஸ் மண் வித்திக்கு அற்றதிலும் சுபலபகர
எதிர்வினசை மூன்றல். கிரேஸாஸ் மண் விதியில் இந்நது எதிர்வினசைக்
கூடகும்.

சத்திரவிகரம் : கணபகம்

РА - "КРОНА"

$P_B < K_B P_O$

$$P_T < P_A + P_R$$

$$PT \leq (P_{\text{АЧНА}} + P_{\text{ВЧН}})$$







முற்றிலும் சரக்கும் சூசுயையை ஜலிப்பதாய்தான் கூறின்
~~கூறின்~~ ஜலியமக்கெதின் நீதும். எர்ப்புத்தாய்லாந்து மந்தைய
 கூறின், சந்தைகள் உள்ள முல்பின்னத்திந்து சமணமும்.

$$p^0 A \chi_A = p A'$$


கணவன், லைப்ஸ் இன் மானிட வாழ்வு. வாயுக்கள் உலையின்
மொத்த அளவைக் காட்டி அதே தொகுதியில் அயோசனை கூறுகள்
தனிமைப்படுத்தப்படும் வாயு பிரபாதித்தம் அயோசனையை
காப்பதற்காக அமைந்திருக்கிறது.

2003/05/07

i)



ii)




சமன்பாட்டின் லாஜிஸ்ட்

$$-250 \times 2 + -890 \times 2 = \Delta H^\circ \times 14$$

$$\Delta H^\circ = -400 \text{ kJ mol}^{-1}$$

iii)



$2H_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ ദിശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു
 മാത്രം y kg ന്റെ അളവ്

അതിന്റെ വികാസം

$$-400 \times 2 + x = -800 + y + 250$$

$$x = (y + 250) \text{ kg mol}^{-1}$$

iv)

ദക്ഷിണ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ
 എഴുതാം.

ദക്ഷിണ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ
 എഴുതാം.

(13)

செய்தல் மையமில்
mol

மொத்த mol gas = $0.125 - 2x + 4x + x + 0.125$
 $= 0.25 + 3x$

குறைந்தது $pV = nRT$
 $n = \frac{pV}{RT}$

$n_{\text{total}} = 1.012 \times 10^5 \text{ mm}^2 \times 8.314 \times 10^3 \text{ m}^3$
 $8.314 \text{ mol} \cdot \text{K}^{-1} \times 400 \text{ K}$

$188.0 - 2x + 2x = 0.253 \text{ mol}$

~~0.25 - 2x~~
 $0.25 + 3x = 0.253$
 $x = 0.001 \text{ mol}$

∴ கிபுதி-செய்தலின் மூலம் அனைத்து mol N_2O_5
 0.001 mol

புரட்சி-செய்தலின் B கி

$(0.25 - 2x) \rightarrow 4x + 0.25$
 $2 \text{ mol } \text{N}_2\text{O}_5$

மூலம் அனைத்து mol $\text{N}_2\text{O}_5 = 2y$ என்ன
 2 மூலம் $\text{mol } \text{N}_2 = 4y$
 " mol $\text{O}_2 = y$

செய்தல் மையமில்
mol

Total mol gas = $0.25 - 2y + 4y + y + 0.125$
 $(0.25 + 3y)$

பரிசோதனை A க்கு 0.001 Δ (0.125 mol)
 8.314 dm^3

பரிசோதனை B க்கு 0.002 Δ (0.25 mol)
 8.314 dm^3

$\frac{0.001}{0.002} = \frac{0.125}{0.25}$

$(\frac{1}{2})^1 = (\frac{1}{2})^n$

$n=1$


சுருக்கம்:- * ஸ்டீயக்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி கிடைத்ததைக் கொண்டு
* 5 வகைகளில் சராசரித் தரக்கொடுக்கப்பட்டு
ஆகும்படி எழுதிவந்து எமன் என்னக் கொள்ளப்படுகிறது.

$PV = nRT$
 $P = \frac{n}{V} \times RT$
 $P = C RT$
 $p \propto C$



அளக்கம் அதிகரிக்கும் போது எவ்வளவு
அதிகரிக்கும், என்ன முக்கோணத்தை
சுருக்கம் போது அதிகரிக்கும்,
ஏதென்கதினயத் தரண்டும் முக்கோணத்தை
எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.
எனவே
சுருக்கம் அதிகரிக்கும்.

பயணத்தைத் துக்கம் எனில்


2003/06/07




15



20



1. $24 \times 5 = 120$ 2. $36 \times 10 = 360$



25

30

உயிர்வாழ்வுத் தத்துவம் பற்றி

→ c/p தனித்த யாத்ரேயம் எனும் Annals ஆகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனிதகுலத்தின் வாழ்வு அத்துறையிலும் Annals கையாடும்.

→ c/p Annals ஆகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்துறையிலும் ~~இதற்கு~~ உண்மை உண்மை அல்லது மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

கி.மு. 500, 400, 300 ஆகிய நேரங்களில் உலகம் மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

* கையாடல் உண்மை மனிதகுலத்தின் தன்மை குறித்து, அல்லது மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

OH, C- அல்லது காணப்படும் தன்மை மனிதகுலத்தின் தன்மை குறித்து OH- ஆக மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

அல்லது OH- க்குள் அல்லது C- க்குள் அல்லது 100 க்குள் அல்லது அல்லது தன்மை மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

* கையாடல் (OH, C-) க்குள் அல்லது அல்லது மனிதகுலத்தின் அடையாளம் அல்லது 100 க்குள் அல்லது - குறித்து.

Annals க்குள்

2400 - 4444 - 100

உயிர்வாழ்வுத் தத்துவம் பற்றி


→ Hg உயிர்வாழ்வுத் தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கையாடல் உண்மை உயிர்வாழ்வுத் தத்துவம் அல்லது மனிதகுலத்தின் அடையாளம்.

→ H_2 தனித்த யாதேனும் ஓங்கம், மீதமில்லாத ஐதர் பயன்படுத்தப்படும்.

கார்பாக் உள்ள உட்கா தயல் குறைந்த கற்றையன் முதலாக
மண்ணிறக்கம் அடையும்.

* சூய நீர் கண்ணப்பம் $[H^+]$, $[OH^-]$ கள் செறிவுகள், மீசுக்குறைவு
எனவே மண்பகுப்பின் ஸ்பாத்தி இம் மண்ணிறக்கம் அடையும்
 H_2O ஓங்குறும்.

செதாயம் இம்




In this question

கார்பாக் உள்ள கற்றையன் கார்டில் கிணை எர்த்தியும் -
அடையன்னை அனல் கிணை எர்த்தியும் அடையும்.

~~கார்பாக்~~ நீர்க்கார்பாக் கிணையன் H^+ , OH^- எண்ணையும்
($1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$) கண்ணப்பம்,




அடையன்னை செறிவுகள் குறையக்கூடாது எனவே எது குறைவு
மண்ணிறக்கம் அடையும் என தெரியாதது 10

சுத்தியப்பக்கமாய் அண்ணத்து தூக்கம்செய்து எழுதவேண்டும்.



$$K_c = \frac{[SO_3(g)]}{[SO_2(g)]}$$

$$K_c = \frac{[H^+][HSO_3^-]}{[SO_2(aq)]}$$







$$K_c = \frac{[H^+] \times [SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-]}$$

සෑම ලක්ෂයක් සඳහාම පිළිගත් අලුත් පිටුවක් ආරම්භ කරන්න. / ඉඩකඩ නිවැරදිව ඇති බවට පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලක්ෂ අංකය: විෂය අංකය:

නිකුත් වූ දිනය: පිටුවේ අංකය:

$$K_c = \frac{[H^+] \times [OH^-]}{[H_2O]}$$



$$K_c = \frac{[H_3O^+] \times [HSO_3^-]}{[H_2SO_3] \times [H_2O]}$$

$$K_c = \frac{[H_3O^+] \times [SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-] \times [H_2O]}$$

$$K_c = \frac{[H_3O^+] \times [OH^-]}{[H_2O]}$$


සාකච්ඡා පත්‍රය

මෙම පිටුව අලුතින් ලබා දෙනු ලැබේ.

உள்ளே பூச்சுக்கள் வந்தால் பிளிக் டிராப்ட் கொண்டு கொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு முறை பூச்சுக்கள் கொல்லுங்கள்.


பெயர்: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை:

i)



SO_2 கலந்து தீர்மானங்கள் திண்ணையில் H^+ கிணை திறக்கும் எண்ணெய். $SO_2(aq)$ கிணை pH சூழலின் pH வலிக்கு குறைவாகக் காட்டும்.


ii)



i) HCl/HNO_3 : எவர்க்கும் ஸாப்த H^+ கிணை அளவு அதிகரிக்கும். எண்ணெய் கிணைக்கும் எண்ணெய் திறக்கும் பிளிக் டிராப்ட் கொண்டு கொல்லுங்கள். பிளிக் டிராப்ட் கொண்டு கொல்லுங்கள்.

ii) $NaOH (pH)$ கிணை எவர்க்கும் ஸாப்த H^+ கிணை H_2O கிணை அளவுக்கும் எண்ணெய் கிணைக்கும் பிளிக் டிராப்ட் கொண்டு கொல்லுங்கள். பிளிக் டிராப்ட் கொண்டு கொல்லுங்கள்.

c)



$$K_c = \frac{[B(g)] \times [D(g)]}{[A(g)]} \quad \left\{ \quad K_p = \frac{p_{B(g)} \times p_{D(g)}}{p_{A(g)}} \right.$$

$$K_p = K_c \times P^{\Delta n}$$

$$K_p = \frac{[B(g)] \times [D(g)]}{[A(g)]} \times P^{\Delta n}$$

$$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2O(l)$$

NO.

* இம் ஏதாவது ஓர் கதையத்தின் சந்தர்துள்ளை லைபியன் ஏரணம் குறைகின்ற உணர்வு


→ வெப்பமற்றத்து ← பொதுவான குறை


→ வாயுக்களைக் குவிப்பதில் பெய்தல்

ஏதாவது வாயுவினை ~~குறை~~ சந்தர்துள்ளை உடனடி விசுவத்தல் பொதுவான அது கதையம், எண்ணு ஏற்றத்தால் சந்தர்துள்ளை வாயுமண்டலம் வெக்டர் குப்படுக.

In this question

SO₂ சந்தர்துள்ளை லை குவிவது பெய்தல் பொதுவான சந்தர்துள்ளை SO₂ க்கு அமை குறைவும், எண்ணு pH க்கு.





10 mol

$$P_B(y) = P(y) = \frac{1.5 \times 10^5 \text{ pW}}{10}$$

Scanned with CamScanner

$$K_c = \frac{18 \text{ mol m}^{-3}}{10^3 \text{ dm}^3}$$

$$\frac{18 \text{ mol}}{10^3 \text{ dm}^3}$$

$$K_c = 0.018 \text{ mol dm}^{-3}$$

or

$$pV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{p}$$

or

$$10 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298 \text{ K}$$

$$1 \times 10^5 \text{ Pa}$$


$$0.25 \text{ m}^3$$

$$K_c = \frac{[P_2O_5] \times [H_2O]}{[P_4O_{10}]}$$

$$\frac{1.5 \text{ mol}}{0.25 \text{ m}^3} \times \frac{0.5 \text{ mol}}{0.25 \text{ m}^3}$$

$$\frac{1.5 \text{ mol}}{0.25 \text{ m}^3}$$


$$K_c = 0.18 \text{ mol dm}^{-3}$$



$$P_{\text{total}} = 4 \cdot 9 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$pH_e = 3.5 \times 10^9 \text{ p.u.}$$

17°C இல் பரிசு அடையும் A(y) க்கு அளவு y மல எண்



He கிழக்கு

$$pV = nRT$$

$$pV = nRT$$

$$3.5 \times 10^5 \text{ Pa} \times V = 6.3 \text{ mol} \times R \times T \quad \text{--- (5)}$$

செழுந்தியற்று

$$pV = nRT$$

$$4.9 \times 10^9 \text{ Pa} \times r = nRT \quad \text{--- (2)}$$

$$\textcircled{2} \rightarrow \frac{4.9 \times 10^4}{3.5 \times 10^4} = \frac{n}{6.5}$$

$$n_{\text{total}} = 9.1 \text{ mol}$$

$$(2+y) + 6.5 \text{ mol} = 9.1 \text{ mol}$$


$y = 0.5 \text{ mg}$

$\therefore 17^\circ\text{C}$ க்கு பரிணாம அளவு ΔG° க்கு அளவு 0.6 mol ஆகும்.

உலகப் பரிணாம புவியியல் அமைப்பு

സമുദ്ര ഹരിത ശാിനം

என்று But



செனாட் புதிய சமர்ப்பணை

சிறையிலும், எல்லாம் அப்படி

எண்பவத்தின் மொ. சிவா

மாற்றமுதலிய

2007/07/01

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகப் பேரவை, சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகப் பேரவை, சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகப் பேரவை

பேரவை அங்குசம்: 37, பிழைப்பு: 1.9

$$P_A = \frac{1.9}{9.1} \times 4.9 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_A = P_B = \frac{0.6}{9.1} \times 4.9 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$K_P = \frac{P_B(\theta) \times P_A(\theta)}{P_A(\theta)}$$

$$K_P = \frac{\frac{0.6}{9.1} \times 4.9 \times 10^5 \times \frac{0.6}{9.1} \times 4.9 \times 10^5}{\frac{1.9}{9.1} \times 4.9 \times 10^5}$$

$$K_P = 1.38 \times 10^3 \text{ Pa}$$

iv

$$K_P(17^\circ\text{C}) < K_P(27^\circ\text{C})$$

∴ அகலையுத்தராகும்.

அதாவது 17°C க்குப் பிறகு அடையும். $A(\theta) = 0.6 \text{ mol}$
 27°C க்குப் பிறகு அடையும் $A(\theta) = 1.5 \text{ mol}$
 என்னவென்றால் அதற்குரிய பாய்வு பிறகு வீதம்
 அதிகரிக்கின்றது எனவே இது இது அகலையுத்தராகும்.


v

சூழலில் இயற்கையை நவீகப்படுத்தும் பாய்வு கணவனது அதிகரிக்கும்,
 பின்னர் இது கிடைக்கின்றது அல்லது அதிகரிக்கின்றது கிடைக்கின்றது
 தத்துவத்தின் படி சமவெண் இயற்கையை நவீகப்படுத்தும் எனவே
 கணவனது குறைவடையும், பின்னர் தகவல் சமவெண் அடையும்
 பின்னர் கணவனது பாய்வு


විශාල අංකය:

பரீட்சை கட்டுப்பாடு:

0.1 M AgNO_3



$$K_{sp} \text{Ag}_2\text{CrO}_4 = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-9}$$



$$K_{sp} = [Ag^+]^2 \times [CrO_4^{2-}]$$

$$[Ag^+]^2 = 1 \times 10^{-12} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[Ag^+] = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

Digitaria indica DC.

பின்னர் $AgCl$ வீழ்ப்பனமாதல் நிகழ்ந்ததில் $AgCl$ கிணர்
உருத்தல். $[Ag^+] = 1 \times 10^{-5} M$ ஆகும். ஸ்பாந்து $AgCl$ உரு
வீழ்ப்பனம் ஆகும்.

கிண்பலாறு வீழ்ப்பாறாறு $\rightarrow$ அடிநிலை

AgNO₃ கீதலாக உயர்பதும் கணத்தின் [Ag⁺] = 1 × 10⁻⁵ mol/dm³


$$K_{sp} \text{ AgCl} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} \rightarrow 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ (1)}^{\circ}$$

$$[Cl^-] = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

iii) AgNO_3 க்கு கண்ண டிரைபுதீனாக் கரைசலின் [பாதித்] கண்ணாலைப்
பாற்றுகிடுகை: $\text{AgNO}_3 + \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 \rightarrow \text{AgC}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HNO}_3$

$$(HA) K_a = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$pH = -\log H^+$$

$$3.2 = -\log_{10}(Hf)$$

$$10^{-3.12} = \text{HF}$$

$$10^{-4} + 0.79 = [H^+]$$

$$10^{-9} \times 10^{0.79} = [H^+]$$


$$10^9[H^+] = 10^{0.79}$$

$$\log 10^9 H^+ = \log 10^{29}$$

$$10^9 [H^+] = \text{Antilog } 0.79$$

$$[H^+] = 2.169 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$$

பாடம் முடிந்தவுடன், கருவாணி பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தனி தனி பக்கத்தில் பதிலளிப்பது.
 ஒத்த ச-மம்: வினா எ-மம்:
 காலம்: மணி நிமிஷம்



$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$\therefore \text{தேயப்பணியில்} \quad [HA] = \frac{[H^+]^2}{K_a}$$

$$6.169 \times 10^{-9} \times 6.169 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3} \\ 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{தேயப்பணியில்} \quad [HA] = 0.03802 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{CH}_3\text{COOH} \text{ பணியில் எஞ்சியுள்ள } [HA] = 0.057 - 0.038 \\ 0.019 \text{ mol dm}^{-3}$$

தேயப்பணியில், CH_3COOH கிழங்குப் பணியில் இருக்கும் = $[HA(H^+)]$


$$\frac{1000 \times 0.019 \times 6.169 \times 10^{-9}}{1000 \times 0.03802} = \frac{[HA(H^+)]}{[HA(CH_3COOH)]}$$

$$1000 \times 0.019 \times 6.169 \times 10^{-9} = 1000 \times 0.03802 \times [HA(H^+)]$$

$$2210.0 - 2210.0 = 1000 \times 0.03802 \times [HA(H^+)]$$

$$1000 \times 0.03802 \times [HA(H^+)] = 2210.0 - 2210.0$$

$$1000 \times 0.03802 \times [HA(H^+)] = 2210.0 - 2210.0$$

[illegible]

சுதானத் திக்கு ஸ்தலம் NaOH
 எதிர்ப்பு. பல்புடன் HA தாக்கமுற்று
 NaOH குகலனய்து H_2O தூண்டுக
 தவ்வாறு தூண்டல் தீர்க்கையகமாறு
 CHCl_3 பதையினுள், எதிர்ப்புடன்
 HA ப்ரலி சமனின், சாடையுட.

~~എഡ്വർഡ്~~ കുട്ടി

CHCl_3 പരമാവധി മൂല്യം H_2O പരമാവധി പരിധി

$\text{mol HA} \rightarrow x \text{ mol}$ ശതമാനം

CHCl_3 පරිපූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන $\text{mol HA} = (0.015 - x) \text{ mol}$

രസഗ്നിത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കൽ തർക്കം ~~KD~~ ഗൗരവ് 10.6.11
KD

~~$$K_0 = [H^+] \times [A^-]$$~~

$$K_D = \frac{[HA][H_2O]}{[HA \cdot (H_2O)]}$$

$$2 \approx \frac{x}{(0.015 - x)}$$

$$2.2 \times 10^{-3} \text{ (for } 600^\circ\text{C)} \quad n = 0.01 \text{ mol}$$

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ

~~XXXXXXXXXXXX~~


HA mol = 0.01 mol

ഉപയോഗിച്ച് $[H^+] = \frac{0.01 \text{ mol}}{500 \times 10^3 \text{ dm}^3}$


ಪ್ರಾರಂಭಿಕ $[HA] = 0.02 \text{ mol dm}^{-3}$

~~HA~~ $[NaA] = 0.0135$
 500×10^{-3}


0.027 mol dm⁻³



NaA ക്കാണ് ലിത്തലകൃമ $[A^-] = 0.027 \text{ mol dm}^{-3}$



HA $\rightarrow y$ അർ



$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$

$1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{y \times (0.027 + y)}{(0.02 - y)}$

HA 35 ഡെൻണാർ ക്കാണ് ലിത്തലകൃമ y ക്കിൽ അത്
0.027+y $\approx$ 0.027 $(0.02 - y) \approx 0.02$

