



කාබනික රසායනය - ආම්ලික/භෂ්මික ගුණ විචලනය


▲ සංයෝගයකට මාධ්‍යයට H^+ නිදහස් කිරීමට ඇති හැකියාව ආම්ලිකතාවය යි.



සංයෝගවල පොදුවේ ආම්ලික විචලනය



1) හයිඩ්‍රොකාබන



- ✓ C හි මුහුම්කරණයේ S ගුණ $\uparrow$
- ✓ (කාබන්මය වල දිග $\downarrow$)
- ✓ C හි විද්‍යුත් සෘණතාවය $\uparrow$
- ✓ C-H බන්ධන ධ්‍රැවීයතාවය $\uparrow$
- ✓ ආම්ලිකතාවය $\uparrow$


2) මධ්‍යසාර

*
*ෆ් ජලයට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් අඩු වේ. (මෙතනෝල් හැර)

▲ O-H බන්ධනයේ ධ්‍රැවීයතාවය ඉහළ යෑමේ දී H^+ නිදහස් වීමේ හැකියාව වැඩි වේ.

▲ R කාණ්ඩය විශාල වන විට,


- ✓ එමගින් O වෙත e ආයත කිරීම. $\uparrow$
- ✓ O මගින් O-H බන්ධනයේ e ඇදීම. $\downarrow$
- ✓ $\therefore$ O-H බන්ධනයේ ධ්‍රැවීයතාවය $\downarrow$
- ✓ $\therefore$ H^+ නිදහස් කිරීම $\downarrow$
- ✓ $\therefore$ ආම්ලිකතාවය $\downarrow$



meta - စိတ်ကူး



ortho-para - ~~25~~ 25%.

- උදා :- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ හා $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ සලකමු.

[illegible]

විනෝද් හි ආම්ලිකතාවය

- ♣ සාමාන්‍ය මධ්‍යසාරවලට සාපේක්ෂව හීනෝල් වඩා ආම්ලික වේ.



- ♣ එනම් (2) ට සාපේක්ෂව (1) හි සමතුලිතය වඩා දකුණට යොමු වී ඇත. ($K_{c1} > K_{c2}$)

- ♠ මිට හේතුව.

ගිනෝලුවලට සාපේක්ෂව ගිනෝ
 අයනයේ ස්ථායීතාවය


ඇල්කොහොලයට සාපේක්ෂව ඇල්කොක්සයිඩ්
අයනයේ ස්ථායීතාවය

මීට හේතුව, ඩෙන්සිත් වලය හේතුවෙන් ෆීනෝ අයනයේ (-) ආරෝපණය සම්ප්‍රසාරණය වන විටදී හැරීමයි. (විස්ථානගත කිරීම)


- ♣ ගිනෝලු හි බෙන්සීන් චලයට සක්‍රියත බැඳීමේ දී ආම්ලිකතාවය ↓ වේ.

- ♣ - පිනොල් හි බෙන්සීන් චලයට වික්‍රියක බැඳීමේ දී ආම්ලිකතාවය ↑ වේ.

උදා :- ආමිලික ප්‍රභලතාවය මත,



- ආ තයිට්‍රේෂන්හි ආම්ලිකතාවය -NO₂ බැඳී ඇති ස්ථානය meta < ortho < para යන පිළිවෙලින් වැඩි වේ. (POM)



* ortho-para exchange
(உணர்வு பரிமாற்றம்)

* meta අගනුවර වන්නේ

മയിലേ ദുഷ്ടനായട | പാപാശിത ഉപഗതഗത

meta ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱରୂପ

2. ସଂକ୍ରମଣ ମିଥା ଲବଣର ଫ୍ଲୁଇଡ


H m N യുടെ ഉത്തരം കണ്ടു

2. Paralel രേഖ മുഖം -



NO_2 ഉണ്ടാകുന്നു

৩৩ - (স্বাধীনতা সংগ্রামের ৩৩)

3) කාබොක්සිලික් අම්ල




ඉහත ලැබෙන කාබොක්සිලේට් අයනය පහත පරිදි සමප්‍රසන්නතාව මත ස්ථායී වේ. ∴ සමතුලිතය වඩා දකුණට බර වී ආම්ලිකතාවය වැඩි වේ.




▲ මධ්‍යසාර සම්බන්ධව පැහැදිලි කළ ආකාරයටම මෙහි දී ද R කාණ්ඩය විශාල වන තරමට ආම්ලිකතාවය අඩු වේ.




▲ R කාණ්ඩයට කිසියම් විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි පරමාණුවක් බැඳී ඇති විට ආම්ලිකතාවය වැඩි වේ.



▲ ආම්ලිකතාව මත




▲ පරිසර ද්‍රාවණයක ඉහළ ම ආම්ලිකතාවයක් ලබාදෙන කාබනික සංයෝගය අම්ල ක්ලෝරයිඩ් වේ.

	Na	NaOH	Na ₂ CO ₃ / NaHCO ₃
$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\uparrow$	X	X
$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\uparrow$	X	X
	 + H ₂ ↑	 + H ₂ O	X
CH_3COOH	$\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\uparrow$	$\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$	$\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

භාෂ්මික ප්‍රචලතාවය


- ▲ මෙහි දී ප්‍රධාන වශයෙන් **e දායක කිරීමේ හැකියාව හා H^+ ලබාගැනීමේ පහසුව යන කරුණු සලකයි.**

භාෂ්මිකතාවය මත, $R-OH < R-NH_2$ වේ.



ඇල්කිල් ඔක්සෝනියම් අයනය

O මත (+) → ඉලෙක්ට්‍රෝන ඈත් වීම



ඇල්කිල් ඇමෝනියම් අයනය

N මත (+) කාබන්ගේ ඝූර්ණයේ (-) බව

එනම් (2) සමතුලිතය (1) ට සාපේක්ෂව වඩා දකුණට බරවේ ($K_{C2} > K_{C1}$)

ඇමිනියට සාපේක්ෂව ඇල්කිල්
ඇමෝනියම් අයනයේ ස්ථායීතාව




ඇල්කොහොලයට සාපේක්ෂව ඇල්කිල්
ඔක්සෝනියම් අයනයේ ස්ථායීතාව

මීට හේතුව, විද්‍යුත් සෘණතාවය අඩු N ට වඩා පහසුවෙන් (+) ආරෝපණයක් දරා සිටීමට හැකි වීම හා වඩා පහසුවෙන් e දායක කිරීමයි.


නයිට්‍රජන් සංයෝගවල භාෂ්මිකතා විචලනය

භාෂ්මිකතාවය මත,



- ▲ බෙන්සීන් වලය සක්‍රියනය කිරීමට e විස්භාහගත වන බැවින් N මත e සහත්වය අඩු වී භාෂ්මිකතාවය අඩු වේ.
- ▲ සම්ප්‍රසාරණතාවය මත ද පහත පරිදි මෙය පැහැදිලි කළ හැක.
- ▲ ඇමයිඩ් හි බෙන්සීන් වලයට

සක්‍රියක බැඳී ඇති විට - භාෂ්මිකතාව ↑ - ඉලෙක්ට්‍රෝන දායක වීමට අපහසුයි.
 වික්‍රියක බැඳී ඇති විට - භාෂ්මිකතාව ↓



ඇමයිඩ්

පහත පරිදි සම්ප්‍රසාරණ ව්‍යුහ සෑදීම මගින් N මතට ආංශික (+) ආරෝපණයක් ලැබෙන බැවින් එහි e සහත්වය බෙහෙවින් අඩු වී භාෂ්මිකතාව අඩු වේ.



කාබනික සංයෝග වල ද්‍රව්‍යාංක හා සංයුත විචල්‍යතා

භූමියේ විවිධ කාලයන්හි සංරක්ෂණය වන තාක් කාලය විවිධ වන අතර භූමියේ විවිධ
 වන විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන්
 විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන් විවිධයන්

0වි.
ප්‍රතික්ෂේපක බලය
 $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{H} / \text{R}$
ප්‍රතික්ෂේපක බලය +
ද්‍රෝණී ප්‍රතික්ෂේපක බලය

ප්‍රතික්ෂේපක බලය
 $+ \text{H}$ හන්ධන සන්නාමය නැත.

ඔක්සිජනයෙන් < $\text{R}-\text{Cl}$ < $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{H} / \text{R}$ < $\text{R}-\ddot{\text{N}}\text{H}_2$ < $\text{R}-\text{OH}$ < $\text{R}-\text{COOH}$.


හස්තුගත
ද්‍රෝණී ප්‍රතික්ෂේපක බලය
ද්‍රෝණී - ද්‍රෝණී
+ ප්‍රතික්ෂේපක බලය
ද්‍රෝණිය.

ශ්‍රී ලංකා කාලය

හිඬුකොත නිල්වේල ඉන්න බවින් ඒවා සතුට පෑත්තේ ඉහතින් ලෙ තෙත්.
ඉහතින් ලෙ ඉහළතම දේ, තෙත්ත තෙත්ත 2 කි.

01. ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාත්මක විය
02. ඉන්ද්‍රිය නිවැරදිව විය.


ලුණක සාධන 2කම ලුණු යන තරමට ප්‍රතිරෝධය බල ප්‍රතිරෝධය වැඩිවීමෙන්
 ලුණයේ නිශාංශ ලුණු යයි.



- ප්‍රතිරෝධය ↑
- ප්‍රතිරෝධය බල ප්‍රතිරෝධය ↑
- නිශාංශ ↑

marks




— OH	2
= O	1
— Cl / Br	0.5



- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ. (මේ නිසා ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.)
- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.
- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.
- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.
- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.




ප්‍රාථමික රේඛීය

රේඛීය කාණ්ඩය ලැබිය යුතු වන්නේ සමස්ත ජාත්‍යන්තර ප්‍රතික්රියාකාරීතාවය අඩුම වන විටය. මේ රේඛීය ප්‍රාථමික රේඛීය බල කාරක බලපෑමෙන්ම මුදාහරින ලද්දේ ස්පර්ශක බල ප්‍රබලතාව මතය.



- ප්‍රතික්රියාකාරීතාවය ↑
- ප්‍රතික්රියාකාරී බල ප්‍රබලතාව ↑
- කාලය ↑


②



- ප්‍රතික්රියාකාරීතාවය ↑
- ප්‍රතික්රියාකාරී බල ප්‍රබලතාව ↑
- කාලය ↑

තාවනික සංයෝග වල පල දාවයන විචලනය

තෙදුරේ තිබූ කාබනික සංයෝගවල ඒම දාවයන විචලනය පහත පරිදි වේ.



කිසිවක් වලට කාබනේම වූත් සමඟ H බන්ධන සෑදීමට නොහැකි නමුත් ඒම වූත් සමඟ H බන්ධන සෑදිය හැක.

නානංක තිබෙනයේ දී හයිඩ්‍රොකාබන් දාමය භිභවත කරමට නානංක ට්‍රාසයන නමුත් ඒම දාවයනවයේ දී හයිඩ්‍රොකාබන් දාමය භිභවත කරමට ඒම දාවයනවය පහළ යයි.