

# לטאות:

כוללת את כל הזוחלים בעל- היא קבוצה של זוחלים (שם מדעי: Lacertilia) לטאות -בעבר נחשבה קבוצת הלטאות תת. והנחשים למעט מחודקי הראש, סדרת הלפידוזאוריה מתייחסים אליה כיום כקבוצה שאינה חלק אולם בגלל היותה פרפילטית, סדרה מהטקסונומיה.

קיימים כ-6,000 מינים של לטאות, החל מלטאות זעירות ועד ללטאות דרקון הענקיות קומודו.

פרט למינים מסוימים שבהם הגפיים חסרות. וארבע רגליים לרוב סוגי הלטאות יש זנב ישנן לטאות. דוגמה ללטאה חסרת-גפיים המצויה בטבע בישראל היא קמטן החורש ארוכה מאוד, המשמשת לחישה וללכידת מתאפיינות בכושר שחייה מצויין ולחלקן לשון אך, המשמש להרחקה). רוב הלטאות הן טורפות) פרודות ריח המועברות לאיבר יעקובסון חלקן גם צמחוניות. ככל הנראה, הלטאה הנדירה בעולם היא האיגואנה ולגדלו לרבות ממני הלטאות יש יכולת לנתק את זנבן. (Cyclura collei) הג'מייקנית מחדש.

