

2026 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）


数 学

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

- (1) 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$
(A) $\{x \mid x > -1\}$ (B) $\{x \mid x < 3\}$
(C) $\{x \mid x \geq 2\}$ (D) $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$
- (2) 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -5 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| = (\quad)$
(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 8
- (3) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 $a = (\quad)$
(A) $\sqrt{3}$ (B) 3 (C) 6 (D) 9
- (4) 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, 若 x^2 的系数是 280, 则实数 $a = (\quad)$
(A) 2 (B) -2 (C) 1 (D) -1
- (5) 下列函数中, 是奇函数且在其定义域上单调递增的是 $(\quad)$
(A) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ (B) $y = 2^{-x} - 2^x$
(C) $y = \sin x$ (D) $y = \ln \frac{5+x}{5-x}$
- (6) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = (-3, 0)$ 且 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 1$, 则下列说法正确的是 $(\quad)$
(A) $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 1 (B) $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 3
(C) $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 3 (D) $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 4
- (7) 已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为无穷数列, 则“存在常数 M , 使得 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”是“ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”的 $(\quad)$
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件
- (8) 设函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 若将 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度, 所得图象与 $y = f(x)$ 的图象关于 x 轴对称, 则满足条件的 φ 的个数为 $(\quad)$
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (9) 为纪念红军长征胜利 90 周年, 某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学, 每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数, 若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数, 则 $(\quad)$
(A) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数
(B) 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数
(C) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数
(D) 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数

- (10) 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化，被广泛应用于多个领域。已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$ ，其中 A, B 为定点， C, D 为动点， $AB = 4$ ， $BC = \frac{5}{2}$ ， $CD = 3$ ， $AD = 1$ ，则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围是 ()




- (A) $\left[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}\right]$ (B) $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$ (C) $\left[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}\right]$ (D) $\left[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}\right]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

- (11) 若直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切，则 $a =$ _____.
- (12) 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_6 = 6a_6 + 30$ ，则 $d =$ _____，使得 $S_n \leq S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为_____.
- (13) 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就。在处理机器人语音信号时，常用公式 $F(f) = k \lg \left(1 + \frac{f}{700}\right)$ (其中常数 $k > 0$) 将声音频率 f (单位: Hz) 转换为 $F(f)$ 。若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k \lg 2, 3k \lg 2]$ ，则 f 的取值范围是_____.
- (14) 如图，在三棱锥 $A - BCD$ 中， $AB = AC = AD = 2\sqrt{2}$ ， $BC = BD = 2$ ， $CD = 2\sqrt{3}$ ，则三棱锥的底面积为_____，体积为_____.



- (15) 已知 c 是非负常数，函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ ，给出下列四个结论：
- $f(x)$ 在区间 $(-1, 1]$ 上有最小值和最大值；
 - 当 $c = 1$ 时， $f(x)$ 在区间 $(1, 2]$ 上有最大值；
 - 当 $c = 0$ 时，方程 $f(x) = 1$ 的解集有 3 个元素；
 - 当 $c > 0$ 时，方程 $f(x) = c$ 的解集有 4 个元素。
- 其中正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

设函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), 已知 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, $f(0) > 0$.

(I) 求 ω, φ 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

(17) (本小题 13 分)

为了解某校高三年级学生的数学学习情况，随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩，整理成下表：

成绩	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立，用频率估计概率.

(I) 估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率;

(II) 从该校高三年级学生中随机抽取 4 人，估计在这次考试中，2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率;

(III) 为分析该校高三年级学生的数学学习情况，可采用三种方法，将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩，分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$ ，判断 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$ 的大小关系 (结论不要求证明).

(18) (本小题 14 分)

如下图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D, E 分别为 AC, A_1B_1 的中点， $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, $BB_1 = \sqrt{2}$.

(I) 求证: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;


(II) 设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部， $PE \parallel B_1C_1$ ，再从条件 1、条件 2、条件 3 这三个条件中选择一个作为已知，使点 P 的位置唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值.

条件 1: $PA = PD$;

条件 2: $PA \perp BC$;

条件 3: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE .

注：如果选择的条件不符合要求，第 (II) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.



(19) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C . 点 B 关于直线 $y = x$ 的对称点为 D , 直线 CD 与直线 $y = x$ 交于点 Q . 设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k 的值.

(20) (本小题 15 分)

设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ ($n \in \mathbf{Z}$). 已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2 y + e^2 + 8 = 0$.

(I) 求 m, n 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的极值点个数;

(III) 求直线 $l: y = kx - 1$ ($k > 0$) 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数.

(21) (本小题 15 分)

设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij} , 且 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$).

若对任意的 $k, l \in \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $p, q \in \{1, 2, \dots, n\}$, 当 $l > k, q > p$ 且 $(l - k) - (q - p) \in \{-2, 2\}$ 时, 均有 $a_{kp} + a_{kq} + a_{lp} + a_{lq} = 0$, 则称数表 A 具有性质 P .

(I) 分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P (只需写出结论):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(II) 当 $m = 4, n = 5$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 求 A 中 1 的个数的最大值;

(III) 当 $m = n = 6$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 且 $a_{11} = 1$, 证明:

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j} \quad (i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 6)$$