


Méthodes Numériques Avancées

Pour la Finance : Examen 2020-2021



Adnane EL KASMI (ING2 MF01)
À l'attention de : Irina Kortchemski

Table des matières

I	Introduction	2
1	Présentation	2
2	Modèle de Black et Scholes	2
3	Simulation d'évolution du prix de l'actif sous-jacent par la méthode aux Différences Finies	3
4	Rappels sur les méthodes de Monte Carlo	4
5	Les grecques des options	4
II	Problème 1 :	5
1	Partie 1 :	5
2	Partie 2 :	8
3	Partie 3 :	10
III	Problème 2 :	12
1	Partie 1 :	12
2	Partie 2 :	15
IV	Problème 3 :	17
1	Partie 1 :	17
V	Problème 4 :	19
1	Partie 1 :	19
VI	Problème 5 :	21
1	Partie 1 :	21
VII	Conclusion	24

I Introduction

1 Présentation

Les méthodes numériques fondées sur les équations aux dérivées partielles n'étaient pas très populaires Jusqu'à récemment. Les modèles obtenus par des arguments probabilistes et simulés par les méthodes de Monte-Carlo sont en effet plus naturelles et il est plus facile à implémenter des méthodes stochastiques que les algorithmes utilisés pour les EDP. Cependant, quand il est possible discrétiser les EDP, les algorithmes pour la résolution des équations discrétisées sont très efficaces. Les solutions, numériques des EDP donnent plus d'informations. Elles donnent, par exemple, les prix d'une option pour toutes les valeurs initiales de l'actif sous-jacent et pour toutes les valeurs du temps d'exercice, tandis que les méthodes de Monte-Carlo les donnent pour une seule valeur de l'actif et du temps d'exercice. Les EDP sont aussi très efficaces pour le calcul des Grecs.

Les PDF en finance possèdent plusieurs caractéristiques. On travaille sur des domaines temporels et spatiaux finis. On doit impérativement imposer des conditions aux limites et des conditions initiales. Les équations sont souvent paraboliques, mais elles peuvent aussi contenir les termes hyperboliques, comme par exemple l'EDP pour les options asiatiques.

Des modèles de stratégie de hedging du marché non-liquide ont permis d'arriver à une équation de Black et Scholes non linéaire. La résolution numérique des ces équations sont indispensables.

2 Modèle de Black et Scholes

L'actif sous-jacent S est un processus stochastique $S(t)$, $t \in [t, T]$ qui vérifie l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t \text{ avec } S_{t=0} = S_0$$

On note σ la volatilité de l'action, r le taux d'intérêt. La solution de cette équation est donnée par la formule :

$$S(t) = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t) \right]$$

Le prix d'une Option Européenne au moment de temps t est donnée par l'espérance conditionnelle d'une fonction Pay-Off :

$$V(S_0, t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}[\max(S(T) - K, 0) | S_t = S_0]$$

On peut expliquer ce résultat de façon suivante : on simule un grand nombre de chemins d'évolution de l'actif $S(t)$ sur l'intervalle de temps $[t, T]$, en partant toujours de S_0 . Pour chaque chemin on cherche la valeur finale $S(T)$. Puis on calcule la moyenne arithmétique de gains, c'est-à-dire de $\max(S(T) - K, 0)$. Le facteur $e^{-r(T-t)}$ exprime le fait qu'une banque rembourse les intérêts sur l'intervalle du temps $[t, T]$.

3 Simulation d'évolution du prix de l'actif sous-jacent par la méthode aux Différences Finies

L'évolution de l'actif sous-jacent S est un processus stochastique $S(t)$, $t \in [0, T]$ qui vérifie l'équation différentielle stochastique suivante:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S(0) = S_0$$

On note σ la volatilité de l'actif, r le taux d'intérêt.

La méthode 1 consiste à discrétiser l'équation stochastique par les Différences Finies, puis la simuler.

- Discrétisons l'intervalle $[0, T]$ sur N parties: $(\Delta t = T/N, \quad t_i = i \Delta t)$.
- Discrétisons le différentiel

$$dS(t_i) \sim S(t_i + \Delta t) - S(t_i) \equiv S_{t_{i+1}} - S_i$$

- Discrétisons le différentiel

$$dW(t_i) \sim W(t_i + \Delta t) - W(t_i) \equiv W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$$

- Discrétisons l'équation différentielle

$$S_{t_{i+1}} - S_{t_i} = rS_{t_i}\Delta t + S_{t_i}\sigma(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

soit

$$S(t_{i+1}) = S_{t_i}((1 + r\Delta t) + \sigma(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}))$$

- Simulons pour **un** chemin du mouvement Brownien:

$$\begin{cases} W_0 = 0 \\ W_{t_1} = g_1\sqrt{\Delta t} \\ W_{t_2} = W_{t_1} + g_2\sqrt{\Delta t} \\ W_{t_N} = W_{t_{N-1}} + g_N\sqrt{\Delta t}, \end{cases}$$

où les nombres $\{g_i\}$ suivent la loi Normale $\mathbb{N}(0, 1)$.

- Pour ce chemin du mouvement Brownien simulons le chemin correspondant à l'évolution de l'actif

$$S(t_{i+1}) = S(t_i)((1 + r\Delta t) + \sigma(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}))$$

$$\begin{cases} S_0 = S_{t_0} \\ S_{t_1} = S_{t_0}((1 + r\Delta t) + \sigma(W_{t_1} - W_{t_0})) \equiv S_{t_0}((1 + r\Delta t) + \sigma\sqrt{\Delta t}g_1) \\ S_{t_2} = S_{t_1}((1 + r\Delta t) + \sigma(W_{t_2} - W_{t_1})) \equiv S_{t_1}((1 + r\Delta t) + \sigma\sqrt{\Delta t}g_2) \\ S_{t_N} = S(t_{N-1})((1 + r\Delta t) + \sigma(W_{t_N} - W_{t_{N-1}})) \equiv S_{t_{N-1}}((1 + r\Delta t) + \sigma\sqrt{\Delta t}g_N) \end{cases}$$

4 Rappels sur les méthodes de Monte Carlo

Les méthodes de Monte Carlo sont nées grâce à Louis Buffon mathématicien du XVII^{ème} siècle. Il a ainsi entrevu une possibilité pour calculer le nombre π numériquement. En effet, en lançant un grand nombre d'aiguilles et en comptant celles qui touchaient deux stries il détenait une valeur approximative de la probabilité. Cette expérience repose sur un théorème : **la loi forte des grands nombres**. La méthode de simulation de Monte-Carlo permet aussi d'introduire une approche statistique du risque dans une décision financière.

5 Les grecques des options

Les grecques des options permettent de comprendre le changement du prix d'une prime d'option lorsque les variables changent. Les grecques delta, gamma, véga et thêta permettent de comprendre comment le prix des options se forme. Celles-ci sont primordiales pour le négociateur en options. Ainsi, une prime d'option est déterminée notamment par le cours de la valeur sous-jacente, la durée de l'option jusqu'à son échéance et la volatilité. Ces trois variables ne sont pas constantes. La volatilité sur le marché des actions augmente avec l'incertitude, ce qui génère un gonflement des primes des options.

Le delta Δ : est la plus importante des grecques. Il porte sur la variation du prix d'une option par rapport à la variation du prix de la valeur sous-jacente. Le delta mesure donc l'amplitude de la variation de la prime d'option en cas de hausse ou de baisse de l'action sous-jacente.

Le gamma Γ : mesure la variation du delta qui est engendrée par une variation du cours du sous-jacent. Les options à la monnaie ont le gamma le plus élevé vu qu'une fluctuation de la valeur sous-jacente agit fortement sur le delta de ces options.

(Delta et gamma, vitesse et accélération du prix d'une option).

Le bêta β : désigne la volatilité d'un actif par rapport à son marché. Utilisé dans le Modèle d'évaluation des actifs financiers (MÉDAF), le bêta permet d'évaluer la valeur d'un actif en fonction du taux sans risque et de la rentabilité attendue sur le marché.

(Beta, une mesure relative de la volatilité).

Le véga V : d'une option correspond au taux de variation d'une option consécutive à une variation de la volatilité. Si la volatilité baisse, les cours du sous-jacent fluctueront moins ce qui fera baisser le prix des options. Et à l'inverse, une volatilité qui augmente fera augmenter la fluctuation des cours du sous-jacent et le prix des options monte.

(Véga, le risque lié à la volatilité)

Le thêta Θ : mesure la perte de valeur d'une option au fil du temps. Toutes choses égales par ailleurs, une option perd en effet de la valeur au fur et à mesure qu'elle se rapproche de sa date d'échéance.

(Thêta, le temps c'est de l'argent).

Le rho ρ : mesure la sensibilité d'une option par rapport à un changement du taux sans risque. Il s'obtient en effectuant la dérivé du prix d'une option par rapport au taux sans risque.

(Rho, le risque du taux sans risque).

II Problème 1 :

1 Partie 1 :

→ Question 1 :




FIGURE 1

→ Question 2 :





FIGURE 2

→ Question 3 :



```
>> Question1_2_3
fx V(t=T/3, S=6)=5.272167>>
```

FIGURE 3

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 1 :

```
1 - visualiser_fonction_V()
2
3 - function [] = visualiser_fonction_V()
4
5     % Définition des constantes %
6
7 - L=30;
8 - K=10;
9 - T=0.5;
10 - sigma=0.5;
11 - N=99;
12 - M=4999;
13
14     % Définition des vecteurs %
15
16 - S=linspace(0,L,N+2);
17 - t=linspace(0,T,M+2);
18 - dt=T/(M+2);
19 - ds=L/(N+2);
20 - V=zeros(M+2,N+2);
21
22 - r=0.4;
23
24     % Implementation de la condition finale %
25
26 - for j=1:N+2
27 -     V(M+2,j)=Pay_off_Asset(S(j),K);
28 - end
29
30     % Implementation des conditions aux limites Dirichlet %
31
32 - for k=1:M+1
33 -     V(k,1)=0;
34 -     V(k,N+2)=0;
35 - end
36
37     % Discrétisation de l'équation de Black et Scholes %
38
39 - for n=M+2:-1:2
40 -     for i=2:N+1
41 -         V(n-1,i)=V(n,i)+dt*(r*S(i)*(V(n,i+1)-V(n,i-1))/(2*ds)+(1/2)*(sigma^2)*(S(i)^2)*((V(n,i+1)+V(n,i-1)-2*V(n,i))/(ds^2))-r*V(n,i));
42 -     end
43 - end
44
45     % Question 1
46 - figure;
47 - hold on;
48 - plot(S,V(M+2,:));
49 - plot(S,V(1,:));
50 - legend('V(t=T,S)','V(t=0,S)');
51 - title('Prix de 1 option t=0 et t=T')
52
53     % Question 2
54 - figure;
55 - mesh(S,t,V)
56 - xlabel('Prix de l actif S_t')
57 - ylabel('temps t')
58 - zlabel('Prix de l option V')
59 - title('Surface du prix de l'option ASSET')
60
61     % Question 2
62 - fprintf('V(t=T/3,S=6)=%f',V(floor(T/(3*dt))+1,floor(6/(ds))+1));
63
64 - end
65
66     % la condition finale %
67
68 - function [f] = Pay_off_Asset(S,K)
69
70 - if (S > K)
```

FIGURE 4

2 Partie 2 :

→ Question 4 et 5 :




FIGURE 5

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 2 :

```
1 - visualiser_fonction_V()
2
3 - function [] = visualiser_fonction_V()
4
5     % Définition des constantes %
6
7 - L=30;
8 - K=10;
9 - T=0.5;
10 - sigma=0.5;
11 - N=99;
12 - M=4999;
13
14     % Définition des vecteurs %
15
16 - S=linspace(0,L,N+2);
17 - t=linspace(0,T,M+2);
18 - dt=T/(M+2);
19 - ds=L/(N+2);
20 - Vneu=zeros(M+2,N+2);
21 - Vdir=zeros(M+2,N+2);
22 - Vneu=zeros(M+2,N+2);
23
24 - r=0.4;
25
26     % Implementation de la condition finale %
27
28 - for j=1:N+2
29 -     Vdir(M+2,j)=Pay_off_Asset(S(j),K);
30 -     Vneu(M+2,j)=Pay_off_Asset(S(j),K);
31 - end
32
33     % Implementation des conditions aux limites Dirichlet %
34
35 - for k=1:M+1
36 -     Vdir(k,1)=0;
37 -     Vdir(k,N+2)=0;
38 - end
39
40     % Discrétisation de l'équation de Black et Scholes %
41
42 - for n=M+2:-1:2
43 -     for i=2:N+1
44 -         Vdir(n-1,i)=Vdir(n,i)+dt*(r*S(i)*(Vdir(n,i+1)-Vdir(n,i-1))/(2*ds)+(1/2)*(sigma^2)*(S(i)^2)*((Vdir(n,i+1)+Vdir(n,i-1)-2*Vdir(n,i))/(ds^2))-
45 -         Vneu(n-1,i)=Vneu(n,i)+dt*(r*S(i)*(Vneu(n,i+1)-Vneu(n,i-1))/(2*ds)+(1/2)*(sigma^2)*(S(i)^2)*((Vneu(n,i+1)+Vneu(n,i-1)-2*Vneu(n,i))/(ds^2))-
46
47         % Question 4
48
49         % Implementation des conditions aux limites Neumann %
50
51         %Pour S=0
52 -         Vneu(n-1,1)=Vneu(n-1,2)-ds;
53         %Pour S=L
54 -         Vneu(n-1,N+2)=Vneu(n-1,N+1);
55
56
57 - end
58 - end
59
60
61     % Question 5
62 - figure;
63 - hold on;
64 - plot(S,Vneu(M+2,:));
65 - plot(S,Vneu(1,:));
66 - plot(S,Vdir(1,:),'.','LineWidth',0.01);
67 - legend('t=T','Neumann t=0','Dirichlet t=0');
68 - title('Prix de l option t=T et t=0')
69
70
71
72 - end
73
74     % la condition finale %
```

FIGURE 6

3 Partie 3 :

→ Question 6 :




FIGURE 7

→ Question 7 :




FIGURE 8

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 3 :

```
1 - visualiser_delta()
2
3 - function [] = visualiser_delta()
4
5 - % Définition des constantes %
6
7 - L=30;
8 - K=10;
9 - T=0.5;
10 - sigma=0.5;
11 - N=99;
12 - M=4999;
13
14 - % Définition des vecteurs %
15
16 - S=linspace(0,L,N+2);
17 - t=linspace(0,T,M+2);
18 - dt=T/(M+2);
19 - ds=L/(N+2);
20 - V=zeros(M+2,N+2);
21 - delta=zeros(M+2,N+2);
22
23 - r=0.4;
24
25 - % Implementation de la condition finale %
26
27 - for j=1:N+2
28 -     V(M+2,j)=Pay_off_Asset(S(j),K);
29 - end
30
31 - % Implementation des conditions aux limites Dirichlet %
32
33 - for k=1:M+1
34 -     V(k,1)=0;
35 -     V(k,N+2)=0;
36 - end
37
38 - % Discrétisation de l'équation de Black et Scholes %
39
40 - for n=M+2:-1:2
41 -     for i=2:N+1
42 -         V(n-1,i)=V(n,i)+dt*(r*S(i)*(V(n,i+1)-V(n,i-1))/(2*ds)+(1/2)*(sigma^2)*(S(i)^2)*((V(n,i+1)+V(n,i-1)-2*V(n,i))/(ds^2))-r*V(n,i));
43 -     end
44 - end
45
46 - for n=1:M+2
47 -     for i=1:N+1
48 -         delta(n,i)=(V(n,i+1)-V(n,i))/ds;
49 -     end
50 -     delta(n,N+2)=0;
51 - end
52
53 - % Question 6
54 - figure;
55 - hold on;
56 - plot(S,delta(1,:));
57 - legend('\Delta(t=0,S)');
58 - title('Graphe de delta pour t=0')
59
60 - % Question 2
61 - figure;
62 - mesh(S,t(1:floor(T/(2*dt))+1),delta(1:floor(T/(2*dt))+1,:));
63 - xlabel('Prix de l'actif S_t');
64 - ylabel('temps t');
65 - zlabel('Delta');
66 - title('Surface de Delta')
67
68 - end
69
70 - % la condition finale %
71
72 - function [f] = Pay_off_Asset(S,K)
73
74 - if (S < K)
75 -     f=S;
76 - elseif (S >= K)
77 -     f=0;
78 - end
79
80
81 - end
```

FIGURE 9

III Problème 2 :

1 Partie 1 :

→ Question 1 :




FIGURE 10

→ Question 2 :

```
>> Question1_2_3  
V(t=T/3, S0=6)=4.557992>> Question1_2_3
```

FIGURE 11

→ Question 3 :




FIGURE 12

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 1 :

```
1 |
2 volatilite_fixe()
3
4 function [] = volatilite_fixe()
5
6 % Définition des constantes et vecteurs %
7
8 L=30;
9 T=0.5;
10 Ns=99;
11 Nt=99;
12 ds=L/Ns;
13
14 for j=1:(Ns+1)
15     for k=1:(Nt+1)
16         St(j)=(L/Ns)*(j-1);
17         t(k)=(T/Nt)*(k-1);
18         V(k,j)=Prix_Call_St_fixe_t_fixe(t(k),St(j));
19     end
20 end
21
22
23
24
25 % Question 1
26
27 figure;
28 hold on;
29 plot(St,V(Nt+1,:));
30 plot(St,V(1,:));
31 legend('V(t=T,S)','V(t=0,S)');
32 title('Prix de 1 option t=T et t=0 par MC pour N_{mc}=10000')
33
34 % Question 2
35
36 fprintf('V(t=T/3,S0=6)=%f',V(floor(T/(3*ds))+1,floor(6/(ds))+1));
37
38 % Question 3
39
40 figure;
41 mesh(St,t,V)
42 xlabel('Prix de 1 actif S_t')
43 ylabel('temps t')
44 zlabel('Prix de 1 option V')
45 title('Surface du prix de loption par MC pour N_{mc}=10000')
46
47 end
48
49 function [prix] = Prix_Call_St_fixe_t_fixe(t,St)
50
51 % Définition des constantes et vecteurs %
52
53 K=10;
54 T=0.5;
55 r=0.4;
56 sigma=0.5;
57 Nmc=10000;
58
59 for n=1:Nmc
60     ST(n)=St*exp((r-(sigma^2)/2)*(T-t)+sigma*sqrt(T-t)*randn);
61     gain(n)=Pay_off_Asset(ST(n),K);
62 end
63
64 prix=exp(-r*(T-t))*mean(gain);
65
66 end
67
68 function [f] = Pay_off_Asset(S,K)
69
70 if (S < K)
71     f=S;
72 elseif (S >= K)
73     f=0;
74 end
75
76 end
```

FIGURE 13

2 Partie 2 :

→ Question 4 :




FIGURE 14

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 2 :


```
1
2 % Question 4
3
4 Graphe_prix_Asset_valtilite_varie_fixe(10000)
5
6 function [] = Graphe_prix_Asset_valtilite_varie_fixe(Nmc)
7
8 K=10;
9
10 for j=1:49
11     S0(j)=0.5*(j-1);
12     prix_sigma_varie(j)=prix_Asset_valtilite_varie_S0_fixe(S0(j),Nmc);
13     prix_sigma_fixe(j)=prix_Asset_valtilite_fixe_S0_fixe(S0(j),Nmc);
14 end
15
16 figure;
17 hold on;
18 plot(S0,prix_sigma_varie,'r');
19 plot(S0,prix_sigma_fixe,'b');
20 title("Prix de l'option Asset par Monte-Carlo pour t=0");
21 legend("V(t=0,S) Volatilité variante","V(t=0,S)Volatilité constante")
22 xlabel("S_0");
23 ylabel("V(0,S_0)");
24 end
25
26 function [prix] = prix_Asset_valtilite_varie_S0_fixe(S0,Nmc)
27
28 sum=0;
29 r=0.4;
30 T=0.5;
31
32 for n=1:Nmc
33     sum=sum+PayOff_Asset_valtilite_varie_S0_fixe(S0);
34 end
35
36 prix=exp(-r*T)*sum/Nmc;
37
38 end
39
40 function [prix] = prix_Asset_valtilite_fixe_S0_fixe(S0,Nmc)
41
42 sum=0;
43 r=0.4;
44 T=0.5;
45
46 for n=1:Nmc
47     sum=sum+PayOff_Asset_valtilite_fixe_S0_fixe(S0);
48 end
49
50 prix=exp(-r*T)*sum/Nmc;
51
52 end
53
54
55 function [gain] = PayOff_Asset_valtilite_varie_S0_fixe(S0)
56
57 K=10;
58 T=0.5;
59 r=0.4;
60 N=100;
61 S(1)=S0;
62 dt=T/N;
63
64 for i=1:N
65     g=randn;
66     S(i+1)=S(i)*exp((r-(Sigma_variable(S(i),K)^2)/2)*dt+Sigma_variable(S(i),K)*sqrt(dt)*g);
67 end
68
69 gain=Pay_off_Asset(S(N+1),K);
70
71 end
72
73 function [gain] = PayOff_Asset_valtilite_fixe_S0_fixe(S0)
74
75 K=10;
76 T=0.5;
77 r=0.4;
78 N=100;
79 S(1)=S0;
80 sigma=0.5;
81 dt=T/N;
82
83 for i=1:N
84     S(i+1)=S(i)*exp((r-(sigma^2)/2)*dt+sigma*sqrt(dt)*randn);
85 end
86
87 gain=Pay_off_Asset(S(N+1),K);
88
89 end
90
91
92 function [f] = Pay_off_Asset(S,K)
93
94 if (S < K)
95     f=S;
96 elseif (S >= K)
97     f=0;
98 end
99
100 end
101
102 function [f] = Sigma_variable(S,K)
103
104 sigma=0.5;
105
106 if (S < K)
107     f=sigma+(K-S)/K;
108 elseif (S >= K)
109     f=sigma;
110 end
111
112 end
```

FIGURE 15

IV Problème 3 :

1 Partie 1 :

→ Question 1 :



Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 1 :

```
1 |
2 - Graphe_Prix_Option_ASSET_SAUT(1000)
3
4 - function [] = Graphe_Prix_Option_ASSET_SAUT(Nmc)
5 -     N=100;
6 -     L=30;
7 -     for j=1:(N+1)
8 -         S0(j)=L*(j-1)/N;
9 -         prix_option_saut(j)=Prix_S0fixe(S0(j),Nmc);
10 -     end
11
12     % Question 1
13
14 -     figure;
15 -     plot(S0,prix_option_saut);
16 -     legend('V(t=0,S)');
17 -     title('Prix de 1 option ASSET avec SAUT t=0 par MC pour N_{mc}=10000')
18
19 - end
20
21
22 - function [prix]=Prix_S0fixe(S0,Nmc)
23
24 -     T=0.5;
25 -     K=10;
26 -     r=0.4;
27 -     sigma=0.5;
28 -     lambda=25;
29 -     J=0.17;
30 -     mu=r-lambda*(exp(J)-1);
31 -     sum=0;
32
33 -     for n=1:Nmc
34 -         ST=S0*exp((mu-(sigma^2)/2)*T+sigma*sqrt(T)*randn+Nt(lambda,T)*J);
35 -         if ST<K
36 -             gain=ST;
37 -         else
38 -             gain=0;
39 -         end
40 -         sum=sum+gain;
41 -     end
42 -     prix=exp(-r*T)*(sum/Nmc);
43 - end
44
45
46 - function [Nsauts]=Nt(lambda,t)
47 -     n=0;
48 -     Tsauts=0;
49 -     while Tsauts < t
50 -         ExpSaut=-log(randn)/lambda;
51 -         Tsauts=Tsauts+ExpSaut;
52 -         n=n+1;
53 -     end
54 -     Nsauts=n-1;
55 - end
```

FIGURE 16

V Problème 4 :

1 Partie 1 :

→ Question 1 :

```
>> Question1_2  
V(t=0,S=9)=0.680066>>
```

FIGURE 17

→ Question 2 :




FIGURE 18

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 1 :

```
2 - Prix_Asiatique(1000)
3
4 - function [] = Prix_Asiatique(Nmc)
5
6 - L=30;
7 - K=10;
8
9 - ds=1;
10
11 - for k=1:L+1
12 -     S0(k)=k-1;
13 -     prix_option(k)=Prix_Asiatique_S0_fixe(S0(k),Nmc);
14 - end
15
16 - % Question 1
17 - fprintf('V(t=0,S=9)=%f',prix_option(1,floor(9/(ds))+1));
18
19 - % Question 2
20 - plot(S0,prix_option)
21 - xlabel('S_0')
22 - ylabel('V(0,S_0)')
23 - legend('Prix Option Asiatique à t=0')
24 - title('Graphe du prix de l'Option Asiatique par MC pour N_(mc)=1000')
25
26
27
28 - end
29
30 - function [prix] = Prix_Asiatique_S0_fixe(S0,Nmc)
31
32 - T=0.5;
33 - r=0.4;
34 - sum=0;
35
36 - for k=1:Nmc
37 -     sum=sum+Payoff_asiatique(S0);
38 - end
39
40 - prix=exp(-r*T)*(sum/Nmc);
41
42 - end
43
44 - function [res] = Payoff_asiatique(S0)
45
46 - K=10;
47 - T=0.5;
48 - r=0.4;
49 - sigma=0.5;
50 - S(1)=S0;
51 - N=100;
52 - dt=T/N;
53 - produit=1;
54
55 - for i=1:N
56 -     S(i+1)=S(i)*exp((r-(sigma^2)/2)*dt+sigma*sqrt(dt)*randn);
57 -     produit=produit*S(i);
58 - end
59
60 - moyenne_geometrique=(produit)^(1/N);
61
62 - res=max(K-moyenne_geometrique,0);
63
64 - end
```

FIGURE 19

VI Problème 5 :

1 Partie 1 :

→ Question 1 :

$$V(t=0, S_0=6) = 4.407756 >>$$

FIGURE 20

→ Question 2 :




FIGURE 21

→ Question 3 :




FIGURE 22

Méthodes Numériques Avancées appliquées à la finance

→ Code MATLAB Partie 1 :

```
1 |
2 surface_Asset_Barriere()
3
4 function [] = surface_Asset_Barriere()
5
6 % Définition des constantes et vecteurs %
7
8 L=30;
9 T=0.5;
10 Ns=100;
11 Nt=100;
12 ds=L/Ns;
13 B=12;
14
15 for j=1:(Ns+1)
16     for k=1:(Nt+1)
17         St(j)=(L/Ns)*(j-1);
18         t(k)=(T/Nt)*(k-1);
19         if St(j)<B
20             V(k,j)=Prix_Asset_Barriere_St_fixe_t_fixe(t(k),St(j));
21         else
22             V(k,j)=Prix_Asset_Barriere_St_fixe_t_fixe(t(k),0);
23         end
24     end
25 end
26
27
28 % Question 1
29
30 fprintf("V(t=0,S0=6)=%f",V(1,floor(6/(ds))+1));
31
32 % Question 2
33
34 figure;
35 hold on;
36 plot(St,V(1,:));
37 legend('V(t=0,S)');
38 title('Prix de 1 option t=0 par MC pour N_{mc}=1000')
39
40
41 % Question 3
42
43 figure;
44 mesh(St,t,V)
45 xlabel('Prix de 1 actif S_t')
46 ylabel('temps t')
47 zlabel('Prix de 1 option V')
48 title('Surface du prix de loption par MC pour N_{mc}=1000')
49
50 end
51
52 function [prix] = Prix_Asset_Barriere_St_fixe_t_fixe(t,St)
53
54 % Définition des constantes et vecteurs %
55
56 B=12;
57 K=10;
58 T=0.5;
59 r=0.4;
60 sigma=0.5;
61 Nmc=1000;
62
63 for n=1:Nmc
64     if St<B
65         ST(n)=St*exp((r-(sigma^2)/2)*(T-t)+sigma*sqrt(T-t)*randn);
66         gain(n)=Payoff_Asset_Barriere(ST(n),K);
67     else
68         gain(n)=Payoff_Asset_Barriere(0,K);
69     end
70 end
71
72 prix=exp(-r*(T-t))*mean(gain);
73
74 end
75
76 function [f] = Payoff_Asset_Barriere(S,K)
77
78 B=12;
79
80 if (S < K)
81     f=S;
```

FIGURE 23

VII Conclusion

Je tiens tout d'abord à remercier mon professeur Irina Kortchemski pour ces efforts agréables malgré l'état sanitaire et l'enseignement à distance, elle a fait un excellent enseignement à distance.

Le cours Méthodes numériques avancée appliquée à la finance m'a permis de bien comprendre les notions et les techniques fondamentales de la méthode de simulation Monte Carlo grâce à des algorithmes en Matlab et les liens de celle-ci avec les principales méthodes de résolution numérique des Équations Différentielles Stochastiques ainsi que la modélisation et estimation par simulation des différents paramètres intervenant aux problèmes des finances quantitatives.

Grâce au module "Méthodes numériques avancée appliquée à la finance" pour l'année 2020-2021, j'ai accumulé de nombreuses connaissances :

- Résolution numérique de l'équation de Black et Scholes.
- Méthode aux Différences Finies. Discrétisation par les méthodes d'Euler explicite.
- Programmation des solutions analytiques de Black et Scholes.
- Volatilité locale.
- Implémentation des conditions aux limites de Dirichlet et de Neumann.
- Le lien entre les méthodes déterministe et celle de Monté-Carlo. Surface des prix.
- Evaluation du prix de l'option Vanilla par la méthode de Monté-Carlo.
- Options Call, Butterfly par Monte-Carlo.
- Méthode de la réduction de la variance.
- Options Exotiques par Monté-Carlo.
- Options Asiatiques et Lookback. Strike fixe. Strike flottant.
- Option Lookback par la méthode aux Différences Finies.

