

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호


1. 다음은 인류 문명에 영향을 준 물질을 나타낸 것이다.

- (가) 나일론은 최초의 합성 섬유로, 질기고 신축성이 좋다.
(나) (㉠)은(는) 석회석을 가열해 생석회로 만든 후 점토를 섞어 만든다.
(다) 유리는 모래에 포함된 (㉡)을(를) 원료로 만든다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
ㄱ. 나일론은 스타킹, 그물, 밧줄의 재료로 이용된다.
ㄴ. ㉠은 시멘트이다.
ㄷ. ㉡은 이산화 규소(SiO₂)이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 탄소 화합물 중 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
ㄱ. 메테인은 액화 천연가스(LNG)에 이용된다.
ㄴ. 에탄올은 손 소독제에 이용된다.
ㄷ. 아세트산은 염기성이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음 자료는 원자의 원자량을 나타낸 것이다.

수소	탄소	질소	산
1	12	14	16

물의 분자량과 아세트산의 분자량과 이산화 질소의 분자량을 모두 합하면?

- ① 16 ② 18 ③ 50 ④ 78 ⑤ 124


4. 다음은 물 농도를 바꾸는 실험을 나타낸 것이다.

- (가) 1 M A 수용액 500 mL를 준비한다.
(나) 일정한 온도에서 (가)에서 준비한 수용액에 물 ㉠ mL를 추가하여 A 수용액의 농도를 0.25 M으로 만든다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
ㄱ. (가)에서 A는 0.25 mol 만큼 들어 있다.
ㄴ. ㉠은 2000이다.
ㄷ. 물 농도는 온도에 따라 영향을 받는다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 탄소 화합물 중 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
ㄱ. (가)는 톰슨의 원자 모형이다.
ㄴ. (나)는 원자핵이 중심에 있다.
ㄷ. (다) 이후 전자의 분포를 확률 분포로 나타낸 원자 모형이 등장하였다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 가상의 동위 원소 X의 존재 비율을 나타낸 것이다.

	²⁰ X	²⁴ X
존재 비율	㉠ %	㉡ %
X의 평균 원자량	23	

㉡ - ㉠의 값은?(단, 동위 원소 X의 원자량은 질량수로 결정하며, 해당 두 동위 원소만 있다고 가정한다.)

- ① -75 ② -50 ③ 0 ④ 50 ⑤ 75

7. 오비탈 모형에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 주 양자수(n)가 클 수록 s오비탈의 크기가 크다.
 ㄴ. p오비탈은 방향에 따라 3가지가 존재한다.
 ㄷ. 에너지 준위는 1s가 2s에 비해 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 몇 가지 바닥상태 원자의 특성을 나타낸 것이다.

특성/이름	Li	C	N	O
주 양자수	2	㉠		2
s 오비탈 수	㉡	4		4
p 오비탈 수		㉢	㉣	㉤



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. ㉠은 1이다.
 ㄴ. ㉡은 3이다.
 ㄷ. ㉢ + ㉣ + ㉤은 9이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 두 원자의 전자 배치를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. (가)는 불가능한 원자 배치이다.
 ㄴ. (나)는 파울리 배타 원리에 위배된다.
 ㄷ. (가), (나)는 바닥상태 전자 배치이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 원자 ㉦의 전자 배치를 나타낸 것이다.



—<보 기>—

- ㄱ. ㉦은 14족 원소이다.
 ㄴ. 해당 전자 배치는 훈트 규칙에 위배된다.
 ㄷ. 주 양자수(n)가 같은 p_x, p_y, p_z의 오비탈의 에너지 준위는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 여러 가지 탄소 화합물을 나타낸 것이다.

	메테인	에테인	프로페인	뷰테인
분자를 구성하는 C의 개수	1	㉠	㉡	㉢
분자를 구성하는 H의 개수	4	㉣	㉤	㉥

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

—<보 기>—

- ㄱ. ㉠ + ㉡ + ㉢은 9이다.
 ㄴ. ㉣ + ㉤ + ㉥의 평균은 8이다.
 ㄷ. ㉣ + ㉥은 ㉠ + ㉢보다 6만큼 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. <보기>에서 옳게 설명한 것의 개수는? [3점]

—<보 기>—

- ㄱ. 음극선은 (+)극에서 (-)극으로 직진하는 선이다.
 ㄴ. 음극선은 전하를 띤다.
 ㄷ. 음극선은 직진한다.
 ㄹ. 음극선은 질량을 가지지 않는 입자이다.
 ㅁ. 음극선 실험에서 나타난 입자의 흐름에서 해당 입자는 원자핵이다.

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

13. 표는 가상의 동위 원소 Y의 존재 비율을 나타낸 것이다.

	^{18}Y	^{20}Y	^{22}Y
질량수	18	㉠	22
존재 비율	25 %	50 %	25 %
$\frac{\text{원자량}}{\text{존재비율}}$ (상댓값)	9	5	11

Y의 평균 원자량을 ㉡이라 할 때 $\frac{\text{㉡}}{\text{㉠}}$ 의 값은? (단, 해당 세 동위 원소만 존재한다고 가정한다.) [3점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1 ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

14. 다음은 바닥상태의 다전자 원자 배치에 대한 설명이다.

오비탈의 종류는 s, p, d, f가 있으며 s는 sharp, p는 principle, d는 diffuse, f는 fundamental의 약자이다.

오비탈의 에너지 준위는 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \text{㉠} < \text{㉡} < 4p < \dots$ 순서이다.

즉, 원자 번호가 18인 원자의 전자는 3번째 전자 껍질까지 전자가 채워져 있고, 원자 번호가 19, 20이면 원자 번호가 18일때와 달리 ㉢번째 전자 껍질에 전자가 채워져 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 3d, ㉡은 4s이다.
ㄴ. ㉢은 4이다.
ㄷ. 전자는 에너지 준위가 낮은 오비탈부터 순차적으로 채워지게 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 원자 번호가 20 이하인 바닥상태의 세 원자 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

- (A의 s오비탈 수) x (A의 p오비탈 수) = 30이다.
- (B의 주 양자수(n)) ÷ (B의 s오비탈 수) = 1이다.
- (C의 s오비탈 수) + (C의 p오비탈 수) = 20이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 금속 원소이다.
ㄴ. B는 비활성 기체이다.
ㄷ. (C의 주 양자수) + (C의 p오비탈 수)는 18이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 원자 번호가 20 이하인 바닥상태 원자들의 성질로 이용한 계산이다.

1. 서로 다른 두 원자를 선택하였다. 두 원자의 홀전자 수의 곱은 1이다. 모두 ㉠가지의 경우가 나왔다.

2. 앞에서 구한 ㉠가지의 경우 중에서 두 원자의 주 양자수(n)의 곱이 4인 경우들을 찾았더니 ㉡가지의 경우가 나왔다.

3. 앞에서 구한 ㉡가지의 경우 중에서 두 원자의 원자 번호의 곱이 최댓값인 경우의 최댓값은 ㉢이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 28이다.
ㄴ. ㉡은 6이다.
ㄷ. ㉢은 27이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 물 농도 실험 과정을 나타낸 것이다.

- 1 M 포도당 수용액 1 L에 포도당 90g을 추가하였다.
- 1번 실험에 이어서 물을 추가하여 ㉠ M 포도당 수용액 3 L로 만들어줬다.
- 2번 실험에 이어서 ㉠ M 포도당 수용액 3 L중 2 L를 다른 비커에다가 부어서 ㉠ M 포도당 수용액 1 L을 만들어 준다.
- 3번 실험에 이어서 ㉠ M 포도당 수용액 1 L에다가 포도당 2 mol 만큼 추가하였다.
- 4번 실험에 이어서 물을 추가하여 ㉡ M 포도당 수용액 5L로 만들어 준다.
- 이 실험을 마쳤을 때 ㉡ M 포도당 수용액 속에 들어 있는 전체 포도당의 양은 ㉢ mol이고, 수용액 속에 들어 있는 전체 포도당의 질량은 ㉣ g이다.

(㉠ + ㉢) × ㉡ × ㉣의 값은? (단, 포도당의 분자량은 180이며, 온도는 일정하다.) [3점]

- ① 450 ② 675 ③ 900 ④ 1125 ⑤ 1350

18. 표는 원소 X와 Y로 이루어진 가상의 분자 (가) ~ (다)에서 구성 원소의 질량비를 나타낸 것이다. 일정한 온도, 일정한 압력에서 기체 1g의 부피비는 (가) : (나) = 13 : 19이고, (가) ~ (다)의 분자당 구성 원자 수는 각각 5 이하이다. 원자량은 Y가 X보다 크다.

	(가)	(나)	(다)
$\frac{X\text{의 질량}}{Y\text{의 질량}}$ (상댓값)	6	3	1


이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

—<보 기>—

- ㄱ. (가) 1 mol의 X의 질량은 (나) 1 mol의 X의 질량의 2배이다.
 ㄴ. (다)의 분자식은 XY_3 이다.
 ㄷ. (가)의 분자량과 (나)의 분자량을 합했을 때 값은 (다)의 분자량의 $\frac{32}{27}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 기체 A와 기체 B가 반응하는 화학 반응식이다.




표는 A(g) w g이 들어 있는 실린더에 B(g)를 넣고 반응시켰을 때, B의 질량에 따른 반응 후 전체 기체 부피의 대한 자료이다.

B의 질량(g)	4	8	12	16	20
전체 기체 부피(상댓값)	3	3	x	7	11

x의 값은?(단, 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① 1 ② 3 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

20. 다음은 기체 A와 기체 B가 반응하는 화학 반응식이다.



표는 A(g) w g이 들어 있는 실린더에 B(g)를 넣고 반응시켰을 때, B의 질량에 따른 반응 후 전체 기체 부피의 대한 자료이다.

실험	반응 전			반응 후 전체 기체의 부피(상댓값)
	A(g)의 질량(g)	A(g)의 질량(g)	전체 기체의 밀도 (상댓값)	
I	4	6	1	5
II	8	10	1	x
III	14	12		13

a ÷ x의 값은?(단, 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

1. 생물 중 하나인 ㉠이 다음 조건을 만족시킨다.

- DNA와 단백질 껍질로 이루어졌다.
- 세포의 구조를 갖추지 않았다.
- 핵이 없다.
- 생명체 밖에서 물질대사를 할 수 없다.

㉠에 들어갈 말로 옳은 것은?

- ① 사람
- ② 식물
- ③ 짚신벌레
- ④ 아메바
- ⑤ 박테리오파지

2. 표는 생명 과학의 탐구 방법을 비교한 것이다.


	귀납적 탐구 방법	연역적 탐구 방법
공통점	㉡	
차이점	㉢을 세우지 않는다.	㉢을 세운다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. ㉠에 '자연 현상을 관찰한다'가 들어갈 수 있다.
- ㄴ. ㉢은 '가설'로 적절하다.
- ㄷ. '플레밍의 페니실린 발견'은 귀납적 탐구 방법이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음 자료는 생물의 물질대사 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. ㉠은 포도당 + 물이다.
- ㄴ. ㉢은 이산화탄소 + 산소이다.
- ㄷ. ㉡은 아데노신에 인산 3개가 결합한 화합물이다.

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 사람의 기관계 중 일부를 나타낸 것이다.

기관계	특징
㉣	음식물에 들어 있는 영양소를 작은 영양소로 분해하여 몸속으로 흡수한다.
호흡계	세포 호흡에 필요한 ㉤를 흡수한다.
㉥배설계	세포에서 생성된 요소와 같은 노폐물을 걸러 오줌의 형태로 몸 밖으로 내보낸다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. ㉣은 소화계이다.
- ㄴ. ㉤은 이산화 탄소이다.
- ㄷ. ㉥은 ㉥에 해당된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 에너지 대사에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 기초 대사량은 생명 활동을 하는데 필요한 최소 에너지 양이다.
- ㄴ. 하루 동안 소비하는 에너지의 총량은 활동 대사량이다.
- ㄷ. 1일 대사량에서 기초 대사량이 가장 비율이 높다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 자료는 신경계를 구성하는 기본 단위에 대한 설명이다.


신경계를 구성하는 기본 단위는 뉴런이다. 뉴런은 대부분 핵과 세포질로 이루어진 ㉦와/과 이것에서 뻗어 나온 가지 돌기와 ㉧로 되어 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. ㉦은 '신경 세포체'이다.
- ㄴ. ㉧은 '축삭 돌기'이다.
- ㄷ. ㉧은 다른 뉴런이나 세포로 신호를 전달한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 근육 원섬유 마디를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트 중 하나다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㉠. ㉠은 마이오신 필라멘트이다.
 ㉡. H대는 근육 원섬유 중심에 ㉡만 있는 부분이다.
 ㉢. I대는 ㉡이 있는 부분으로 어둡게 보인다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

8. 다음은 과학의 탐구 방법에 대한 설명이다.

(가) 귀납적 탐구 방법은 자연현상에서 관찰한 결과들을 종합해서 결론을 이끌어내는 탐구 방법이다. 이에 해당하는 대표적인 사례로 ㉠이 있다.

(나) 연역적 탐구 방법은 귀납적 탐구 방법과 달리 ㉡을 설정하여 그 결론과 일치하는지 확인하는 탐구 방법이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㉠. ㉠은 '다윈의 진화론'으로 적절하다.
 ㉡. ㉡은 '가설'이다.
 ㉢. 귀납적 탐구 방법에서는 실험군과 대조군을 설정한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 다음은 신경계에 대한 설명이다.

체성 신경계	㉠ 끝 부분에서 아세틸콜린이 분비된다. ㉡ 골격근의 반응을 조절한다.
자율 신경계	㉢ 교감 신경에서 신경절 이전 뉴런과 신경절 이후 뉴런에서 분비되는 물질은 같다. ㉣ 부교감 신경에서 신경절 이전 뉴런의 길이는 신경절 이후 뉴런의 길이보다 길다. ㉤ 교감 신경은 심장 박동을 억제하고, 부교감 신경은 심장 박동을 촉진한다.

㉠ ~ ㉤ 중 옳게 설명한 것의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 호르몬의 작용에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㉠. 인슐린과 글루카곤의 분비 혈당량을 유지한다.
 ㉡. 간뇌 시상 하부에서 TSH 분비량을 증가시킨다.
 ㉢. 체내 수분량이 낮아지면 혈장 삼투압을 증가시킨다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

11. 다음은 세포 호흡으로 생성되는 노폐물을 나타낸 것이다.

노폐물	특성
이산화 탄소	㉠(을)를 통해 몸 밖으로 나간다.
물	폐, 콩팥을 통해 몸 밖으로 나간다.
암모니아	㉡에서 독성이 적은 요소로 전환된다. ㉢(을)를 통해 몸 밖으로 나간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

- ㉠. ㉠은 폐이다.
 ㉡. ㉡의 이자와 같은 계에 속한다.
 ㉢. 단백질이 에너지원으로 사용되었을 때 노폐물은 ㉢을 통해 몸 밖으로 나갈 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 다음은 말이집 신경과 민말이집 신경을 비교한 것이다.

	말이집 신경	민말이집 신경
㉠말이집	있음	없음
㉡랑비에 결절	있음	없음
흥분 전도 속도	빠름	느림

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

- ㉠. ㉠은 슈반 세포의 세포막이 단일 겹으로 쌓여 있다.
 ㉡. 말이집 신경에서 도약 전도가 일어난다.
 ㉢. 랑비에 결절은 신호 전달에서 절연체 역할을 한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

13. 다음은 뇌의 구조와 특징의 일부를 나타낸 내용에서 오류가 발생하여 수정한 것을 나타낸 것이다.

뇌	특징
대뇌	대뇌는 대뇌 겉질과 속질로 구분되며 대뇌의 겉질은 ㉠백색질(→회색질)이다.
소뇌	대뇌보다 더 ㉡크다., 대뇌와 함께 수의 운동을 조절한다.
간뇌	시상, 시상 하부, 뇌하수체로 구분된다. ㉢시상 하부(→뇌하수체)는 다른 내분비샘의 기능을 조절한다.
중간뇌	감각 정보의 전달 통로이다. 어두운 곳에서 동공을 ㉣축소(→확대)시킨다.
연수	뇌와 척수를 연결하는 신경이 지나가는 곳이다. 신경의 ㉤상하 교차(→좌우 교차)가 일어난다.

㉠ ~ ㉤ 중에서 바르게 수정한 것이 아닌 것은? [3점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

14. 다음은 교감 신경과 부교감 신경에 대한 설명이다.

교감 신경의 말단과 부교감 신경의 말단은 분비되는 물질이 다르다. 교감 신경은 ㉠, 부교감 신경은 ㉡이 분비된다.
교감 신경이 흥분하면 나타나는 현상은 동공이 확대되고, 기관지가 확장되며, 심장 박동이 촉진되고, 소화관 운동과 소화액 분비가 ㉢된다. 그리고 글리코젠 분를 ㉣한다.
부교감 신경이 흥분하면 나타나는 현상은 동공이 축소되고, 기관지가 수축되며, 심장 박동이 억제되고, 소화관 운동과 소화액 분비가 ㉤된다. 그리고 쓸개즙 분비를 ㉥한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

㉠. ㉠은 '노르에피네프린', ㉡은 '아세틸콜린'이다. ㉢. ㉢은 '억제', ㉣은 '촉진'으로 적절하다. ㉤. ㉤과 ㉥은 모두 '억제'로 적절하다.
--

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉢, ㉣

15. 다음은 혈당량을 조절하는 요인 중 일부를 나타낸 것이다.

요인	혈당량을 조절하는 방법
이자 α세포	㉦
이자 β세포	㉧

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

㉦. ㉦은 '인슐린을 분비한다'가 들어갈 수 있다. ㉧. ㉧은 '글루카곤을 분비한다'가 들어갈 수 있다. ㉨. ㉦은 혈중 포도당 농도를 증가시키고, ㉧은 혈중 포도당 농도를 감소시킨다.

- ① ㉦ ② ㉧ ③ ㉦, ㉧ ④ ㉧, ㉨ ⑤ ㉦, ㉧, ㉨

16. 신경계에 대한 OX 문제를 푼 것이다. 기본 점수는 5점이며, 정답이면 3점을 얻고, 오답이면 1점을 잃는다.

문제	답
척수는 중추 신경계이다.	O
척수 신경은 12쌍이 존재한다.	O
말초 신경계에서 뇌 신경은 31쌍이다.	O
척수는 겉질이 백색질, 속질이 회색질이다.	X
척수의 운동 신경 다발은 전근이다.	X

5문제를 모두 풀고 나서 총점은? [3점]

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

17. 표는 우리 몸의 주요 내분비샘과 호르몬에 대해 나타낸 것이다.

내분비샘	호르몬
뇌하수체	㉠생장 호르몬, 갑상샘 자극 호르몬, 생식샘 자극 호르몬, 항이뇨 호르몬, 옥시토신
갑상샘	㉡
부신 속질	에피네프린
이자	인슐린, ㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]


<보 기>

- ㄱ. ㉠에서 뇌하수체 전엽에서 분비되는 건 2개, 뇌하수체 후엽에서 있는 건 3개이다.
 ㄴ. ㉡은 티록신이다.
 ㄷ. ㉢은 혈당량을 증가시킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 골격근의 구성과 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이며, 양 끝에 있는 (보라색) 세로 축은 Z선을 나타낸 것이다.



- 구간 ㉠은 액틴 필라멘트만 있는 부분, ㉡은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.
 ○ ㉡의 길이가 ㉠의 길이의 2배가 될 때까지 X가 수축하였다. ㉠의 길이는 수축 이전에 $4\mu\text{m}$, ㉡의 길이는 수축 이후 $6\mu\text{m}$ 이었다.
 ○ ㉢의 길이는 수축 이전 $10\mu\text{m}$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠의 길이는 수축 이후 $3\mu\text{m}$ 이다.
 ㄴ. A대의 길이는 항상 $14\mu\text{m}$ 이다.
 ㄷ. 수축 이후 수축 전보다 ㉢의 길이의 변화량은 ㉠의 길이의 변화량보다 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 자극을 받은 뉴런의 상태를 나타낸 것이다.

상태	Na^+ 통로	K^+ 통로
분극	닫힘	닫힘
탈분극	㉠	㉡
재분극	㉢	㉣

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠과 ㉢은 같고, ㉡과 ㉣은 같다.
 ㄴ. 탈분극 상태에서 막 안쪽은 양(+)전하이다.
 ㄷ. 재분극 상태에서 막전위가 하강한다.


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 민말이집 신경 A, B의 흥분 전도에 대한 자료이다.

- A에는 d_1 지점이 있고, B에는 d_2 , d_3 지점이 있다.



- ㉠ d_2 에 역치 이상의 자극을 주었다. 4ms일때 d_3 에서 활동 전위가 발생하였다.
 ○ d_2 부터 d_3 까지 거리는 8cm이며 d_1 부터 d_2 까지의 거리는 d_2 부터 d_3 까지 거리의 2배이다.
 ○ d_2 지점에서 활동 전위가 일어날 때 막전위는 다음과 같다. 휴지 전위는 -70mV 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. B에서의 흥분 전도 속도는 2cm/ms 이다.
 ㄴ. ㉠ 이후 8ms일때 d_1 에서 활동 전위가 발생한다.
 ㄷ. ㉠ 이후 6ms일때 d_3 지점에서 K^+ 통로가 열린다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.