COMMON DIALOGUE

Patient says → You say

THEY: I think I broke my wrist.
Creo que me rompí la muñeca.
YOU: Let's take X-rays to verify.
Vamos a tomar radiografías para verificar.

THEY: How long do I need to wear the cast?
¿Cuánto tiempo necesito usar el yeso?
YOU: Four to six weeks. I'll check again.
Cuatro a seis semanas. Volveré a revisar.

THEY: My knee is very swollen and hurts.
Mi rodilla está muy hinchada y duele.
YOU: Put ice on it for twenty minutes each hour.
Póngase hielo durante veinte minutos cada hora.

THEY: Do I need surgery for my shoulder?
¿Necesito cirugía para el hombro?
YOU: Let's try physical therapy first. Then we decide.
Primero intentemos la terapia física. Luego decidimos.

THEY: My hip causes me a lot of pain.
Mi cadera me causa mucho dolor.
YOU: Raise your leg slowly. Does it hurt?
Levante la pierna lentamente. ¿Le duele?

THEY: Can I work after the surgery?
¿Puedo trabajar después de la operación?
YOU: Not for six weeks. You must rest.
No por seis semanas. Tiene que descansar.

THEY: Can I walk without crutches?
¿Puedo caminar sin muletas?
YOU: Not yet. Let's do exercises first.
Aún no. Vamos a hacer ejercicios primero.

THEY: My ankle feels weak.
El tobillo se siente débil.
YOU: You need to strengthen your foot muscles.
Necesita fortalecer los músculos del pie.

ASK YOUR PATIENT →

Exam questions

You have a fracture of the tibia (shinbone).
Tienes una fractura de la tibia. (Tú) / Tiene una fractura de la tibia. (Usted)
Initial fracture diagnosis delivery

We need to do an X-ray to see the extent of the injury.
Necesitamos hacer una radiografía para ver la extensión de la lesión.
Explaining diagnostic imaging

The bone is displaced and needs surgery to realign it.
El hueso está desplazado y necesita cirugía para realinearlo.
Pre-operative explanation

I will explain the surgical procedure before we proceed.
Te explicaré el procedimiento quirúrgico antes de que procedamos.
Obtaining informed consent

We will place a metal plate and screws to stabilize the fracture.
Colocaremos una placa de metal y tornillos para estabilizar la fractura.
Explaining surgical fixation

After surgery, you cannot put weight on that leg for six weeks.
Después de la cirugía, no puedes apoyar peso en esa pierna durante seis semanas.
Post-operative weight-bearing restrictions

Physical therapy is essential for full recovery and mobility.
La fisioterapia es esencial para la recuperación completa y la movilidad.
Reinforcing rehabilitation importance

Elevate your leg above heart level to reduce swelling.
Eleva la pierna por encima del nivel del corazón para reducir la hinchazón.
Post-operative care instructions

MEDICAL SPANISH · QUICK REFERENCE



Orthopedics

ESSENTIAL PHRASES

You have a fracture of the tibia (shinbone).
Tienes una fractura de la tibia. (Tú) / Tiene una fractura de la tibia. (Usted)

We need to do an X-ray to see the extent of the injury.
Necesitamos hacer una radiografía para ver la extensión de la lesión.

The bone is displaced and needs surgery to realign it.
El hueso está desplazado y necesita cirugía para realinearlo.

GRAMMAR FOCUS

Imperative Mood (Tú & Usted) for Patient Instructions

Post-operative instructions and safety precautions require the imperative mood. For formal medical settings, use Usted commands (third person singular verb form). For more familiar interactions, tú co

Rest your leg for two weeks.

Descansa la pierna durante dos semanas. (Tú) / Descanse la pierna durante dos semanas. (Usted)

Do not bend your elbow during recovery.

No dobles el codo durante la recuperación. (Tú) / No doble el codo durante la recuperación. (Usted)

Ice the swelling three times daily.

Aplica hielo en la hinchazón tres veces al día. (Tú) / Aplique hielo en la hinchazón tres veces al día. (Usted)

CULTURAL NOTE

In Spanish-speaking countries, the terms 'fisioterapia' (Spain/Mexico) and 'terapia física' (Latin America) are both widely used but may vary by region. 'Escayola' is common in Spain while 'yeso' is u

CLINICAL COMMANDS

More phrases

We will place a metal plate and screws to stabilize the fracture.

Colocaremos una placa de metal y tornillos para estabilizar la fractura.

After surgery, you cannot put weight on that leg for six weeks.

Después de la cirugía, no puedes apoyar peso en esa pierna durante seis semanas.

Physical therapy is essential for full recovery and mobility.

La fisioterapia es esencial para la recuperación completa y la movilidad.

Elevate your leg above heart level to reduce swelling.

Eleva la pierna por encima del nivel del corazón para reducir la hinchazón.

Apply ice for 15 minutes, four times per day during the first two weeks.

Aplica hielo durante 15 minutos, cuatro veces al día durante las dos primeras semanas.

The pain should improve gradually as the bone heals.

El dolor debe mejorar gradualmente a medida que el hueso sana.

Signs of infection include fever, increased redness, and drainage from the incision.

Los signos de infección incluyen fiebre, enrojecimiento aumentado y drenaje de la incisión.

Return for follow-up X-rays in four weeks to check healing progress.

Regresa para radiografías de seguimiento en cuatro semanas para verificar el progreso de la curación.

REFERENCE

Key vocabulary

fracture	**fractura**
break	**ruptura / quiebre**
joint	**articulación**
bone	**hueso**
vertebra / vertebrae	**vértebra / vértebras**
ligament	**ligamento**
tendon	**tendón**
cartilage	**cartílago**
range of motion	**rango de movimiento / amplitud de movimiento**
dislocation	**luxación / dislocación**
subluxation	**subluxación**
sprain	**esguince / torcedura**
strain	**distensión muscular**
cast	**yeso / escayola**
brace	**soporte / órtesis / ferula**
crutches	**muletas**
walker	**andador / marco de marcha**
surgery / operation	**cirugía / operación**