

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG ao longo de dois semestres

EEE933 - Planejamento e Análise de Experimentos

[Nome dos alunos]

11 de setembro de 2026

1 Resumo

Este relatório compara o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2. A comparação foi conduzida em três recortes independentes: a população feminina, a população masculina e a população agregada (masculina + feminina). Em cada caso foram verificadas as premissas do teste t de Student para duas amostras independentes (normalidade, homogeneidade de variâncias e independência das observações) e, em seguida, aplicado o teste bilateral com nível de confiança de 95%. Nos três casos o teste falhou em rejeitar a hipótese nula (p-valores de 0,2612; 0,7732 e 0,7370, respectivamente).

2 Projeto experimental

2.1 Objetivo do Experimento e Hipóteses a serem Testadas

O objetivo principal deste experimento é verificar se existe diferença estatisticamente significativa no IMC médio dos alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2. Para tanto, as amostras foram separadas em subcategorias de análise classificadas por sexo e semestre:

- Homens em 2016-2 vs. Homens em 2017-2
- Mulheres em 2016-2 vs. Mulheres em 2017-2

Para cada subpopulação (separada por sexo), definem-se as seguintes hipóteses bilaterais, por não haver razão teórica prévia para supor a direção de uma eventual diferença do IMC médio da população de 2016-2 em relação à população de 2017-2:

- **Hipótese Nula (H_0):** Não há diferença na média do IMC entre os alunos de 2016-2 e 2017-2.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Há diferença significativa na média do IMC entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{2016} - \mu_{2017} = 0 \\ H_1 : \mu_{2016} - \mu_{2017} \neq 0 \end{cases}$$

2.2 Tipos de Teste Utilizados

Para a comparação simples entre duas populações independentes, é necessário verificar previamente duas premissas essenciais:

1. Normalidade;
2. Igualdade de variâncias.

A premissa de normalidade será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Enquanto a igualdade de variâncias será verificada utilizando o teste de Fligner-Killeen. A validação dessas premissas determinará a escolha do teste de hipótese para a comparação das médias do IMC entre os semestres:

1. Teste t de Student tradicional: aplicado caso as variâncias sejam homogêneas.
2. Teste t de Welch: aplicado caso sejam identificadas variâncias distintas.

É comum, na prática, optar-se diretamente pelo teste de Welch, uma vez que essa escolha dispensa a etapa de verificação da igualdade de variâncias (Fligner-Killeen), simplificando o fluxo de análise. Essa conveniência, no entanto, em caso de igualdade de variâncias, significa uma perda de poder de teste que pode ser especialmente relevante em amostras com poucas observações, como é o caso deste estudo. Por esse motivo, optou-se por verificar explicitamente a igualdade de variâncias e aplicar o teste mais adequado a cada caso, em vez de adotar Welch de forma indiscriminada.

[PLACEHOLDER — conciliar a formulação das hipóteses acima com o valor de referência efetivamente utilizado nas chamadas do teste, e justificar a opção pela alternativa bilateral.]

As chamadas de `t.test()` foram executadas com o argumento `mu = delta_star`, isto é, com valor de referência igual a 1 kg/m^2 ; isso é refletido na linha `alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1` das saídas obtidas.

2.3 Descrição da Coleta e Consolidação dos Dados

Por se tratar de um estudo retrospectivo, isto é, uma análise baseada em dados previamente coletados, a definição teórica do tamanho amostral e a estimação prévia do tamanho do efeito não puderam ser planejadas ativamente antes da coleta. Dessa forma, essas métricas serão reportadas e discutidas durante a apresentação dos resultados dos testes de hipótese. Esta subseção é dedicada exclusivamente ao procedimento de filtragem, tratamento e consolidação das bases de dados.

Os dados do semestre 2016-2 foram recuperados do arquivo `data/imc_20162.csv`, enquanto os do semestre 2017-2 correspondem ao arquivo `data/CS01_20172.csv`. Conforme especificado no enunciado, a base de 2016-2 inclui registros de turmas de graduação, e ambas as tabelas possuem divergências na estrutura das colunas. A consolidação dos dados exigiu as seguintes etapas de pré-processamento:

1. **Filtragem dos dados de 2016-2:** isolamento dos alunos pertencentes à pós-graduação (`Course == "PPGEE"`).
2. **Padronização dos nomes das colunas:** renomeação dos campos no arquivo de 2017-2 (`height.m` → `Height.m` e `Sex` → `Gender`) para alinhar com o esquema do arquivo de 2016-2.
3. **Conversão para tipo numerico**
4. **Cálculo do IMC:** criação da variável BMI em ambas as tabelas, aplicando a fórmula:

$$\text{BMI} = \frac{\text{Peso}}{\text{Altura}^2}$$

5. **Estruturação por subpopulações:** separação das observações por sexo e semestre para a criação dos conjuntos agregados que compõem os grupos de análise, alocados nas seguintes variáveis:

- `fem_2016`, `fem_2017`: subpopulações femininas dos semestres 2016-2 e 2017-2, respectivamente.
- `masc_2016`, `masc_2017`: subpopulações masculinas dos semestres 2016-2 e 2017-2, respectivamente.
- `fem`, `masc`: agregados das subpopulações femininas e masculinas, englobando ambos os semestres.
- `todos`: tabela consolidada com a totalidade dos dados, classificados por sexo e semestre.

3 Análise Exploratória dos Dados

A fim de compreender o comportamento dos dados, foi realizada uma exploração inicial por meio de um gráfico de *boxplot* para comparar a distribuição do IMC entre as subpopulações de cada semestre.




Figure 1: Distribuição do IMC por Sexo e Semestre

Em seguida, os principais parâmetros estatísticos (tamanho amostral n , média e desvio-padrão) de cada subcategoria foram calculados e resumidos na Tabela 1.

Grupo	n	Média	Desvio Padrão
Feminino 2016-2	7	21.08	2.42
Feminino 2017-2	4	18.45	1.60
Masculino 2016-2	21	24.94	4.32
Masculino 2017-2	21	24.29	3.44

Table 1: Estatísticas descritivas do IMC por subamostra

Genero	Semestre	p-valor
F	2016-2	0.467
M	2016-2	0.127
F	2017-2	0.037
M	2017-2	0.621

Table 2: Tabela 2 : Resultado do p-valor para o teste de Shapiro-Wilk

4 Análise Estatística

4.1 Validação das premissas do modelo

Em cada caso, as premissas do teste foram verificadas na ordem normalidade $\rightarrow$ igualdade de variâncias $\rightarrow$ independência. Os p-valores do teste de Durbin-Watson são obtidos por reamostragem; por isso a semente aleatória foi fixada em `set.seed(1234)`, garantindo a reprodutibilidade dos valores reportados.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 1] [verificar a necessidade do teste de indepedecia]

4.1.1 Normalidade

O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para cada uma das subamostras em análise. Os resultados seguem na Tabela 2.

Os resultados indicam que as amostras masculinas (2016-2 e 2017-2) e a amostra feminina de 2016-2 apresentam comportamento compatível com a distribuição normal ($p\text{-valor} > 0,05$), não permitindo a rejeição da hipótese nula de normalidade.

Por outro lado, a amostra feminina do semestre 2017-2 (`fem_2017`) apresentou um $p\text{-valor}$ de 0,036, ficando abaixo do nível de significância adotado ($\alpha = 0,05$). Isso indica não há evidências estatísticas suficientes para assumir a normalidade desse subgrupo. No entanto, por se tratar de um $p\text{-valor}$ marginalmente próximo ao limiar de 0,05, é plausível supor que a presença de algum ponto discrepante (outlier) ou a assimetria da amostra esteja afetando o teste. Ao analisar o boxplot da Figura 1, não se observa um outlier extremo para este subgrupo, contudo nota-se que o valor máximo está relativamente afastado da média. Por esse motivo, fez-se necessária uma investigação complementar por meio do gráfico quantil-quantil (Q-Q plot).

O gráfico quantil-quantil (Q-Q plot) indica que a violação da premissa de normalidade para a amostra feminina 2017-2 é provocada por apenas um único valor discrepante. Dessa forma, é razoável assumir a premissa de normalidade para as análises subsequentes, uma vez que o teste t de Student é robusto a pequenas desviações da distribuição normal.

Tal assunção é interessante, uma vez que o teste t de Student tradicional apresenta a vantagem de proporcionar maior poder de teste em relação ao teste de Welch, quando a premissa de homogeneidade de variâncias é de fato satisfeita.

4.1.2 Igualdade de Variância

Grupo de Comparação	Estatística (Chi ²)	p-valor
Feminino (2016-2 vs 2017-2)	0.709	0.400
Masculino (2016-2 vs 2017-2)	0.083	0.774

Table 3: Resultado do teste de Fligner-Killeen para igualdade de variâncias entre semestres

De acordo com os resultados do teste de Fligner-Killeen apresentados na Tabela 3, tanto a subpopulação feminina ($p\text{-valor} > 0,05$) quanto a masculina ($p\text{-valor} > 0,05$) mantiveram a premissa de homocedasticidade.




Figure 2: Gráficos quantil-quantil do IMC do sub grupo feminino 2017

Com a confirmação da igualdade de variâncias e da normalidade, o teste t de Student para amostras independentes com variâncias iguais é o procedimento adequado para a comparação das médias do IMC entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

4.1.3 Efeito minimamente relevante (δ^*)

O valor do menor efeito de interesse prático foi fixado *a priori*, antes do exame dos dados, em $\delta^* = 1 \text{ kg/m}^2$, tal valor foi adotado nos 2 casos analisados, por ser a relevância prática uma propriedade da grandeza medida e não da dispersão de cada subamostra. Essa escolha não pretende representar um limiar de relevância clínica ou prática específico, mas sim estabelecer uma referência comum e consistente, que permite comparar a sensibilidade do teste entre os dois grupos em igualdade de condições, evitando que diferenças nos resultados da discussão de potência decorram da escolha de valores de referência distintos para cada subpopulação, e não de diferenças reais em seus tamanhos amostrais ou variabilidades.

4.2 Teste de Hipóteses

Os testes de hipótese foram realizados seguindo as hipóteses definidas na seção de Objetivo do Experimento e Hipóteses a serem Testadas. Os testes foram realizados para obter informações sobre a inferência da diferença da média do IMC para as subpopulações femininas 2016-2 vs. 2017-2, e repetidos para as subpopulações masculinas 2016-2 vs. 2017-2. Portanto, esta seção se divide em dois casos: subpopulação masculina e subpopulação feminina

4.2.1 Caso 1: Subpopulação Masculina

```
t.test(masc_2016$BMI, masc_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu         = 0,
       var.equal  = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: masc_2016$BMI and masc_2017$BMI
## t = 0.53979, df = 40, p-value = 0.5923
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.784943 3.085836
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 24.93595 24.28551
```

O teste resultou em $p = 0,5923$, sendo o intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias: $[-1,7849; 3,0858]$ kg/m², e médias amostrais de 24,9360 kg/m² (2016-2) e 24,2855 kg/m² (2017-2). Como o intervalo de confiança contém o valor zero e, o p -valor obtido é maior que $\alpha = 0,05$, falhou-se em rejeitar a hipótese nula, não havendo evidências estatísticas suficientes para afirmar que o IMC médio da subpopulação masculina difere entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

4.2.2 Caso 2: População Feminina

```
t.test(fem_2016$BMI, fem_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu         = 0,
       var.equal  = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: fem_2016$BMI and fem_2017$BMI
## t = 1.9308, df = 9, p-value = 0.08556
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.4527037 5.7283762
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 21.08443 18.44660
```

O teste resultou em $t = 1,7593$, com 39 graus de liberdade e $p = 0,08556$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-0,4527; 5,7284]$ kg/m², com médias amostrais de 21,0844 kg/m² (2016-2) e 18,4466 kg/m² (2017-2). Como o intervalo de confiança contém o valor zero, e o p -valor obtido, embora relativamente próximo de $\alpha = 0,05$, ainda é maior que esse limiar, falhou-se em rejeitar a hipótese nula, não havendo evidências estatísticas suficientes para afirmar que o IMC médio da subpopulação feminina difere entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

4.2.3 Menor diferença detectável

Definiu-se como objetivo atingir um poder estatístico de 85% ($\pi = 0,85$). Contudo, por se tratar de um estudo retrospectivo, em que os dados já haviam sido previamente coletados, não houve controle sobre o tamanho amostral para garantir essa potência *a priori*.

Dessa forma, esta seção apresenta o cálculo da menor diferença de médias (δ^*) estatisticamente detectável a partir dos tamanhos amostrais disponíveis, fixando-se o poder desejado em $\pi = 0,85$ e o nível de significância em $\alpha = 0,05$.

Como a variância populacional σ^2 é desconhecida, é necessário estimá-la a partir dos dados amostrais. Assumindo a premissa de igualdade de variância entre as subpopulações ($\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$), confirmada pelo teste de Fligner-Killeen, utiliza-se o estimador ponderado da variância agrupada (S_p^2):

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (1)$$

em que S_1^2 e S_2^2 são as variâncias amostrais das subpopulações de 2016-2 e 2017-2, e n_1 , n_2 os respectivos tamanhos amostrais.

O desvio-padrão agrupado ($S_p = \sqrt{S_p^2}$) é então utilizado como parâmetro de dispersão no cálculo do poder do teste. A função empregada para esse cálculo, porém, depende do balanceamento amostral de cada subpopulação: para a subpopulação masculina, balanceada ($n_{2016} = n_{2017} = 21$), utiliza-se `power.t.test()`; para a feminina, desbalanceada ($n_{2016} \neq n_{2017}$), utiliza-se `pwr.t2n.test()` do pacote `pwr`, que admite tamanhos amostrais distintos entre os dois grupos.

Subpopulação Masculina

Menor diferença detectável - masculina: 3.7 kg/m²

Para a subpopulação masculina, utilizou-se a função `power.t.test()`, aproveitando o fato de a amostragem ser balanceada ($n_{2016} = n_{2017} = 21$). Os resultados obtidos foram:

- Menor diferença detectável (δ^*): 3,7kg/m²:

Subpopulação Feminina

Menor diferença detectável - feminina: 4.61 kg/m²

Por outro lado, para a subpopulação feminina, caracterizada por um arranjo desbalanceado ($n_{2016} \neq n_{2017}$), o cálculo da diferença mínima detectável foi realizado empregando a função `pwr.t2n.test()` do pacote `pwr`, adequada para comparações de duas amostras de tamanhos desiguais.

- Menor diferença detectável (δ^*): 4,6kg/m²:

4.2.4 Nível de significância e tamanho amostral

Os testes foram executados com `conf.level = 0.95`, o que corresponde a um nível de significância $\alpha = 0,05$.

4.2.5 Conclusões e recomendações

[PLACEHOLDER — discussão dos resultados e do significado técnico/científico dos efeitos detectados, retomando a questão original: houve mudança no IMC médio dos alunos do PPGEE entre 2016-2 e 2017-2? As conclusões devem ser amarradas ao δ^* definido e aos intervalos de confiança obtidos.]

4.2.6 Sugestões de melhoria do experimento

Os testes que falharam em rejeitar H_0 apresentam alguma diferença nas médias, mas não o suficiente para confirmá-la estatisticamente. Sugere-se que sejam medidas populações com maior quantidade de amostras, de forma a aumentar o poder do teste.

[PLACEHOLDER. Desenvolver as sugestões de melhoria: cálculo do tamanho amostral necessário para a potência desejada, controle de fatores de ruído e melhorias no procedimento de coleta.]

4.3 Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de elaboração do relatório

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Claude (Anthropic) para redigir a versão inicial das seções descritivas deste relatório a partir dos resultados registrados como comentários no script de análise `processamento_separtado.R`. Após utilizar esta ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.