

17. Активные префиксы. LR(0)-пункты. Теорема об LR(0)-автомате. Следствия из теоремы об LR(0)-автомате.

Определение

LR(k)-пункт $[A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2, v]$ *допустим для активного префикса* γ , если $\gamma = \gamma_1 \beta_1$ и существует правый вывод $S' \Rightarrow^* \gamma_1 A w \Rightarrow \gamma_1 \beta_1 \beta_2 w \Rightarrow^* u w$, v — префикс $w \nmid$.

Допустимость пункта определяет действия распознавателя в случае, когда содержимое стека равно $\gamma = \gamma_1 \beta_1$. Если $\beta_2 = \lambda$, то производится свёртка, иначе — перенос. Для данного активного префикса могут быть допустимы несколько пунктов. Далее будем рассматривать LR(0)- и LR(1)-пункты.

опр. Активный префикс — это содержимое стека в любой момент времени работы распознавателя, "перенос-свертка" (префикс r-формы не выходящий за правый конец основы)

Определение

Автомат LR(0)-пунктов расширенной грамматики — это λ -НКА $\mathcal{I}_G = (\Sigma \cup \Gamma, I, \delta, i_0, I)$, где:

I — множество LR(0)-пунктов грамматики G ;

$i_0 = [S' \rightarrow \cdot S]$;

множество переходов δ состоит из переходов двух типов:

$[A \rightarrow \beta_1 \cdot X \beta_2] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \beta_1 X \cdot \beta_2]$ (базисные) и

$[A \rightarrow \beta_1 \cdot B \beta_2] \xrightarrow{\lambda} [B \rightarrow \cdot \beta]$.

Базисными пунктами называются пункты i_0 и те пункты, где $\beta_1 \neq \lambda$.


Основная теорема LR-анализа

Пункт $[A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$ в грамматике G допустим для активного префикса γ тогда и только тогда, когда в автомате \mathcal{I}_G существует путь из i_0 в $[A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$, помеченный γ .

Лемма 1 $\forall AP \gamma \exists$ допустимый где α — базовый пункт.

Док-во (лемма):

Рассмотрим вывод $S' \Rightarrow^* \gamma \alpha \Rightarrow^* w$ и первое появление γ в нём.



основа формулы не лежит в α целиком.

на предшествующем шаге применено $A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2$ допустимый

$$S' \Rightarrow^* \gamma' A \alpha \Rightarrow \underbrace{\gamma' \beta_1 \beta_2}_{\gamma} \alpha \Rightarrow^* w \Rightarrow [A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$$

где γ по опред $\beta_1 \neq \lambda \Rightarrow [A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$ базисный

$\gamma = \lambda$ — допустимый базисный пункт \square

Лемма 2

Пункт $[B \rightarrow \cdot B]$ допустимый где $AP \gamma \Leftrightarrow \exists$ путь, помечен λ , в $[B \rightarrow \cdot B]$ из некоторого базисного пункта, достигающий γ .

Док-во (лемма):

I \Leftarrow Пусть $[A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$ допустим где $\gamma \Rightarrow \exists$ вывод.

$S' \Rightarrow^* \gamma' \beta_1 \beta_2 u \Rightarrow^* \gamma \beta v u \Rightarrow^* w \Rightarrow \exists$ вывод $S' \Rightarrow^*$
 $\Rightarrow^* \gamma \beta v u \Rightarrow \gamma \beta v u \Rightarrow^* w' \Rightarrow [B \rightarrow \cdot \beta]$ допустимый
 где γ .

II \Rightarrow Пусть $[B \rightarrow \cdot \beta]$ допустим где $\Delta \Pi \gamma'$
 \exists вывод.

$S' \Rightarrow^* \gamma \beta u \Rightarrow \gamma \beta u \Rightarrow^* w$

Рассм первое появление γ в этом
 выводе. По 11 ему соответ некотор базисн.
 пункт $[A \rightarrow \beta_1 \cdot \beta_2]$, допуст где γ

$S' \Rightarrow^* \gamma' A v \Rightarrow \gamma' \beta_1 \beta_2 v \Rightarrow \gamma \beta_2 v \Rightarrow^* \gamma \beta u \Rightarrow^* w$
 если $\beta_2 = \beta \beta_2'$, то наш базисный пункт -
 или более точно

$[A \rightarrow \beta_1' \cdot \beta_2']$ по опред Γ_0 есть Δ -переход

в пункт $[B \rightarrow \cdot \beta]$ если $\beta_2 \Rightarrow^+ \beta \beta_2'$, то β_2

написан с помощью C , $C \Rightarrow^+ \beta d$ (т.к. вывод
 правн)

$$\beta_2 = C d_1$$

$$C \Rightarrow \beta_1 u_1$$

$$\beta_1 \Rightarrow \beta_2 u_2$$

...

$$\beta_n \Rightarrow \beta u$$

3 правила $(C \rightarrow B_1 u_1) \dots (B_n \rightarrow B u) \in P$

В I_G есть переход $[C \rightarrow \cdot B_1 u_1] \xrightarrow{\lambda} [B_1 \rightarrow \cdot B_2 u_2]$
 $[B_n \rightarrow \cdot B u] \xrightarrow{\lambda} [B \rightarrow \cdot \beta]$

Вернёмся к док-ке теоремы:

$I \subseteq$

Индукция по $|\gamma|$

Б.ч $\gamma = \lambda$

$i_0 = [S' \rightarrow \cdot S]$ допустим где $\gamma = \lambda$, то

λ все пункты достижимы по λ -переходу из

i_0 , допустим где $\gamma = \lambda$

Или $\gamma = \bar{\gamma} X$

расши. базисные пункт где $\gamma(\lambda 1) : [A \rightarrow \beta_1 X \cdot \beta_2]$

3 переход

$[A \rightarrow \beta_1 \cdot X \beta_2] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \beta_1 X \cdot \beta_2]$ пусть до

$[A \rightarrow \beta_1 \cdot X \beta_2]$ помещен $\bar{\gamma}$, где нею выходи П.У.

$S' \Rightarrow^* \bar{\gamma} A u \Rightarrow \underbrace{\bar{\gamma} \beta_1 X \cdot \beta_2 u}_{\bar{\gamma}} \Rightarrow^* w \Rightarrow$

$\Rightarrow [A \rightarrow \beta_1 X \cdot \beta_2]$ допустим где γ

Каждый пункт (достигимости) ... γ

...и ... (...)

либо совп с $[A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$, либо дост из
него по 1-перех \Rightarrow по 12 он допуст. где δ .

II \Rightarrow

индукция по $|\delta|$

б.и. $|\delta| = 1$ Произвольный пункт, допуст
где δ : $[A \rightarrow \beta_1 \beta_2] = [A \rightarrow \cdot \beta_2]$

или: $\delta = \bar{\delta} X$

по 11 \exists базисный пункт, допустим где δ :
: $[A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$

$S' \Rightarrow^* \bar{\delta}' A \Rightarrow^* \overbrace{\bar{\delta}' \beta_1 X \beta_2}^{\bar{\delta} X} \Rightarrow^* w \Rightarrow [A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$ допустим
где $\bar{\delta}$ и где $\bar{\delta}$ по вып ПИ.

\exists путь из i_0 в $[A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$, помечен.

$\bar{\delta} \Rightarrow$ добавим к пути переход $[A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$


$\downarrow X$

$[A \rightarrow \beta_1 X \beta_2]$,

получим путь, помечен δ

по 12 \forall базисного пункта допустим

где δ \exists путь, помечен δ в данный

пункт и базисный пункта. 

Следствие 1

Язык, распознаваемый автоматом \mathcal{I}_G , совпадает со множеством всех активных префиксов грамматики G .

Все состояния автомата \mathcal{I}_G являются заключительными. Если γ — активный префикс, то по теореме в автомате найдётся путь из начального пункта i_0 , помеченный цепочкой γ , то есть автомат распознаёт γ . Обратно, если в автомате существует путь из i_0 в i , помеченный цепочкой γ , то γ является активным префиксом, т.к. по теореме i — допустимый для него пункт.