

INVESTIGACIÓN

Relación de la percepción materna y conductas alimentarias sobre el estado nutricional del escolar

Relationship between maternal perception and eating behaviors on the nutritional status of schoolchildren

Relação entre a percepção materna e os comportamentos alimentares sobre o estado nutricional dos escolares

Luz Elena Cano-Fajardo ^{1*}

 <https://orcid.org/0000-0001-9404-3666>

Karla Neidy Perales-Hinojosa ²

 <https://orcid.org/0009-0001-4581-0184>

Mayra Alejandra Mireles-Alonso ³

 <https://orcid.org/0000-0002-5277-4476>

San Juana López-Guevara ⁴

 <https://orcid.org/0000-0002-2984-3576>

Jesús Alejandro Guerra-Ordoñez ⁵

 <https://orcid.org/0000-0002-4587-3214>

Tirso Duran-Badillo ⁶

 <https://orcid.org/0000-0002-7274-3511>

1. Doctorado en Metodología de la enseñanza, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
2. Licenciatura en Enfermería, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
3. Maestría en Enfermería, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
4. Doctorado en Metodología de la Enseñanza, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
5. Doctorado en Ciencias de Enfermería, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
6. Doctorado en Metodología de la Enseñanza, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

*Autor para correspondencia: lcano@docentes.uat.edu.mx

Recibido: 25/03/2025

Aceptado: 19/10/2025

Resumen

Introducción: La adopción de hábitos alimentarios se encuentra influenciada por la familia, siendo la madre su cuidador principal por lo que su percepción tiene una influencia decisiva en la clase de alimentos ingeridos por los estudiantes en edad escolar. **Objetivo:** Conocer la relación entre la percepción materna y las conductas alimentarias sobre el estado nutricional del escolar. **Metodología:** Estudio descriptivo correlacional, en 223 diadas de madres y alumnos de primero a sexto año matriculados en institución pública, seleccionadas por muestreo no probabilístico, se excluyeron alumnos con discapacidad motriz, madres analfabetas o que no fuese la cuidadora principal. Se empleó Cuestionario de Apariencia Física y Salud, incluye percepción materna con pictograma de imágenes corporales y el Children's Eating Behaviour Questionnaire para medir conductas alimentarias, se respetó confidencialidad, anonimato, asentimiento y consentimiento informado. **Resultados:** Solo 47 % de madres identificaron correctamente la condición nutricional de sus hijos, el resto subestimó el sobrepeso y la obesidad, solo 34.5 % de los escolares tenía un peso normal. Se encontró una diferencia estadística significativa con $p = .000$ entre percepción materna sobre el peso del escolar, y el estado nutricional real del mismo. Además, se realizó correlación de Spearman obteniendo valores $p > 0.01$. **Conclusiones:** La subestimación materna del sobrepeso y la obesidad puede dificultar la adopción de hábitos saludables, acrecentando el riesgo de enfermedades crónicas en la infancia. Es esencial implementar estrategias educativas dirigidas a las madres para mejorar la identificación del estado nutricional de sus hijos y fomentar prácticas alimentarias saludables.

Palabras clave: Percepción materna; Estado nutricional; Conductas alimentarias (DeCS).

Abstract

Introduction: Eating habits are influenced by family, with mothers being primary caregivers and therefore having a decisive influence on the food their school-age children eat. **Objective:** To investigate the relationship between maternal perceptions and eating behaviors and how these influence the nutritional status of schoolchildren. **Methodology:** This descriptive correlational study was conducted with 223 pairs of mothers and students enrolled in grades first to sixth at a public elementary school. Students with motor disabilities, illiterate mothers, or mothers who were not the primary caregiver were excluded. Eating behaviors were measured using the Physical Appearance and Health Questionnaire, which includes maternal perception of body images through pictograms, and the Children's Eating Behavior Questionnaire. Respect for confidentiality, anonymity, assent and informed consent was maintained throughout. **Results:** Only 47 % of mothers correctly identified their children's nutritional status. The remainder underestimated the prevalence of overweight and obesity, with only 34.5 % of schoolchildren being of normal weight. A statistically significant difference was found between maternal perception of schoolchildren's weight and their actual nutritional status $p = 0.000$. Additionally, a Spearman correlation was performed, yielding values $p > 0.01$. **Conclusions:** Mothers' tendency to underestimate their children's weight can hinder the adoption of healthy habits and increase their risk of developing chronic diseases. Therefore, it is essential to implement educational strategies aimed at mothers to help them identify their children's nutritional status and promote healthy eating practices.

Key words: Maternal perception; Nutritional status; Eating behaviors (DeCS).



Abstrato

Introdução: A adoção de hábitos alimentares é influenciada pela família, sendo a mãe a principal cuidadora. Portanto, sua percepção tem influência decisiva sobre os tipos de alimentos consumidos por crianças em idade escolar. **Objetivo:** Determinar a relação entre a percepção materna e os comportamentos alimentares em relação ao estado nutricional de crianças em idade escolar. **Metodologia:** Foi realizado um estudo descritivo e correlacional. Utilizou-se um método de amostragem não probabilística para selecionar 223 díades mãe-filho matriculadas em agosto de 2023 que desejassem participar. Foram excluídas crianças com deficiência motora, mães analfabetas ou mães que não eram as principais cuidadoras. O índice de massa corporal e a percepção materna foram analisados utilizando um pictograma de imagem corporal e o Questionário de Comportamento Alimentar Infantil para mensurar os comportamentos alimentares. **Resultados:** Apenas 47 % das mães identificaram corretamente o estado nutricional de seus filhos; as demais subestimaram o sobrepeso e a obesidade. Apenas 34,5 % das crianças em idade escolar apresentavam peso normal. Foi encontrada uma diferença significativa de $p=0,000$ entre a percepção das mães sobre o peso de seus filhos e o estado nutricional real destes. Além disso, foi realizado um teste de correlação de Spearman, que apresentou valores acima de $p=0,01$. **Conclusões:** A subestimação materna do sobrepeso e da obesidade pode dificultar a adoção de hábitos saudáveis, aumentando o risco de doenças crônicas na infância. Conclui-se que é essencial implementar estratégias educativas direcionadas às mães para melhorar sua capacidade de identificar o estado nutricional de seus filhos e promover práticas alimentares saudáveis.

Palavras-chave: Percepção materna; Estado nutricional; Comportamentos alimentares (DeCS).

Introducción

A nivel mundial se han incrementado los problemas relacionados con la alimentación teniendo como consecuencias desequilibrios nutricionales. Las estimaciones indican que más de 900 millones de personas presentan problemas de desnutrición y 170 millones de escolares sufren de insuficiencia ponderal ⁽¹⁾. Así mismo, en México uno de cada tres niños de seis a once años se encuentra en sobrepeso (SP) y obesidad (OB), representando un 35 % y un 2 % de escolares muy delgados ⁽²⁾. Durante el año 2016, la prevalencia de SP y OB, en escolares fue de 33.2 %, la transición nutricional en México ha evidenciado una modificación en los hábitos de consumo, sustituyéndose los productos saludables por alimentos con elevada concentración energética, ricos en azúcares y grasas ⁽³⁾. La amplia accesibilidad de alimentos con elevada concentración energética, el elevado consumo de bebidas azucaradas y la escasa actividad física en las escuelas trae como



consecuencia altas estadísticas de SP y OB. Un ejemplo de esto es que se cree que el 92 % de los infantes entre los 5 y los 11 años consumen regularmente bebidas azucaradas, mientras que el 50 % incluye en su dieta botanas, dulces y cereales ultra procesados ⁽³⁾, como consecuencia, México es considerado un país mayormente mal nutrido, debido a que actualmente se posiciona como el país con la mayor prevalencia de OB infantil a nivel global ⁽⁴⁾. El llevar una dieta sana ayuda a prevenir la malnutrición, teniendo una alimentación variada, proporcionada y saludable que debe estar basada en las características individuales como la edad, sexo, hábitos de vida y el nivel de actividad física, junto con el contorno cultural, la disponibilidad de alimentos y los patrones alimentarios locales, influyen de manera significativa en la conducta alimentaria. Este conjunto de factores cumple una función fundamental en el entendimiento de la malnutrición debido a que refleja la manera en que las personas se relacionan con los alimentos, mediada por experiencias directas con la comida, entorno familiar, estatus social, vínculos afectivos y tradiciones culturales. Todo ello motiva un creciente interés por analizar la relación entre la OB y los patrones de alimentación en los escolares. Los cambios en el contexto socioeconómico actual han provocado que tanto padres como hijos adopten patrones alimentarios inadecuados, incrementándose el consumo de alimentos transformados y comida rápida, lo cual impacta negativamente en las costumbres alimentarias de los niños y en su estado nutricional ⁽⁵⁾.

Además, el mantener poca actividad física y aumento de horas para ver la televisión y jugar videojuegos, son también factores que impulsan la obesidad en los escolares ⁽⁶⁾. Así mismo, el estado nutricional es una condición en la que se encuentra el organismo en relación con la ingesta de nutrientes y éste se mide a través de los parámetros de nutrientes, por lo tanto, la alimentación y nutrición son esenciales en cualquier momento de la vida, principalmente en etapas tempranas de crecimiento y desarrollo fisiológico ⁽⁷⁾.



La adquisición de hábitos alimentarios está influenciada principalmente por tres agentes: la familia, los medios de información masiva y la escuela. La familia representa el primer entorno en el que los niños entran en contacto con las prácticas alimentarias, ejerciendo una influencia significativa en sus conductas relacionadas con la alimentación. Los hábitos familiares, a su vez, son producto de una construcción social y cultural compartida de manera implícita entre sus miembros ⁽⁶⁾.

Las creencias y las prácticas de alimentación tienen una gran importancia en los comportamientos alimentarios influyendo principalmente en las percepciones incorrectas de las madres sobre el estado nutricional de los escolares y como consecuencia en la conducta alimentaria del escolar y en la construcción de su autoimagen ^(8,9). Existen estudios que han explorado la anomalía perceptiva de la madre sobre el estado nutricional (peso/talla) de los hijos, en donde se demuestra que una percepción materna inadecuada en los escolares puede considerarse un factor de riesgo para el desarrollo y mantenimiento de SP y OB, puesto que el 98 % de las madres no reconoce el estado nutricional real de los hijos ⁽¹⁰⁾.

Investigadores han señalado el papel fundamental de la percepción materna ⁽¹¹⁾, debido a que históricamente se profesa como estereotipo ser un niño gordo es representación de estar sano, al contrario, un niño enfermo se le relaciona con un niño delgado ⁽¹²⁾. En Chile las madres de escolares en estado de malnutrición por exceso los percibieron más delgados en un 60 % de ellos ⁽¹⁰⁾, así mismo la percepción inferior del peso de los hijos de madres en el estado de Nuevo León se presentó en la mayoría de las madres con hijos con sobrepeso-obesidad ⁽¹¹⁾. Como personal de enfermería, estamos involucrados en esta problemática debido a un notable incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, condiciones que podrían prevenirse y modificarse desde edades tempranas mediante visitas a los departamentos de salud infantil y brindar una educación fundamentada en los determinantes relacionados con este problema de salud. Resulta fundamental desarrollar estrategias orientadas a reducir su incidencia y promover un estado



nutricional óptimo en la población escolar, así como implementar programas que fomenten hábitos alimentarios saludables, contribuyendo de esta manera a la formación de estilos de vida saludables en este grupo ^(13,14). En función a lo expuesto previamente y tras un análisis exhaustivo de la literatura disponible, resulta pertinente profundizar en el estudio de estos fenómenos, es por ello por lo que se planteó como pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción que tienen las madres sobre el estado nutricional y las conductas alimentarias de sus hijos?, con el objetivo de conocer la relación entre la percepción materna y las conductas alimentarias sobre el estado nutricional del escolar.

Metodología

Estudio tipo descriptivo correlacional, la población estuvo formada por 788 diadas de madre-escolar de una institución pública ubicada en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, todos ellos en etapa escolar de primero a sexto año (6 a 12 años) de ambos turnos. La muestra se calculó utilizando una fórmula de población finita con los siguientes parámetros: Un margen de error del 5 % (0.05), nivel de confianza del 95 % (1.96), y una desviación estándar del 0.5, permitiendo obtener una muestra de 223 diadas (madre-hijo), obtenida por muestreo probabilístico del tipo aleatorio estratificado, en donde cada uno de los estratos fueron cada grado escolar con el fin de representar la situación en cada una de las edades de acuerdo con el grado escolar.

Los criterios de inclusión incluyeron, ser alumnos matriculados en el periodo agosto 2023-julio 2024, ambos géneros y que la diada aceptará participar, se excluyeron escolares que no cumplieran con la edad de 6 a 12 años, que contaran con alguna discapacidad que limitara su movimiento, que la madre no fuese el cuidador principal del escolar, madres analfabetas, y aquellos escolares en donde la madre o el escolar no aceptaron participar en el estudio y por último se eliminaron aquellos en donde no se contestó en su totalidad la encuesta aplicada o no fue firmado el asentimiento y consentimiento informado.



Para la recopilación de datos e información se utilizó una cédula que incluía a) datos de la madre: edad, escolaridad, peso y altura aproximados ¿usted trabaja? Indique cuantas horas, b) datos del escolar: edad, sexo, grado y grupo. Posteriormente se aplicó el Cuestionario de Apariencia Física y Salud que consta de 19 ítems divididas en cuatro secciones, para fines de esta investigación se consideró solamente uno de los ítems de la sección uno: “percepción por palabras” donde la madre podía seleccionar entre muy bajo de peso, bajo de peso, peso correcto, con sobrepeso o bastante peso, para conocer la percepción de la madre sobre el peso de su hijo, y una sección que incluyó un pictograma con siete imágenes corporales dividida en cuatro secciones, de acuerdo con los rangos de edad y sexo de los escolares, donde la madre podía seleccionar la imagen que más se acercará con la imagen corporal de su hijo⁽¹⁵⁾. En cuanto a la percepción por imágenes, para realizar la medición se consideró un resultado positivo cuando las madres de niños con bajo peso y peso normal según el índice de masa corporal (IMC), seleccionaron una imagen que representaba un tamaño inferior o superior al promedio. En contraste, los resultados negativos se categorizaron en subestimación y sobreestimación de la percepción, este cuestionario está validado para la población mexicana en el año 2009 con una sensibilidad de 9 % y especificidad, de 21 % para la prueba percepción por palabras, y una sensibilidad de 76 % y especificidad de 15 % para la prueba percepción por imágenes⁽¹⁶⁾.

El Children's Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ)⁽¹⁷⁾ adaptado para la población mexicana permite obtener información sobre conductas alimentarias, consta de 34 reactivos y seis escalas: Voracidad e ingesta emocional (11 ítems), disfrute de la comida (5 ítems), deseo de beber (3 ítems), apetito moderado (8 ítems), ayuno emocional (4 ítems) y melindrosidad (3 ítems), cuenta con una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.882⁽¹⁸⁾, mientras que en esta investigación fue de 0.822. Por último, para determinar el peso se utilizó una báscula marca SECA modelo 813 con capacidad para 150 kilogramos, precisión de 0.1 kg., los resultados para determinar el IMC se basaron en la tabla



de la cartilla nacional de salud, para niños de cero a nueve años y de 10 a 19 años; la talla se midió con un estadiómetro marca SECA 213, que cuenta con escala métrica.

El estudio obtuvo la aprobación de un comité de investigación y ética de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros con dictamen número 119, posteriormente se solicitó la autorización de la dirección de la institución educativa para llevar a cabo la recolección de datos. El estudio se realizó conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud, específicamente en la sección referente a la investigación en seres humanos ⁽¹⁹⁾, en donde se señala que toda investigación en salud debe considerar aspectos éticos que garanticen la dignidad, consentimiento, confidencialidad, anonimato y el asentimiento informado.

Para el análisis de los datos fue utilizado el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 24 para Windows. Se utilizó estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes, así como la prueba no paramétrica de correlación de Spearman para determinar la relación entre las variables.

Resultados

El IMC de la madre y del hijo, fueron del 26 % y el 34.5 % los cuales se encontraban con peso normal respectivamente, (Tabla 1).

Tabla 1. Estado nutricional de la madre y el escolar, 2024 (n=223)

Variable	<i>f</i>	%
IMC-Madre		
Bajo peso	1	.4
Peso normal	58	26.0
Sobrepeso	103	46.2
Obesidad I	42	18.8
Obesidad II	14	6.3
Obesidad III	5	2.2
IMC-Escolar		
Bajo peso	59	26.5
Peso normal	77	34.5
Sobrepeso	42	18.8
Obesidad	45	20.2

Fuente: Elaboración propia



En la tabla 2, se puede observar que sólo el 47 % de las madres percibieron correctamente el estado nutricional del escolar, haciéndose mayor énfasis en que el escolar con normo peso su madre lo percibió con bajo peso o con SP, y el escolar con SP u OB, fue percibido normopeso o con bajo peso.

Tabla 2. Elección de imágenes corporales e índice de masa corporal, 2024 (n=223)

Elección de imágenes	Sobrepeso u obesidad		Peso normal		Bajo peso	
IMC	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
Bajo peso	1	0.4	2	0.8	8	3.6
Normo peso	5	2.2	59	26.4	62	27.8
Sobrepeso	11	4.	23	10.3	7	3.1
Obesidad	27	12.1	16	7.1	2	0.8

Fuente: Elaboración propia

Para dar respuesta al objetivo general se ejecutó la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis para conocer si existía alguna diferencia significativa entre el IMC del escolar y la elección de imágenes corporales que realizó la madre, obteniendo un resultado de .000 estableciendo una diferencia estadística significativa entre la percepción materna sobre el peso del escolar, y el estado nutricional real del mismo, (Tabla 3).

Tabla 3. Diferencia entre IMC e imágenes, 2024

Prueba de Kruskal-Wallis		
X ²	gL	<i>p</i>
92.958	2	.000

Fuente: Elaboración propia. Nota: X²=Chi cuadrada, gL grados de libertad, *p*=significancia

Por último, para conocer si existía relación entre las conductas alimentarias y el estado nutricional del escolar, se realizó la prueba no paramétrica de Spearman, obteniendo valores arriba de 0.01 lo cual se interpreta como que no existió relación estadística entre ambas variables, por lo tanto, sea cual sea su clasificación, uno no tiene impacto en el otro, (Tabla 4).



Tabla 4. Prueba no paramétrica de Spearman, 2024

Variable	Pro-ingesta		Anti-ingesta		<i>p</i>	IMC
	<i>p</i>	Sig.	<i>p</i>	Sig.		Sig.
Pro-ingesta	1.00		.271**	.000	.031	.641
Anti-ingesta	.271**	.000	1.00		-0.85	.208
IMC	0.31	.641	-0.85	.208	1.00	

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Resulta importante señalar que en esta investigación, la mayoría de las madres se encontraban en un desequilibrio de su estado nutricional, principalmente con SP y OB cifras que no difieren de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2020-2023 ⁽²⁰⁾, influyendo en la percepción distorsionada del peso de los hijos lo que podría considerarse como una limitante, siendo así que poco más del cincuenta por ciento 53 % de las madres eligieron erróneamente la representación del peso real del escolar subestimándolo. Cabe destacar que los resultados de este estudio solamente determinan la percepción de las diadas encuestadas, sin embargo, esto genera implicaciones prácticas para la profesión de enfermería al evidenciar la importancia del establecimiento de hábitos saludables.

Estos datos coinciden con investigaciones previas, un estudio realizado en Shangai, China y otro en Brasil ^(9,22), las madres oscilaban con un peso fuera de los rangos normales, subestimaron el peso de sus descendientes, este fenómeno se presentó en casi una cuarta parte de las madres entrevistadas. Cuando existe una percepción incorrecta de los padres pueden llevarlos a comportamientos alimentarios erróneos, interfiriendo en la dinámica alimentaria familiar, teniendo como consecuencia desórdenes en el peso del hijo, asentando limitaciones en las actividades físicas y propiciando un estilo de vida sedentario.



La obesidad representa un problema de salud pública a nivel mundial, causa de una alimentación carente de nutrientes que las madres ofrecen a los hijos como proveedores, así mismo los ambientes en que los escolares se desenvuelven como es la familia, escuela, amigos influyen en su selección de alimentos, aunado a lo anterior las actividades sedentarias de la vida moderna no favorecen a crear estilos de vida saludable en los escolares. Al realizar la somatometría de los escolares solo una tercera parte se posiciono en un peso eutrófico, siendo un evento no aislado, debido a que diversas investigaciones que han sido llevadas a cabo en distintas regiones del mundo, los rangos de desequilibrio nutricional han revelado este mismo comportamiento ^(5,6,10,23,24).

El estudio muestra que poco menos de la mitad de las madres percibieron de manera adecuada el estado nutricional de sus hijos, con una tendencia a subestimar el SP y la OB. Este fenómeno se ha observado en investigaciones previas y podría atribuirse a factores culturales o a la normalización del SP. La subestimación del SP y OB en los niños podría ser un factor que dificulte la instauración de cambios en las costumbres familiares para prevenir y controlar la obesidad infantil. Esto concuerda con anteriores investigaciones, donde se resaltó que la mayoría de las madres con SP y OB tiene una percepción no adecuada del peso del hijo, además de que esta alteración es una consecuencia para el aumento constante de la obesidad en escolares ^(10,11). En Rumania al estimar la percepción del peso de los escolares a través de la perspectiva de los tutores, más de la mitad percibió de manera errónea el peso real de su hijo, siendo que solo un 61 % de los escolares se encontraba realmente en un peso normal ⁽²⁵⁾. Aunado a lo anterior en Argentina la percepción de las progenitoras con descendientes con obesidad fue distorsionada ⁽²⁶⁾, a pesar de la independencia que los escolares muestran a esta edad, la alimentación es una responsabilidad de los padres de ahí la importancia de que posean una percepción real del peso de sus hijos.

Bajo el objetivo de conocer cuáles son las conductas alimentarias de acuerdo con el estado nutricional del escolar, se analizaron las seis dimensiones del cuestionario de conducta de ingesta



infantil, en donde no existió una relación estadística significativa con el estado nutricional. Esto sugiere que las conductas alimentarias no estaban relacionadas directamente con el IMC en este grupo de niños.

La alimentación constituye una de las necesidades imperantes para el ser humano, que involucra aspectos afectivos, cognitivos y conductuales en la ingesta de alimentos como son las necesidades, fuente de placer, pautas socioculturales, producto del entorno social, teniendo un impacto en la ingesta de alimentos en donde se presentan alteraciones como la disminución o aumento de ella, teniendo como consecuencia problemas para controlar el peso corporal surgiendo así una conducta alimentaria inadecuada ^(27,28).

Los resultados muestran el comportamiento del binomio madre-hijo en una institución de la localidad de Matamoros, sin embargo, no se puede jactar que es un comportamiento generalizado en la población, sería importante continuar con investigaciones que aborden temas de comportamientos alimentarios en escolares, con ello podría brindarse la información necesaria para realizar estrategias de educación alimentaria tanto a la madre como a los escolares.

Conclusiones

Los hallazgos de este estudio destacan una discrepancia importante entre la percepción materna y el estado nutricional real de los escolares, gran porcentaje de las madres tiende a subestimar el peso de sus hijos, particularmente en casos de SP y OB, lo cual coincide con investigaciones previas y sugiere una posible normalización cultural del exceso de peso en el entorno familiar. Esta subestimación representa un obstáculo para la implementación de estrategias alimentarias saludables y la adopción de un estilo de vida activo en el hogar, ya que la percepción errónea puede limitar el reconocimiento de la necesidad de cambios en la ingesta de alimentos y la necesidad de realizar actividad física de los escolares, así como posibles barreras para llevar cabo las sugerencias que el gremio de enfermería recomienda a la madre.



La esperanza de vida en la actualidad es un éxito a consecuencia de las intervenciones relacionadas con los hábitos saludables, la ciencia y tecnología; por su parte el gremio de enfermería orienta a la humanidad en sus distintas etapas de la vida disminuyendo la exposición condiciones de riesgo, con ello garantizando una mejor calidad de vida, sin embargo a pesar de los esfuerzos por el personal de salud los datos estadísticos en la actualidad no son favorables y las tendencias no brindan un panorama alentador.

Resulta importante resaltar que uno de los múltiples roles que representa la disciplina de enfermería en la sociedad es la de promoción de la salud, a través de esta acción se educa a los individuos, familias y comunidades para el fortalecimiento del autocuidado, se trata de una serie de acciones que abarquen de manera holística cada una de las necesidades del ser humano.

El abordar la percepción materna sobre el estado físico de los hijos a través de preguntas e imágenes, coloca a la madre en un análisis del cómo percibe su hijo y el ideal, cabe destacar que existen multifactores que influyen en dicha percepción, por lo cual se sugiere en próximos estudios no solo abordar a la diada, sino a todo el seno familiar y círculos de amistad.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

Beca otorgada para estudiantes de posgrado al autor principal, emitida por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones de este manuscrito.



Referencias bibliográficas

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesidad y sobrepeso. Nota informativa [Internet]. OMS;2025 [citado 15 jul 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). El índice mundial de obesidad supera por primera vez al de bajo peso entre los niños y niñas en edad escolar y adolescentes (Siglas). [Internet]. 2025 [citado 30 sept 2025]. Disponible en: <https://goo.su/ofiWD>
3. Gobierno de México. Obesidad infantil: nuestra nueva pandemia [Internet]. Hablemos de salud2021 [citado 21 mar 2025]. Disponible en: <https://www.gob.mx/promosalud/articulos/obesidad-infantil-nuestra-nueva-pandemia?idiom=es>
4. Instituto Nacional de Salud Pública (INEGI). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018: Presentación de resultados [Internet]. México; 2019 [citado 21 mar 2025]. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
5. Encina VC, Gallegos LD, Espinoza MP, Arredondo GD, Palacios CK. Comparación de la conducta alimentaria en niños de diferentes establecimientos educacionales y estado nutricional. Revista chilena de nutrición [Internet]. 2019 [citado 30 sep 2021];46(3):254-263. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9541644>
6. Sánchez CB, Reyes CZ, Barajas GL, García OL, Valdés ME. Hábitos alimentarios y actividad física en población escolar con normopeso, sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. Journal of Behavior and Feeding [Internet]. 2022 [citado 13 feb 2023];2(2):20-27. Disponible en: <https://doi.org/10.32870/jbf.v2i2.30>
7. Saintila J, Villacís JE. Estado nutricional antropométrico, nivel socioeconómico y rendimiento académico en niños escolares de 6 a 12 años. Revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria [Internet]. 2020 [citado 13 feb 2021];40(1):74-81. Disponible en: <https://revista.nutricion.org/PDF/SAINTILA.pdf>
8. Ayine P, Selvaraju V, Venkatapoorana CM, Bao Y, Gaillard P, Geetha T. Eating behaviors in relation to child weight status and maternal education. Children [Internet]. 2021 [citado 23 sep 2025];8(32):1-9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33430408/>
9. Mattos MH, Pandolfi MM, Nunes FC, Fonseca SC, De Meneses GG, Cavalcante TG, et al. Percepção materna do estado nutricional do filho: Um caminho para o diagnóstico precoce da obesidade infantil. RBONE [Internet]. 2022 [citado 23 mar 2025];15(95):593-601. Disponible en: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1472/1137>
10. Rozas K, Huerta P, Planett J, Arancibia M, Araya MV. Alteración de la percepción materna sobre el estado nutricional de sus hijos ¿nuevo factor de riesgo cardiovascular? Rev Chil Cardiol [Internet]. 2020 [citado 21 mar 2025];39(3):216-222. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-85602020000300216>
11. Flores-Peña Y, Avila-Alpírez H. Percepción materna del peso del hijo, problemas del estilo de vida y autoeficacia para manejarlos. Aquichan [Internet]. 2021 [citado 18 mar 2025];21(2):1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.5294/aqui.2021.21.2.8>
12. Wang J, Zhu D, Cheng X, Liuzhou Y, Zhu B, Montgomery S, et al. Maternal perception of child weight and concern about child overweight mediates the relationship between child weight and feeding practices. Public Health Nutr [Internet]. 2022 [citado 23 sep 2025];25(7):1780-1789. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9991628/>
13. Segura-Álvarez M, Restrepo-Segura Y, Ramírez-Valencia M. Sobrepeso y obesidad: una mirada desde la educación para la salud, en un sistema de bienestar universitario. Rev. Salud



- Pública [Internet]. 2024 [citado 26 sep 2025];26(6):1-7. Disponible en: <https://doi.org/10.15446/rsap.v26n6.116166>
14. Mosquera HM, Mosquera HM, De Armas DL, Brito RY. Estado nutricional y hábitos alimenticios en niños de un colegio público de Valledupar. *Rev. Méd Risaralda* [Internet]. 2016 [citado 18 oct 2021];22(1):42-48. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672016000100007
 14. Ekstein KC, Mikhail LM, Ariza AJ, Scott TJ, Millard SC, Binns HJ. Parents' perceptions of their child's weight and health. *American Academy of Pediatrics* [Internet]. 2006 [citado 16 mar 2025];117(3):681-690. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2005-0910>
 15. Flores-Peña Y, Trejo-Ortiz P, Gallegos-Cabriales E, Cerda-Flores R. Validez de dos pruebas para evaluar la percepción materna del peso del hijo. *Salud Pública México* [Internet]. 2009 [citado 21 mar 2025];51(6):489-495. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-3634200900060000
 16. Wardle J, Guthrie CA, Sanderson S, Rapoport L. Development of the children's eating behaviour questionnaire. *Journal of Child Psychology Psychiatry* [Internet]. 2001 [citado 13 feb 2025];42(7):963-970. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00792>
 17. Vázquez-Pérez L, González-Herrera L, Hattori-Hara M, Zavala-Cervantes A. Traducción y validación del children's eating behavior questionnaire (CEBQ). *Ciencia y humanismo en la salud* [Internet]. 2020 [citado 10 abr 2025];7(1):1-9. Disponible en: <https://revistacienciayhumanismoenlasalud.uady.mx/cienciayhumanismo/article/view/136>
 18. Diario Oficial de la Federación. Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-012-SSA3-2007, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humano. Secretaría de Salud [Internet]. México; 2007 [citado 07 dic 2024]. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3880/salud/salud.htm>
 19. Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados de la ENSANUT 2020-2023. Instituto Nacional de Salud Pública [Internet]. Gobierno de México; 2024 [citado 23 mar 2025]. Disponible en: <https://www.insp.mx/avisos/presentan-resultados-de-la-ensanut-2020-2023>
 20. Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Encuestas [Internet]. México; 2023. [citado 23 mar 2025]. Disponible en: <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/index.php>
 21. Wang J, Zhu D, Cheng X, Liuzhou Y, Zhu B, Montgomery S, et al. Maternal perception of child weight and concern about child overweight mediates the relationship between child weight and feeding practices. *Public Health Nutrition* [Internet]. 2022 [citado 15 may 25];25(7):1780-1789. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35000661/>
 22. Terry BB, Rodríguez VL, Silvera TD, Rodríguez FV, Chávez VHN, Rodríguez SA. Sobrepeso, obesidad y conductas alimentarias en escolares de primaria, municipio Cruces, Cienfuegos. *Revista Cubana Salud Pública* [Internet]. 2021 [citado 18 mar 2025];47(1):1-21. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662021000100014
 23. Morales PA, Rodríguez RI, Massip NJ, Sardinias AM, Balado SR, Morales VL. Preferencias y conductas alimentarias en adolescentes de secundaria básica. *Revista Cubana Pediatría* [Internet]. 2021 [citado 23 mar 2025];93(2):1-15. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312021000200005&lng=es
 24. Trandafir AV, Fraseniuuc M, Lotrean LM. Assessment of actual weight, perceived weight and desired weight of Romanian school children-opinions and practices of children and their parents.



Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2022 [citado 20 nov 2024];19(6):1-16. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph19063502>

25. Muñante RE. Percepción del estado nutricional de los hijos y su relación con el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios de Ica. [Tesis Licenciatura]. Ica Perú: Universidad Nacional San Luis Gonzaga [Internet]. 2023 [citado 30 sep 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/items/8551cbd7-5db1-4c7e-b216-286855399a15>

26. Bautista-Díaz M, Castelán-Olivares A, Martín-Tovar A, Franco-Paredes K, Mancilla-Díaz J. Conductas alimentarias de riesgo, percepción de prácticas parentales y conducta asertiva en estudiantes de preparatoria. Interacciones Revista de avances en psicología [Internet]. 2020 [citado 18 feb 2022];6(3):1-10. Disponible en: <https://doi.org/10.24016/2020.v6n3.162>

27. Jimeno-Martínez A, Maneschy I, Rupérez AI, Moreno LA. Factores determinantes del comportamiento alimentario y su impacto sobre la ingesta y la obesidad en niños. JBF [Internet]. 2021 [citado 30 sep 2025];1(1):60-71. Disponible en: <https://doi.org/10.32870/jbf.v1i1.20>

Cómo citar este artículo: Cano-Fajardo L, Perales-Hinojosa K, Mireles-Alonso M, López-Guevara S, Guerra-Ordoñez J, Duran-Badillo T. Relación de la percepción materna y conductas alimentarias sobre el estado nutricional del escolar. SANUS [Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e573. Disponible en: DOI/URL.

